

Îmi exprim recunoștința și aduc mulțumiri colegelor mele asistente medicale și profesoare de nursing la Școala sanitară districteală „Carol Davila”, Andrada Barcsy, Virginia Popa și Iuliana Sovan, pentru ajutorul acordat cu competență la restructurarea și vizuirea volumelor I și II ale Ghidului de Nursing.

Lucreția Titircă

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale. Ed. a 4-a - București: Viața Medicală Românească, 2005
2 vol.
ISBN 973-8437-64-4
Vol. 2. / coord. de: **Lucreția Titircă**, Maria Zamfir, Gherghinica Gal, ... - 2005. - Bibliogr. - ISBN 973-8437-65-2
1. Titircă, Lucreția (coord.)
II. Baltă, Georgeta
III. Dorobanțu, Elena
IV. Ardeleanu, Mariana
V. Visovan, Iuliana
VI. Ivan, Măruța
614.253.5

Redactor de carte: **Dr. Mihail MIHAILIDE**
Tehnoredactor: **Ioan DUMITRESCO**
Tehnoredactare computerizată și copertă:
Operator: **Gina MANCIU**
Mirela DUMITREAN
Corectori: **Nicoleta VĂCĂREȘTEANU**
Emil FRĂȚILA

EDITURA „VIAȚA MEDICALĂ ROMÂNESCĂ”
București, sector 1, str. Ministerului nr. 1-3, cod postal 70109
TEL: 0211 315.51.09, FAX: 315.69.80

AUTORI:
LUCRETIA TITIRCA **MARIA ZAMFIR**
GHERGHINICA GAL **MĂRIUCA IVAN**
MONICA SEUCHEA **MARIANA ARDELEANU**
ELENA DOROBANȚU **MARIA PESEK**
GEORGETA BALȚĂ

TEHNICI DE EVALUARE ȘI ÎNGRIJIRI ACORDATE DE ASISTENȚII MEDICALI

GHID DE NURSING

Vol. II

Coordonator lucrare
LUCRETIA TITIRCA



EDITURA VIAȚA MEDICALĂ ROMÂNESCĂ

Partea I

ACTUALIZAREA PROCESULUI DE NURSING

Scurt istoric al îngrijirilor de sănătate

Teama de boală și de moarte, promovarea stării de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor sunt dintotdeauna în atenția oamenilor. În acest context, profesia de asistentă medicală – sub diferitele ei denumiri, născută dintr-o inițiativă particulară de inspirație caritabilă –, s-a dezvoltat prin ea însăși. Măsură drumului parcurs trece prin trecut, ca o privire aruncată în urmă, care inspiră mersul înainte. Nimic nu este imuabil, mai ales în această profesie cu o atât de largă implicație socială, pentru că îngrijirile de sănătate sunt o componentă esențială a societății care evoluează o dată cu ea.

Vom puncta pe scurt momentele mai importante din acest trecut.

1. Practici de îngrijire în civilizațiile antichității

- originea îngrijirilor de sănătate, ca funcție, se confundă cu cea a istoriei medicinei;
- mitul genezei – Biblia și prescripțiile de interes igienic și medical;
- practici magico-religioase: animismul, trepanațiile craniene;
- medicina sacerdotală și divinități medicale în civilizațiile: sumeriană, indiană, chineză, iudaică, greco-romană;

* de notat faptul că medicul hindus Tshatraka, care a trăit în primul secol al erei creștine și a fixat în scris tradiția medicală indiană, relatează pentru prima dată în istoria medicinei despre calitățile, funcțiile și îndatoririle ajutorului medical, pe care gândirea noastră modernă îl asimilează cu asistentul medical generalist: „am cu sânge rece, viguros, amabil în purtarea sa, nebătând pe nimeni, atent la nevoile bolnavului, urmând cu strictețe și neobosit instrucțiunile medicului; cunoaște compoziția și prepararea drogurilor; inteligent, devotat bolnavului, având deprimerea curățeniei corpului; se distinge prin curățenia mâinilor lui și prin atăsamentul față de persoana care l-a angajat; dotat cu inteligență și îndemănare, înclinat spre bunătate și apt pentru orice serviciu pe care bolnavul îl solicită; spirit deschis și expert în prepararea alimentelor, familiarizat cu masajul și înțepurile, în a face patul și a mobiliza bolnavul; competent în a doza medicamente; întotdeauna gata,

răbdător și obșnuit a vieții pe cei în suferință: micșorată rău intenționat la orice solicitare fie a medicului, fie a bolnavului.

- înmădușitori, vrăci, bărbieri, spijeri

2. Caritate și îngrijiri în timpurile medievale

Din antichitatea precreștină până la sfârșitul secolului XIX îngrijirea de sănătate au fost asigurate de persoane benevole, care aparțineau comunităților religioase și a căror bunăvoință și devotament suplineau competența tehnică:

- 390 d. Ch. la Roma – primul spital fondat de Fabiola, prima infirmieră a timpurilor creștine;
- școala din Salerno (Italia) aproximativ 1050 d. Ch. – moasa Trotaula „despre bolile femeilor înainte, în timpul și după facere”;
- Ordinul Diaconeselor și serviciile de sănătate comunitară: a hrăni pe cei flămânzi și însetați, a îmbrăca pe cei despuțați, a adăposti pe cei fără adăpost, vizitarea celor închiși, îngrijirea bolnavilor și înmormântarea morților;
- ordine spitalicești după cruciade: cavalerii Sf. Ioan din Ierusalim; Ordinul Benedictin;
- St. Vincent de Paul (1576–1660) – Franța, organizator și reformator al carității și „flicele carității” (1663), primele școli cu caracter semireligios pentru formarea personalului de îngrijire a bolnavilor;
- Elisabeth Fry (1780–1845) – inițiativa reformei de asistență socială în Anglia: Institutul de Nursing Sisters la Bishopsdale;
- Frederika Münster-Fliedner, inițiatoare, formatoare și promotoare a nursingului în școala patronată de Ordinul Diaconeselor din Keiserwerth, 1836.

3. Începutul îngrijirilor moderne

La începutul secolului XIX, vocația de asistență se degajează treptat de specificul caritabil, exprimându-se progresiv prin caracterul de veritabilă profesie, care îi conferă numeroase drepturi laice, rămânând însă întotdeauna încărcată de îndatoriri morale:

- Florence Nightingale (1820–1910) – întemeietorea îngrijirilor moderne și a principiilor umanitare regăsite și în organizarea și funcționarea Crucii Roșii.
- * formatoarea și organizatoarea primei școli laice de îngrijiri din lume, 1860, pe lângă Spitalul St. Thomas din Londra;

** în amintirea principiilor morale pe care le-a practicat și învățat, succesoarele sale instaurează prestarea unui jurământ solemn, cunoscut și depus și astăzi în unele școli sub denumirea de „jurământul Florencei Nightingale”: „mă angajez solemn în fața lui Dumnezeu și în prezența acestei adunări să duc o viață integrită și să-mi îndeplinesc îndatoririle profesionale; mă voi abține de la orice practică delictuală și nu voi administra nici un remediu vătămător; voi face totul pentru a crește nivelul profesionalii mele și voi păstra discreția totală asupra lucrurilor și faptelor ce-mi vor fi măturiste, și a secretelor de familie

pe care practica profesională mi le va face cunoscute; voi ajuta cât pot mai bine medicul în munca sa și mă voi devota bineului celor ce-mi vor fi lași în grijă”.

- Edith Cavell (1866–1915) – organizatoarea primei școli moderne de îngrijiri în Belgia, după modelul Florencei Nightingale;

● 1869 – la început la Londra, Consiliul Internațional al Asistenților (I.C.N.), care organizează conferințe și congrese o dată la patru ani;

- Virginia Henderson (1897–1996) – creatoarea primei teorii științifice a nevoilor de îngrijire a omului sănătos și bolnav, cunoscută ca teoria celor 14 nevoi fundamentale ale omului (1952);

● 1988, Conferința de la Viena stabilește că misiunea asistenței este de a ajuta oamenii să-și determine și să-și atingă propriul potențial de sănătate atât prin modul de a trăi, cât și la locul de muncă.

4. Îngrijirile de sănătate în țara noastră

- medicina dacică, Zamolxis – „să vindecăm trupul o dată cu sufletul”;
- temple ale zeilor vindecători: Esculap, Hygeia;
- practica medicinei populare: valorii spirituale, boală, vrăji, descântece, superstiții, vrăci, bărbieri;
- lăcașuri tămăduitoare: bolniie, ospicii, medicina cu caracter mistic, religios pe lângă mănăstiri;
- 1292, primul azil spital la Sibiu, întemeiat de Cavalerii Cruciferi;
- spitale-azil la Bistrița, Hârnov, Codlea, drept lăcașuri de adăpost și ocrotire pentru cazuri sociale: izolarea bolnavilor contagioși, ciurmai, leproși sau bolnavi mintali;

- 1842, școala de mică chirurgie pe lângă Spitalul Colțea (București) a dr. Nicolae Kretzulescu, unificată în 1855 cu școala de felceri civili a dr. Carol Davila;
- 1859, lași, școala companiei sanitarilor organizată de dr. Iosif Ozihoc și formarea subchirurgilor, felcerilor și agenților sanitarilor;
- 1879, București, școala sursorilor de caritate după modelul Fliedner, inițiată de dr. C. Severeanu;

- 1873, Oradea, școala de moașe;
- 1901, la București are loc congresul de constituire al Societății corpului sanitar din România, președinte – subchirurgul C. Panaitescu, președintele publicației „Monitorul sanitar”;

- 1906, la București – Congresul „Asociației Generale a Corpului Sanitar” din România;

- 1919, la Cluj se deschide școala de surori de ocrotire condusă de Lucia Bologa Pușcariu, la inițiativa prof. dr. Iuliu Hațieganu;

- 1929, la Iași se organizează Institutul de Surori de Ocrotire (cu durata de trei ani), condus de Eugenia Popa;
- 1936, are loc, la Cluj, Congresul General al Surorilor de Ocrotire din România;

- 1949, la București se organizează sindicatele sanitare în cadrul cărora activează și societățile sanitare ale personalului medical sanitar;
- 1952-1974, București – apar revista „Munca medicală”;
- 1962, București – organizarea Uniunii Societăților de Științe Medicale (U.S.M.) cu o secțiune de cadre medic, care urmărirea cu precădere:
 - * cunoașterea problemelor prioritare ale asistenței medicale și a metodologiei optime de prevenire, depistare, îngrijire și recuperare precoce și eficientă,
 - * îmbunătățirea comportamentului etic și profesional în scopul creșterii responsabilității și gradului de conștiință;
- 1988 – Conferința de la Viena, prima conferință europeană dedicată îngrijirilor, la care a participat și o delegație din țara noastră cu o lucrare pregătită de un colectiv de asistente din Sibiu și susținută de Marișe Herbert, asistenta șefă a Spitalului Județean Sibiu;
- 1990, București – reorganizarea U.S.M. secțiunea cadre medic, sub denumirea de Asociația Națională a Asistenților Medicali (președintă Gabriela Bococ) și aderarea la I.C.N.;
- 1990 – constituirea Sindicatului SANITAS;
- 1992, București – prima Conferință Națională privind Educația în Nursing, cu sprijinul OMS,
- 1993, București – editarea publicației „Jurnal de nursing” și a volumului „Principiile fundamentale ale îngrijirii bolnavului” ale Virginiei Henderson;
- 1997, Delphi – întâlnirea anuală a Comitetului permanent al nurselor din Regiunea Europeană și a grupurilor de interes profesional, la care a participat, din România, Gabriela Bococ și Geia Mărza, președinta Asociației Naționale a Asistenților Medicali și, respectiv, membră a comitetului director.

Paralel cu evoluția îngrijirilor de sănătate, asistentele au întreprins studii teoretice asupra naturii practicii lor și a obiectivelor funcțiilor ce le au în societate.

Procesul de îngrijire ca metodologie proprie a nursingului a fost conceput în 1953, când a fost definit și termenul de diagnostic de îngrijire, creat ca o etapă necesară a procesului. După 1970, studiul nursingului ca știință a îngrijirilor s-a extins în Europa de Vest datorită efortului conjugat al nurselor din SUA, Anglia și a asistentelor din Franța și Canada, care au perseverat în activitatea lor, pentru identificarea funcțiilor lor, pentru clarificarea și definirea locului și rolurilor lor în echipa de îngrijire. Drept urmare, în mai 1972, la Consiliul Europei, profesioniștii îngrijirilor au fost definiți ca „persoane care au fost școlarizate și au obținut o diplomă recunoscută de statul lor, care au dreptul să asiste omul sănătos și să îngrijească omul bolnav”. Definiția a fost acceptată și însoțită la cel de-al V-lea Raport al Comitetului OMS.

Fundamentând ca pe o disciplină aparținând îngrijirilor de sănătate, Florence Nightingale a susținut că „pentru profesioniștii ei se cere o pregătire distinctă a medicului”. Urmările ei au dovedit acest lucru prin cercetarea și crearea unor modele conceptuale, care furnizează cunoștințele necesare ameliorării practicii, diferențe de ale medicului, psihologului sau asistentei sociale. Enumerăm câteva dintre aceste particularități:

■ **Hildegard Peplau, doctor** în psihologie și nursing psihiatric (1947), a facilitat introducerea programului de nursing în Belgia (1952); președintă a Asociației Nurselor din America; profesor emerit al Universității Rutgers (SUA).

■ **Faye Abdellah, director** al Serviciilor de Sănătate Publică din Washington și profesor de nursing la Universitatea Columbia, New York (1960), a identificat 21 de probleme de îngrijire pe care le cuprinde în patru domenii: confort, igienă și siguranță, echilibrul fiziologic, factori psihologici și factori socio-comunitari.

■ **Ernestine Wiedenbach, master** în Sănătate publică la Universitatea Columbia – New York și profesor emerit la Universitatea Yale (1964).

■ **Martha Rogers, master** în Sănătate publică, doctor în educație și profesor emerit al Universității Columbia – New York (1970), consideră ființa umană drept un câmp de energie care coexistă cu Universul; scopul îngrijirilor este de a menține și promova sănătatea, a preveni boala, a îngriji bolnavii și a supraviețui reabilitarea.

■ **Betty Neuman, master** în Sănătate psihiatrică și doctor în Sănătate publică la Universitatea din Los Angeles (1972), concepe individul ca un ansamblu de factori, care funcționează precum un sistem deschis; scopul îngrijirilor este de a ajuta individul, familia și grupurile de indivizi să atingă starea de bine și să o mențină la un nivel optim.

■ **Callista Roy, președinta** Departamentului de Nursing la Colegiul Saint-Mary din Los Angeles și fellow al Academiei Americane de Nursing (1976), susține că îngrijirile au scopul de a identifica tipurile de exigențe ale medicului intern și extern al individului și să-l ajute să se adapteze acestora.

Într-o formă generală, practica asistenței medicale se poate defini ca o relație de ajutor și îngrijire dinamică, în care asistenta ajută pacientul să obțină și să mențină cea mai bună stare de sănătate posibilă. Pentru a atinge acest scop, asistenta aplică în procesul de îngrijire, cunoștințe și competențe ce caracterizează profesia sa, precizate într-unul din modelele conceptuale. Normele stabilite prin asociațiile profesionale furnizează linii de conduită pentru o practică competentă de securitate și profesionalism.

Studiind mesajele antichității, ajunse până în zilele noastre, observăm perenitatea exigenței morale în exercițiul profesiei, complementul nedisociat al formării tehnice a celor care exercită arta de îngrijire a pacientului și a păstrării sănătății omului. Diferențele aspirații cărora oamenii le-au atribuit valoare morală au impregnat și tasonat, puțin câte puțin, moștenirea armonios sintetizată a marilor curente spirituale: iubirea binelui, respectul persoanei – moștenite de la gândirea greacă; respectul vieții, cultul legii sacre izvorâte din gândirea iudaică; măreția ordinii publice, forța solidarității inspirate de romani și iubirea aproapei, umilința, mila, sacrificiul ca baze esențiale ale creștinismului.

Din această sursă comună, de unde rezultă, traversând orice lucru etern, respectul vieții și al persoanei umane, s-a desprins, în afara principiilor fundamentale, percepțiile morale particulare ale membrilor echipei de îngrijire. Deși responsabilitățile lor tehnice și morale se exercită la diferite niveluri, deontologia rămâne garantul comun al caracterului relațiilor între asistentă, medic, bolnav.

Procesul de nursing

- EVOLUȚIA PROCESULUI DE NURSING
- DEFINIȚIE – CARACTERISTICI
- AVANTAJELE PROCESULUI DE NURSING
- ABILITĂȚI NECESARE UTILIZĂRII PROCESULUI DE NURSING
- CUNOȘTINȚE NECESARE PENTRU PROCESUL DE NURSING
- ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE ASISTENTĂ ÎN CADRUL PROCESULUI DE NURSING

Evoluția procesului de nursing

De-a lungul anilor, procesul de nursing a evoluat sub influența schimbărilor sociale, ajungând să devină, în prezent, o metodă științifică de lucru a asistentei medicale.

Dacă la început asistenta desfășura activități care se bazeau numai pe prescripțiile medicului, ulterior, practica nursingului s-a dezvoltat independent, devenind mai complexă.

Procesul de nursing constituie cadrul pentru practica acestuia, activitatea fiind orientată spre îngrijiri individualizate de rezolvare a problemelor pacientului. Această activitate presupune luarea deciziilor, asumarea responsabilității intervențiilor efectuate și controlul acțiunilor.

Termenul de proces de nursing a fost utilizat pentru prima dată de Hall, în 1955. Hall definește trei etape ale procesului și anume: observarea, acordarea ajutorului și validarea; stabilește că pacientul, familia și asistenta analizează și rezolvă împreună problemele pacientului. Printre cei care au contribuit ulterior la dezvoltarea procesului de nursing amintim:

■ **F. R. Kreuer, 1957** – definește trei etape ale procesului: coordonarea, planificarea și evaluarea îngrijirilor; consideră necesară implicarea familiei și a personalului auxiliar în acordarea îngrijirilor pentru creșterea calitatii a acestora.

■ **D. Johnson, 1959** – consideră că procesul de nursing constă în aprecierea situației, luarea deciziilor, implementarea acțiunilor menite să rezolve problemele de evaluare.

■ **Wiedenbach, 1963** – descrie și el trei etape în nursing: observarea, acordarea ajutorului, validarea; face referință la obligația profesională a asistentei, la natura demersului ei, la scopul principal al acțiunilor întreprinse și la necesitatea luării în considerare a tuturor factorilor implicați într-o situație.

■ **D. Bloch, 1974** – identifică cinci etape ale procesului de nursing: colectarea datelor, definirea problemei, planificarea și implementarea intervențiilor, evaluarea acestora.

■ **K. Gebbie și M. A. Levin, 1975** – inițiază o conferință națională în vederea clasificării diagnosticului de nursing; identifică cinci etape ale procesului de nursing și anume: aprecierea, diagnosticul, planificarea, intervențiile, evaluarea.

■ **S. C. Roy, 1976** – propune șase etape: aprecierea comportamentului pacientului și a influenței factorilor, identificarea problemei, obiective, intervenții și evaluare; pledează pentru utilizarea termenului de diagnostic de nursing.

În anul 1982, National Council of State Boards of Nursing, la propunerea făcută de Yura și Walsh, Mundinger și Jauron, Little și Carnevalli, Bloch și Roy (Carlson, Craft & Mc Guire, 1982); definește și descrie cinci etape ale procesului de nursing. Acestea sunt: aprecierea, analiza, planificarea, implementarea și evaluarea. În acest context, analiza este utilizată pentru a descrie o activitate de elaborare a diagnosticului de nursing.

Definiție – caracteristici

Procesul de nursing este un proces organizat și planificat, o metodă rațională de planificare și promovare a intervențiilor individualizate în scopul obținerii unei mai bune stări de sănătate pentru individ, familie, comunitate.

Fiind centrat pe pacient, el reprezintă o metodă științifică de rezolvare a problemelor actuale și potențiale ale acestuia în funcție de nevoile sale fiziologice, psihologice, socio-culturale și spirituale.

Deoarece pacientul este o entitate bine definită, aliat în situații variate, iar acțiunile asistentei sunt multiple, procesul de nursing este un proces dinamic, în fiecare etapă putând obține noi date despre pacient.

Toate etapele procesului de nursing sunt în inter-relație ceea ce-l face să fie un sistem ciclic. **Asistenta are responsabilitatea fiecărei etape.**

Procesul de nursing este transformat în acțiune prin utilizarea planului de nursing. Acesta este un document scris, ce sumarizează etapele procesului de nursing și cu ajutorul căruia se transmit fiecărei asistente date referitoare la pacient și la intervențiile efectuate. Indiferent de terminologia utilizată pentru planul de nursing, acesta trebuie să cuprindă: diagnostic de nursing, obiective, intervenții și evaluare. Planul de nursing constituie un mijloc de comunicare a informațiilor pentru toate persoanele implicate în îngrijirea pacientului, o documentație referitoare la intervențiile planificate pentru pacient.

Avantajele procesului de nursing

Pentru asistentă:

- permite luarea deciziilor pentru rezolvarea problemelor pacientului;
- evidențiază legalitatea acțiunilor;
- crește profesionalismul;
- crește responsabilitatea;
- dă satisfacție muncii.

Pentru pacient:

- beneficiază de îngrijiri de calitate în funcție de nevoi;
- are asigurată continuitatea îngrijirilor – planul fiind accesibil echipei de sănătate care are nevoie de un reper de informații pentru fiecare problemă;
- determină pacientul să participe la îngrijiri și să se preocupe de obținerea unei mai bune stări de sănătate.

Abilități necesare utilizării procesului de nursing

- cunoașterea etapelor procesului de nursing;
- conducerea unui interviu în vederea obținerii de date pertinente;
- observarea sistematică a pacientului;
- utilizarea comunicării verbale și nonverbale;
- capacitatea de a stabili o relație terapeutică;
- capacitatea de organizare a informațiilor obținute;
- capacitatea de decizie;
- competență și profesionalism în efectuarea intervențiilor;
- cunoașterea principiilor de bază pentru fiecare intervenție planificată.

Cunoștințe necesare pentru procesul de nursing

- nevoile bio-fiziologice, psihologice, socio-culturale și spirituale ale individului;
- etiologia diferitelor probleme;
- semnele caracteristice problemelor de sănătate;
- factorii de risc pentru problemele potențiale;
- valorile normale ale parametrilor de sănătate;
- resursele pentru implementarea strategiilor de nursing;
- tehnicile de nursing – aparatură și instrumentar utilizat, mod de efectuare, accidente;
- criteriile de evaluare;
- drepturile pacientului.

Activități desfășurate de asistentă în cadrul procesului de nursing

- colectarea informațiilor;
- verificarea datelor;
- stabilirea profilului pacientului;
- interpretarea datelor;
- elaborarea diagnosticului de nursing;
- stabilirea priorităților;
- stabilirea obiectivelor;
- selectarea strategiilor de nursing;
- întocmirea planului de nursing;

- liniștirea pacientului și acordarea suportului psihic;
- efectuarea intervențiilor autonome și delegate;
- aprecierea răspunsului pacientului la intervențiile efectuate;
- compararea răspunsului cu criteriile de evaluare;
- reanalizarea și modificarea planului de nursing.

Etapele procesului de nursing

- I. Aprecieri
- II. Diagnostic
- III. Planificare
- IV. Implementare
- V. Evaluare




Fig. 1 : Pacientul și procesul de nursing

I. Aprecierea

- ◆ COLECTAREA DATELOR
- ◆ VALIDAREA DATELOR
- ◆ ORGANIZAREA DATELOR
- ◆ STABILIREA PROFILULUI DE SĂNĂTATE


Aprecierea este prima etapă a procesului de nursing și constă în colectarea, validarea și organizarea datelor.

Toate deciziile și intervențiile de nursing se bazează pe informațiile obținute în această etapă, motiv pentru care este considerată foarte importantă.

Colectarea datelor începe o dată cu primul contact al pacientului cu un serviciu de sănătate și se continuă pe toată perioada acordării îngrijirilor. Scopul obținerii de date este stabilirea unui profil de sănătate al pacientului, care va constitui baza planului de nursing individualizat.

Informațiile culese trebuie să fie complete, concise, neinterpretabile. Ele vor fi consemnate succint, în termeni științifici.

Datele inexacte, incomplete și inadecvate vor face dificilă identificarea problemelor de sănătate și antrenează un diagnostic de nursing inadecvat, inexact (fig. 2).



Profilul pacientului

Profilul pacientului se conturează din informațiile culese referitoare la nivelul lui de sănătate, la schimbările în obiceiurile de viață, rolul său socio-cultural, reacțiile emoționale față de boală. Deși sunt numeroase propuneri pentru precizarea profilului pacientului, toate formulele cuprind aceleași elemente de bază, și anume:

- ◆ **informații generale:** nume, prenume, vârstă, sex, stare matrimonială, copii, ocupație, nivel de școlarizare;

- ◆ **probleme de sănătate anterioare:** bolile copilăriei, imunități, traumatisme, intervenții chirurgicale, spitalizări, alergii medicamentose;

- ◆ **starea de sănătate a familiei:** afecțiuni cardiace, diabet, HTA, afecțiuni neuropsihice;

- ◆ **comportamente față de starea de sănătate:** încrederea în serviciile de sănătate, obiceiurile îngrijirilor de sănătate, obișnuințe igienice, alimentare, de somn, consum de alcool, tutun, droguri, automedicație;

- ◆ **profilul mediului ambiantal:** caracteristici, asigurarea securității fizice și psihice;

- ◆ **profilul psiho-social și cultural:** concept de sine, stare de spirit, interacțiuni sociale, grup cultural, influențe culturale, mod de comunicare, capacitate de concentrare, memorie de scurtă și lungă durată;

- ◆ **profil spiritual:** valori, credințe, morală, practici religioase;

- ◆ **probleme de sănătate actuală:** apariția simptomelor, durată, factori declanșatori, favorizanți, agravanți, măsuri luate pentru ameliorare;

- ◆ **examenul aparatelor și sistemelor;**

- ◆ **examinări paraclinice:** radiologice, endoscopice, explorări funcționale, examene de laborator.

Surse de date

Pentru obținerea informațiilor este necesar să se utilizeze toate sursele posibile, și anume:

- ✓ **pacientul** – este considerat sursa principală: uneori datele furnizate sunt neconcludente dacă luăm în considerare faptul că unii indivizi suportă cu stoicism **durerea**, iar alții o exagerază;

- ✓ **familia și persoanele importante** în viața pacientului – în special în cazul copiilor și a pacienților înconștienți, aceștia pot suplimenta informațiile cu date despre reacția pacientului la boală și modul de adaptare la stres;

- ✓ **membrii echipei de sănătate:** medici, asistente medicale, asistenți sociali, fizioterapeuți;

- ✓ **documentația medicală:** toate de observație, carnet de sănătate;

- ✓ **literatura de specialitate:** pentru obținerea informațiilor despre diagnosticul medical.

Tipuri de date

Datele obținute pot fi: **obiective** și **subiective**. **Datele subiective** sunt cele percepute și descrise de pacient: durerea, emoțiile, oboseala. **Datele obiective** sunt cele deceleate de asistentă cu ajutorul simțurilor – schimbări fizice sau de comportament, funcțiile vitale, greutatea, înălțimea.

Toate informațiile culese mai pot fi descrise ca **date constante** sau **variabile**. De exemplu: temperatura corpului se poate modifica de la o zi la alta, în timp ce data nașterii, grupul sanguin rămân constante pe toată viața.

Metode de culegere a datelor

a) Interviu

Reprezintă dialogul dintre asistentă și pacient. Obiectivele interviului vizează:

- obținerea de informații referitoare la dimensiunea bio-fiziologică, psihologică, socio-culturală și spirituală a pacientului, reacțiile pacientului, punctele sale forte, resurse;

- începerea relației terapeutice între asistentă și pacient;
- observarea interacțiunilor pacientului cu familia și membrii echipei de sănătate;

- observarea evoluției pacientului în mediul spitalicesc;
- oferirea de informații pacientului referitoare la intervenții, tratament, examinare, pentru a-l determina să participe la stabilirea obiectivelor și planificarea intervențiilor.

Încă de la prima întâlnire cu pacientul, asistenta va începe relația printr-o convorbire liberă care constă în exprimarea formelor convenționale de politete, pentru a se crea un climat de apropiere cu bolnavul și de încredere din partea acestuia, pentru a răspunde corect întrebărilor. În continuare, succesul relației depinde de atitudinea, competența și profesionalismul asistentei.

b) Tipuri de interviu

Un interviu poate fi condus în scopul culegerii de informații pentru identificarea unei probleme sau pentru a ajuta pacientul în rezolvarea problemelor.

Tipul de interviu ce urmează a fi ales este mult influențat de personalitatea individului, de nevoile sale de sănătate, de mediu.

Interviuul direct este un interviu structural, care urmează un plan stabilit pentru obținerea informațiilor precise. În acest scop sunt utilizate întrebările închise, la care pacientul răspunde prin „da”, „nu” sau în câteva cuvinte. Exemplu: în acest moment durerea este prezentă? ai dormit bine? Răspunsurile la aceste întrebări sunt limitate, dar ele pot fi utilizate cu succes în cazul pacienților cu dificultăți de comunicare sau cu un nivel ridicat de stres.

Interviuul indirect este condus pe baza unor obiective dinainte stabilite și urmărește clarificarea unor elemente importante. Asistenta folosește, în acest tip de interviu, întrebările deschise, care permit obținerea unui răspuns mai amplu și antrenarea pacientului în această comunicare. Exemplu: cum se manifestă durerea? cum ai dormi? Astfel de întrebări oferă pacientului libertatea de a divulga informațiile pe care le dorește. Răspunsurile detaliate pot scoate în evidență atitudinile și credințele pacientului. Au însă dezavantajul că pacientul acordă uneori mult timp pentru probleme irelevante.

Indiferent de tipul de interviu, asistenta trebuie să respecte câteva reguli în formularea și punerea întrebărilor, și anume:

- formulare clară, în termeni accesibili pacientului;
- întrebarea să nu cuprindă în text răspunsul;
- să se pună numai întrebări absolut necesare;
- să nu se pună mai multe întrebări o dată;
- întrebările să fie puse într-o ordine logică,
- să se acorde pacientului timp suficient pentru a răspunde la fiecare întrebare.

c) Principii pentru un interviu eficient

Este foarte important să se planifice interviul înainte de începerea lui. Asistenta trebuie să revadă dacă informațiile pe care dorește să le obțină îi vor servi în atingerea scopului propus. Ea poate concepe un plan al interviului care să cuprindă întrebările ce urmează a le pune pacientului.

Momentul ales pentru interviu trebuie să țină cont de starea de confort fizic și psihic a pacientului. Se vor evita momentele în care pacientul prezintă durere, oboseală, are vizitator, este în timpul orei de masă sau de odihnă.

Locul desfășurării interviului trebuie să asigure intimitatea și confortul pacientului. În funcție de starea de sănătate și preferințele pacientului, interviul se poate desfășura în salon, cabinet de consultații, sala de tratament.

Durata interviului va fi precizată înainte de începerea acestuia, fie în minute, fie specificând numărul de întrebări ce urmează a-i fi puse.

În timpul desfășurării interviului asistenta va apela la **strategii de comunicare** eficace, dintre care amintim:

- ◆ **liniștea** în timpul interviului permite asistentei să observe mai atent pacientul, permite pacientului să-și organizeze gândurile, să răspundă complet la întrebări;
- ◆ **ascultarea atentă** va ajuta pacientul să înțeleagă că asistenta este preocupată de problemele sale de sănătate;
- ◆ adoptarea unei atitudini de **acceptare**, fără manifestări de aprobare sau dezaprobare, va demonstra respectarea credințelor și valorilor pacientului;
- ◆ **utilizarea parafrazei** în scopul validării informațiilor date de pacient;
- ◆ **clarificarea** informațiilor prin utilizarea de întrebări secundare;
- ◆ **rezumarea** informațiilor pentru a primi din partea pacientului confirmarea exactității lor.

Respectarea etapelor în desfășurarea interviului va facilita comunicarea cu pacientul și obținerea informațiilor pertinente:

- ✓ pregătirea interviului: revizuirea obiectivelor interviului, a tipului de informații ce urmează a fi obținute, a problemelor ce vor fi discutate, alegerea tipului de interviu;
- ✓ informarea pacientului asupra naturii, scopului și duratei interviului;
- ✓ desfășurarea propriu-zisă prin dirijarea conversației asupra problemelor ce trebuie elucidate;

- ✓ acordarea unui timp necesar pacientului să pună întrebări;
- ✓ semnalarea apropierei sfârșitului interviului: „vom termina în două minute” sau „mai am să vă pun trei întrebări”;
- ✓ stabilirea momentului pentru următorul interviu;

- ✓ încheierea interviului, mulțumind pacientului.

Când asistența pregătește bine interviul, parcurge cu abilitate fiecare etapă, ea poate obține informații pertinente asupra stării de sănătate a pacientului.

d) Observarea

Este o metodă de culegere a datelor utilizată de asistență pe parcursul întregii activități. Această metodă presupune abilități intelectuale, integritate senzorială, spirit de observație, continuitate. Pentru a fi eficace asistența va evita subiectivismul, ideile preconcepute, rutina și superficialitatea.

Observarea este direcțională atât spre pacient, cât și spre mediul său. Observarea pacientului cuprinde starea fizică, mentală și emoțională, iar cea a mediului – microclimatul, decelarea pericolelor actuale sau potențiale din mediu, factorii care facilitează starea de bine a pacientului.

Asistența poate utiliza două forme de observare:

■ **observarea intenționată** – este planificată și controlată, presupune stabilirea unor parametri de observat, este eficace în evaluarea efectelor terapeutice ale medicamentelor sau ale regimului alimentar; problemele pacientului dictează numărul parametrilor aleși și frecvența observării; de exemplu: situațiile critice în starea de sănătate a pacientului presupun observarea frecvență a multor parametri, în timp ce perioada de convalescență nu necesită observare frecventă; pentru a putea decide asupra parametrilor ce urmează a fi observați asistența are nevoie de cunoștințe și experiență clinică; se impune a se aprecia și efectele unei observări necorespunzătoare a parametrilor stabiliți.

■ **observarea neintenționată** – trebuie utilizată în orice situație, datorită faptului că apariția oricăror noi stimuli în mediul pacientului atrage după sine noi probleme pentru pacient.

Pentru o apreciere corectă a stării de sănătate a pacientului, observarea trebuie să fie continuă și obiectivă.

e) Examenul fizic

Examenul fizic constă în examinarea sistematică a pacientului, în vederea aprecierii stării sale fizice și mentale. Este un proces de investigație desfășurat alături de intervențiile de nursing.

Tehnicile clasice utilizate de asistență sunt:

● **inspecția** – examinare vizuală utilizată pentru a aprecia culoarea tegumentelor, expresiile faciale, care pot reflecta diferite emoții, modificări fizice sau comportamentale;

● **auscultația** – constă în ascultarea sunetelor produse în organism; poate fi efectuată direct (cu urechea) sau indirect (cu stetoscopul); auscultația presupune aprecierea frecvenței, intensității, duratei sunetelor;

● **palparea** – examinare efectuată cu ajutorul simțului tactil care poate sesiza de exemplu: temperatura corpului, distensia vezicii urinare, pulsul periferic.

Validarea datelor este procesul de confirmare și verificare a veridicității informațiilor obținute. De obicei, validarea este necesară când există o discrepanță între datele obiective și cele subiective, de exemplu: pacientul afirmă că se simte bine, dar mișcarea trădează contrariul. Datele pot fi validate cu ajutorul pacientului în timpul sau după culegerea datelor. Dacă el este incapabil să coopereze pentru validare, se poate apel la alte surse de date: familie, membrii echipei de sănătate. Nu toate informațiile necesită validare (de exemplu valoarea funcțiilor vitale), dar nevalidarea datelor ce impun acest proces și utilizarea unor date ireale în procesul de nursing determină stabilirea unor intervenții ineficiente.

Organizarea datelor constă în gruparea datelor în așa fel încât să faciliteze identificarea problemelor actuale și potențiale. Organizarea datelor poate fi făcută în funcție de perceperea, preferințele fiecăruia sau după un model stabilit în instituția respectivă, cum ar fi modelul V. Henderson, A. Maslow, Gordon.

a) Organizarea datelor după Gordon

✓ percepția sănătății: cum percepe pacientul starea sa de sănătate și în ce fel este afectată în prezent;

✓ starea nutrițională: obiceiurile alimentare, dacă pacientul consumă în funcție de nevoile metabolice, indicatori ai stării de nutriție;

✓ obiceiurile de eliminare: intestinală, urinară, transpirații; activitate; exerciții efectuate, mod de recreație;

✓ aspecte cognitive: capacități senzoriale și de percepție, abilități cognitive;

✓ somn: mod de relaxare, de odihnă, ore de somn, calitatea somnului;

✓ concept de sine: stimă de sine, imagine corporală, performanța rolului, Sentimente;

✓ interrelații: relații cu ceilalți;

✓ sexualitate, reproducere: satisfacții, insatisfacții, activitate de reproducere;

- ✓ adaptarea la stres: factori stresanți, toleranța la stres, metode amestres;
- ✓ credințe, valori: apartenență spirituală, comportament.

b) Organizarea datelor după A. Maslow

- ✓ nevoi fiziologice: alimentație, ingestie de lichide, eliminare intestinală și urinară, respirație și circulație, temperatura corpului, somnul;
- ✓ nevoia de securitate: securitatea fizică și psihică (confort, orientare în timp și spațiu, capacități senzoriale și motorii);
- ✓ nevoia de dragoste: rol în familie, grup social, relațiile cu persoanele semnificative din grupul căruia îi aparține;
- ✓ nevoia de stimă de sine: recunoașterea statutului, a competenței, recunoașterea, respect;
- ✓ nevoia de realizare: personalitate, creativitate, autodepășire.

Concluzii:

- Aprecierea constă în colectarea, verificarea și validarea datelor subiective și obiective despre starea de sănătate a pacientului.
- Aprecierea necesită participarea activă a pacientului și a asistentei.
- Informațiile colectate trebuie să fie complete, deoarece diagnosticul de nursing și intervențiile se bazează pe aceste informații.
- Observarea este o metodă consistentă și deliberată.
- Datele subiective sunt percepțiile personale ale pacientului.
- Datele obiective sunt cele observate și decelate de asistentă.
- Pentru obținerea informațiilor, asistentă va utiliza interviul direct sau indirect.
- Metodele de colectare a datelor sunt: comunicarea, interviul, observarea și examenul fizic (vezi vol. I, anexa 1, „Ghid orientativ de culegere a datelor pentru cele 14 nevoi fundamentale”).

II. Diagnosticul de nursing

- ◆ ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR
- ◆ IDENTIFICAREA PROBLEMELOR
- ◆ ENUNȚUL DIAGNOSTICULUI DE NURSING

Evoluția termenului de diagnostic de nursing în SUA

American Nurses Association (ANA) Standards for Nursing Practice (1973) și ANA Social Policy Practice (1980) au încurajat utilizarea în practică a termenului de *diagnostic de nursing*.

În 1973, un grup de asistente s-a reunit într-o conferință națională în vederea clasificării diagnosticului de nursing. Acest grup format din teoreticieni, educatori și practicieni au format North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Ca rezultat al activității grupului de lucru a fost publicarea, în 1982, a unei liste de diagnostice de nursing în vederea testării și studierii.

În 1986, la cea de-a șasea și a șaptea conferință a fost acceptată o listă de diagnostice de nursing utilizată și în prezent.

Carpenito alege însă atenția asupra faptului că în diagnosticul de nursing sunt cuprinse probleme care pot fi prevenite, diminuate sau combinate prin intervenții autonome ale asistentei (ex.: promovarea mobilității, educația pacientului, asigurarea igienei personale etc.) și probleme care necesită intervenții delegate și pot fi executate numai la indicația medicului (ex.: potențial de complicații – infecții, hemoragie, dezechilibru hidroelectrolitic). Incluziunea în planul de nursing a ambelor tipuri de probleme va da posibilitate asistentei să reducă focalizarea atenției numai asupra intervențiilor delegate.

Utilizarea termenului de diagnostic de nursing încurajează asistentă pentru inițierea de intervenții independente, efectuarea de cercetări asupra activității care urmează să fie implementate în funcție de diagnosticul de nursing.

Procesul de elaborare a diagnosticului de nursing

Procesul de diagnostic este unul de analiză și sinteză, care necesită din partea asistentei abilități cognitive, obiectivitate, putere de decizie și neîmplicarea valorilor și credințelor sale.

Procesul de diagnostic presupune: prelucrarea datelor, identificarea problemelor de sănătate ale pacientului, enunțul diagnosticului.

Prelucrarea — este un act de interpretare a datelor culese, validate și organizate în prima etapă a procesului de nursing. Modul de interpretare a datelor este influențat de cunoștințele teoretice despre conceptul de nursing, experiența clinică a asistentei și de abilitățile cognitive.

Identificarea problemelor

În această etapă, asistentă și pacientul identifică punctele forte ale acestuia, resursele de adaptare la o nouă situație. De obicei, pacientul are o percepție mai clară asupra slăbiciunilor sale și nu asupra punctelor sale forte care-l pot ajuta în procesul de recuperare. Exemple de puncte forte care pot ajuta pacientul ar fi: faptul că nu este fumător, că are o familie care-l acordă suport psihic, că nu este alergic, că respectă regimul igienic-dietetic prescris, integritatea pielii. Este foarte important de a se găsi aceste puncte forte deoarece ele îl pot ajuta pe suferind să facă față unei situații de criză sau stres. Amplificarea unui eveniment, numărul mare de evenimente adunate până la un moment dat, sau nefamiliarizarea pacientului cu o anumită situație pot afecta adaptarea lui.

Problemele de sănătate ale pacientului sunt identificate pe baza manifestărilor clinice – semne și simptome – reacțiile și comportamentul acestuia.

Enunțul diagnosticului de nursing

În această etapă asistenta face conexiuni între problemele de sănătate ale pacientului și factorii conecși – cei care determină schimbări în starea lui de sănătate. Factorii etiologici pot fi: factori de mediu, psihici, bio-fiziologici, sociologici, spirituali, culturali.

O problemă de sănătate poate avea mai mulți factori cauzali. Este important ca în acest moment să se stabilească dacă problema poate fi rezolvată prin intervenții independente ale asistentei. Dacă nu se poate rezolva în acest fel, asistenta trebuie să consulte membrii echipei de sănătate.

Prin includerea factorilor cauzali în diagnosticul de nursing, asistenta poate stabili strategii de îngrijire pentru pacient. De exemplu „mobilitatea inadecvată” este un diagnostic care nu sugerează direcția intervențiilor, pe când „imobilizare fizică legată de o afecțiune neuro-musculară” sugerează direcția intervențiilor spre rezolvarea problemelor.

Pentru formularea unui diagnostic asistenta se poate ghida după o listă de diagnostice acceptate, din care poate selecta categoria necesară.

Dacă în informațiile culese nu apar factori cauzali, asistenta trebuie să pună un diagnostic pe baza cunoștințelor teoretice și a experienței clinice. Trebuie apoi să revizuiască datele pentru decelarea eventualelor inadvertențe și erori.

O dată ce legăturile au fost stabilite, asistenta poate enunța diagnosticul de nursing. Acesta trebuie să denote clar o problemă de sănătate actuală sau potențială a pacientului, care poate fi rezolvată prin intervenții independente sau dependente.

Componentele diagnosticului de nursing

◆ **problema (P)** – exprimă un comportament, o reacție, o atitudine, o dificultate a pacientului față de satisfacerea nevoilor de sănătate din punct de vedere bio-fiziologic, psihologic, socio-cultural și spiritual. Termenii utilizați pentru enunțul problemei sunt: *alterare, diminuare, dificultate, deficit, reflux, incapacitate*. De exemplu: alterarea integrității tegumentelor, alterarea imaginii corporale, incapacitate de a se deplasa, dificultate în menținerea igienei personale, reflux de a se alimenta-hidrata, diminuarea mobilității fizice.

◆ **etiologia (E)** – cuprinde factorii cauzali, adică acei factori care constituie *obstacole în satisfacerea nevoilor de sănătate*. Ei pot fi:

- **de ordin fizic** – factori intrinseci (probleme metabolice, obstrucția căilor respiratorii, infecții etc.) și factori extrinseci (agenți exteriori care, în contact cu organismul, împiedică funcționarea normală – imobilizare în aparat gipsat, pansament compresiv, sonde nazo-gastrice, vezicale);

- **de ordin psihologic** – sentimente, emoții, tulburări cognitive care influențează satisfacerea nevoilor (anxietate, stres, situații de criză, tulburări de gândire);
- **de ordin sociologic** – interacțiunea cu familia, colegii de muncă, prietenii, modificări ale rolului social (sentiment de respingere, dificultăți de comunicare, somn, pensioane);
- **de ordin cultural și spiritual** – probleme de adaptare la o cultură, insatisfacții în respectarea valorilor și credințelor;
- **legati de necunoașterea modului de promovare a unei bune stări de sănătate**.

◆ **semne de dependență (S)** – semne și simptome – sunt semne observabile ale incapacității de menținere a sănătății, de satisfacere a nevoilor fundamentale (nu-si efectuează îngrijirile igiene, nu comunică cu membrii echipei de sănătate, nu respectă regimul dietetic).

Tipuri de diagnostic de nursing

Diagnosticul actual – cuprinde două elemente: problema actuală sau reacțiile pacientului la o problemă și factorii etiologici. Legătura dintre cele două elemente se realizează prin intermediul expresiei „legat de” sau „datorită”. Esențial este ca între cele două elemente să existe o conexiune.

Exemple de diagnostic actual:

- disconfort legat de durere;
- perturbarea imaginii corporale legată de pierderea unui membru;
- anxietate legată de iminența unei intervenții chirurgicale.

Diagnosticul potențial – poate fi enunțat pe baza istoricului stării de sănătate a pacientului, cunoașterea complicațiilor bolii, experiența asistentei. Astfel, un pacient care fumează 40 de țigări pe zi poate avea un diagnostic potențial postoperator: „potențial de alterare a respirației legată de fum excesiv”.

Diagnosticul posibil – poate fi utilizat pentru a evidenția un răspuns încert al pacientului sau legat de factori necunoscuți.

Erori în formularea diagnosticului de nursing

În formularea diagnosticului de nursing se pot produce erori prin:

- utilizarea terminologiei medicale în defavoarea celei specifice nursingului;
- utilizarea unui singur semn sau simptom ca răspuns al pacientului la o problemă de sănătate;
- plasarea factorilor cauzali înaintea răspunsului pacientului;
- implicarea valorilor și credințelor proprii.

Acuratețea diagnosticului de nursing depinde, de asemenea, de obținerea de informații complete și de prelucrarea obiectivă a acestor date. Dacă sunt omise date, diagnosticul poate fi un eșec, iar dacă datele nu sunt prelucrate corespunzător diagnosticul este incorect. Pentru a evita erorile de diagnostic, asistenta trebuie să se asigure că nu a omis date relevante în favoarea culegerii altora, irelevante.

Asistența poate evita omiterea de date dacă utilizează un plan organizat de culegere a informațiilor și poate evita obținerea de detalii irelevante prin punerea unor întrebări corelatizatoare situației.

Caracteristicile diagnosticului de nursing, avantaje:

- este un enunț clar și concis al problemelor pacientului;
- este specific unui pacient;
- se bazează pe datele obținute în prima etapă a procesului de nursing;
- se schimbă în funcție de modificările răspunsului pacientului la problemele de sănătate;
- lăune cont de factorii cauzali ai problemelor de sănătate;
- orientează asistența spre intervențiile specifice problemelor pacientului;
- promovează planificarea intervențiilor independente;
- facilitează comunicarea asistentei cu ceilalți membri ai echipei de sănătate.

Exemple de diagnostic de nursing (lista NANDA, 1986):

- incapacitate de menținere a sănătății;
- risc de accident;
- risc de infecție;
- alterarea mucoasei bucale;
- alterarea integrității tegumentelor;
- deficit de volum de lichid;
- alterarea nutrieii – deficit sau exces;
- hipertermie;
- hipotermie;
- alterarea eliminării urinare;
- alterarea eliminării intestinale;
- alterarea mobilității fizice;
- intoleranță la efort;
- perturbarea somnului;
- alterarea percepției senzoriale;
- durere;
- anxietate;
- perturbarea imagini corporale;
- alterarea comunicării verbale;
- alterarea comunicării nonverbale.

Exemple de factori etiologici:

- atrofie musculară;
- deficit auditiv, vizual;
- diabet zah;
- scăderea temperaturii corpului;

- oboseală;
- proces infectios sau inflamator;
- sedentarism;
- privare senzorială;
- tabagism;
- alcoolism;
- singurătate;
- șoc emoțional;
- situație de criză;
- condiții de muncă inadecvate;
- mediu necunoscut;
- spitalizare;
- lipsa intimității;
- insuficiență cunoaștere a unei alimentații echilibrată, a efectelor benefice ale exercițiilor fizice, a măsurilor de igienă etc.

Concluzii

- Un diagnostic de nursing este o problemă de sănătate actuală sau potențială, care conduce la intervenții autonome.
- Procesul de nursing este analiza și sinteza datelor.
- Abilitățile cognitive pentru stabilirea diagnosticului sunt: obiectivitate, gândire critică, putere de decizie, judecată deductivă.
- Un diagnostic de nursing trebuie să fie formulat clar, concis, centrat pe pacient, legat de o problemă, bazat pe date relevante și reale.
- Diagnosticul de nursing este baza pentru planificarea intervențiilor independente.
- Dezvoltarea taxonomiei diagnosticilor de nursing este un proces în derulare.

III. Planificarea

- ◆ STABILIREA PRIORITĂȚILOR
- ◆ STABILIREA OBIECTIVELOR
- ◆ ALEGEREA STRATEGIILOR

Planificarea este a treia etapă a procesului de nursing. În care **se aleg strategiile sau intervențiile de prevenire, reducere sau eliminare a problemelor de sănătate care au fost identificate.**

Cei care participă la planificarea strategiilor sunt: asistența, pacientul, familia și alți membri ai echipei de sănătate.

Deși planificarea este **principala responsabilitate** a asistentei, implicarea activă a pacientului și a familiei este esențială pentru eficiența planului și continuitatea îngrijirilor la domiciliu.

Planificarea utilizează datele obținute în apreciere și diagnosticele de nursing.

Procesul de planificare are patru componente:

- ✓ stabilirea priorităților;
- ✓ stabilirea obiectivelor și a criteriilor de evaluare;
- ✓ planificarea strategiilor;
- ✓ scrierea planului de nursing.

1. Stabilirea priorităților

Asistenta grupează diagnosticile de nursing în funcție de prioritățile stabilite în modelele studiate (piramida lui A. Maslow, modelul V. Henderson, modelul Gordon), fără a ignora însă importanța unor nevoi pentru fiecare pacient.

Prioritățile unui pacient însă pot să difere de cele presupuse de asistentă. De exemplu: un pacient cu un diagnostic legat de tușat și altul legat de nutriție. Asistenta poate considera prioritară problema tusei față de problema obezității, în timp ce pacientul crede că problema obezității este mai importantă.

Când există diferențe de opinie, asistenta și pacientul trebuie să discute pentru rezolvarea conflictului.

Prioritățile stabilite nu trebuie să rămână fixe, ele putând fi modificate în funcție de problemele de sănătate ale pacientului și de schimbarea terapiei medicamentelor. Asistenta trebuie să aibă în vedere faptul că problemele de sănătate se pot schimba de la o zi la alta, de la o oră la alta. De aceea este bine ca înaintea stabilirii priorităților să se facă o listă cu problemele identificate, aceasta să fie studiată atent și apoi să se decidă care sunt problemele mai importante.

Pentru stabilirea priorităților asistenta și pacientul vor ține cont de următoarele:

■ **valorile** – atitudinile și comportamentul față de sănătate pot fi foarte importante pentru asistentă, dar nu și pentru pacient. De exemplu: pentru o mamă este mai importantă prezența ei acasă lângă copil, decât starea ei de sănătate.

■ **prioritățile pacientului** – i se oferă pacientului posibilitatea de a-și stabili propriile priorități, ceea ce permite acestuia să participe la planificarea îngrijirilor și să coopereze eficient cu asistenta. Uneori, percepția pacientului despre ceea ce este important duce la conflicte cu ceea ce cunoaște asistenta despre problemele și complicațiile ce pot apărea. De exemplu: o pacientă care trebuie să fie repositionată la interval de două ore, preferă să nu fie deranjată. Asistenta știind potențialele complicații ale imobilizării la pat (escare de decubit) îi va explica necesitatea intervențiilor pentru prevenirea efectelor.

■ **resurse disponibile pentru asistentă și pacient** – dacă bani, echipamentul sanitar sau personalul sunt insuficiente, o problemă de sănătate poate fi tratată cu prioritate scăzută. Asistenta nu are, de exemplu, la domiciliu unui pacient aceleași resurse ca în spital și va fi nevoită să amâne rezolvarea unor probleme. Resursele financiare ale pacientului pot, de asemenea, influența ordinea priorităților.

■ **timpul necesar pentru alegerea strategiilor de nursing** – fiecare pacient se simte confortabil având un anumit grad de libertate a acțiunilor. Unii pot avea să discute cu familia despre problemele lor de sănătate, alții pot accepta strategii propuse de asistentă.

■ **urgenta problemelor de sănătate** – în acest sens trebuie să se aibă în vedere în ce măsură o problemă de sănătate amenință homeostazia pacientului, securitatea fizică și psihică sau gradul de dependență.

2. Stabilirea obiectivelor, tipuri de obiective

Scopul stabilirii obiectivelor este de a direcționa planificarea intervențiilor de nursing, despre care se antcipază că va produce schimbări în starea de sănătate a pacientului.

Obiectivele derivă din diagnosticele de nursing stabilite și se referă la:

■ starea fizică sau fiziologică și descriu modificări asupra cărora pacientul nu are control voluntar. De exemplu: prevenirea unor disfuncții cum sunt febra, vertijii etc.;

■ comportamentul pacientului:

- **motor** – descrie performanțe fizice și capacități care sunt sub controlul pacientului;
- **cognitiv** – descrie performanțele de înțelegere, de recunoaștere, de analiză, de achiziționare de noi cunoștințe;
- **afectiv** – descrie performanțe în exprimarea sentimentelor și emoțiilor pacientului față de starea sa de sănătate;
- **social** – descrie performanțe legate de activitatea socială și relațiile interpersonale ale pacientului.

În funcție de termenul de realizare, putem distinge:

- ◆ **obiective pe termen scurt (OTS):** ore, zile;
- ◆ **obiective pe termen mediu (OTM):** o săptămână;
- ◆ **obiective pe termen lung (OTL):** săptămâni, luni.

Exemplu: Stabilirea obiectivelor în funcție de problema de sănătate și factorii etiologici.

Diagnosticul de nursing: alterarea nutriției; exces legat de înghiștie excesivă față de activitatea desășurată.

Obiective:

- ✓ pacientul va descrie meniul zilnic care demonstrează reducerea numărului de calorii (obiectiv orientat spre cauză);
- ✓ pacientul va efectua, zilnic, exerciții fizice (obiectiv orientat spre cauză);
- ✓ pacientul va pierde în greutate patru kg în două săptămâni (obiectiv orientat spre rezolvarea problemei).

Componentele obiectivului

Un obiectiv este enunțat sub forma unei fraze care cuprinde:

- *subiectul* – cine este persoana care va realiza obiectivul (pacientul);
- *verbul de acțiune* – exprimă acțiunea ce trebuie realizată. Este un verb de acțiune care diferă în funcție de starea sau comportamentul așteptat (să intrebe, să deschidă, să identifice, să listeze, să demonstreze, să practice, să dea, să îndepinească, să exprime, să comunice, să împărtășească etc.) Este de preferat să nu se utilizeze verbe nemăsurabile cum ar fi: să aprecieze, să știe, să simtă, să accepte;

- *condiții de realizare* – se referă la modul de implicare a pacientului în realizarea acțiunii (singur, cu ajutor, cu mijloacele auxiliare, de două ori pe zi, zilnic);
- *împuf* – când va realiza pacientul acțiunea (ore, zile, săptămâni, luni).

Obiectivele trebuie formulate clar, precis, chiar dacă în unele situații nu pot fi cuprinse toate componentele.

Exemplu de formulare a obiectivului:

„pacientul să se deplaseze	singur la masă	în termen de 7 zile	
subiectul	performanță	condiții de realizare	termen

Caracteristicile obiectivului

Pentru fiecare problemă identificată pot fi stabilite unul sau mai multe obiective. Pentru ca obiectivele formulate să corespundă criteriilor de evaluare, enunțul trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- *specificitate* – să fie centrat pe un singur subiect (pacient, familie);
- *performanță* – acțiunile, atitudinile și comportamentele ce urmează a fi realizate de subiect;
- *implicare* – gradul de angajare în realizarea acțiunii;
- *realism* – să țină cont de capacitățile fizice, intelectuale și afective ale pacientului, de condițiile de mediu și de suportul pe care îl poate oferi;
- *observabil* – enunțul trebuie să cuprindă limite măsurabile exprimate în termeni referitori la distanță (10 pași), timp (două zile, de două ori pe zi), volum (2000 ml de lichid).

3. Planificarea strategiilor

Dupa stabilirea obiectivelor, asistenta alege intervențiile adecvate pentru a preveni, reduce sau combate modificările apărute în starea de sănătate a pacientului. Asistenta și pacientul pot utiliza diferite metode de generare a strategiilor de nursing cum ar fi:

- ◆ *brainstorming* – care este o tehnică utilizată de mai mult de o persoană, de obicei un grup de oameni. În acest proces, ideea unei persoane generează o idee a

altuia ș.a.m.d. Ideile nu trebuie evaluate în timp ce sunt generate. O idee este exprimată de o persoană, dezvoltată de altă persoană și modificată de o a treia persoană etc., până reiese o soluție acceptabilă. Rezultatul acestui proces sunt soluții creative;

- ◆ *ipotetizarea* – ca tehnică de predicție, în care acțiunile vor rezolva o problemă sau un obiectiv. Alternativele ipotetice sunt rezultatul cunoștințelor și experienței, fiecare alternativă propusă poate fi eficientă. Ipotetizarea nu este o ghicire deoarece alternativele au fost încercate cu succes anterior;

- ◆ *extrapolarea* – care este o deducere din date și fapte cunoscute. În această tehnică, individul sugerează o acțiune (exemplu: pacientul X suferă de insomnie; el știe că pacientul din patul vecin bea un pahar cu lapte cald în fiecare seară la ora 22 și doarme foarte bine; astfel el propune, ca soluție, să facă același lucru).

Pentru identificarea intervențiilor specifice, asistenta își va pune următoarele

întrebări:

- care este cauza problemei?
 - ce se poate face pentru minimalizarea sau combaterea cauzei?
 - cum poate fi ajutat pacientul?
- În multe situații pentru realizarea unui obiectiv există mai multe soluții. Alegerea intervenției va fi făcută ținând cont de:

- ✓ capacitățile și posibilitățile pacientului;
- ✓ gradul lui de dependență;
- ✓ vârsta;
- ✓ raționamentul științific al intervenției;
- ✓ resurse materiale și timp;
- ✓ terapie medicamentoasă;
- ✓ crearea oportunității de a învăța și educa pacientul.

Intervențiile reprezintă un complex de operații care se succed într-o ordine, acțiuni necesare menținerii, promovării sau restabilirii sănătății. Intervențiile alese nu trebuie să se limiteze doar la acțiuni de ajutor parțial sau total și de supraveghere a pacientului. Ca urmare, aprecierea, educația și consilierea pacientului vor face parte integrantă din planificarea intervențiilor.

Aprecierea – este o intervenție de identificare a problemei. Asistenta trebuie să aprecieze problema înainte de orice intervenție. De exemplu, pentru un pacient care prezintă „deficit de volum de lichid legat de ingesție insucientă de lichide”, asistenta va aprecia cât trebuie să bea pacientul pe zi, înainte de a-l încuraja să consume mai mult.

Educația – este o intervenție comună pentru multe probleme. Poate fi o intervenție specifică (să învețe pacientul să-și administreze singur insulina) sau secundară unei intervenții (să explice raționamentul drenajului postural).

Consilierea – este un ajutor necesar pentru schimbarea sau ajustarea unor comportamente și atitudini nesănătoase față de sănătate. Ea include:

- tehnici de învățare – pentru a ajuta pacientul să achiziționeze cunoștințe necesare luării deciziilor în scopul îngrijirilor de sănătate;

- suport psihic – pentru a putea face față noilor circumstanțe;
 - tehnici de educație – pentru schimbarea comportamentelor față de sănătate;
 - tehnici de comunicare terapeutică – pentru reducerea anxietății, a stresului și facilitarea unei relații de colaborare și cooperare.
- Pentru o consiliere eficientă, asistența se va consulta și cu alți membri ai echipei de sănătate.

Stabilirea intervențiilor în funcție de diagnosticul de nursing

Pentru *diagnosticul actual* – asistența va studia atent etiologia (cauza problemei) și va identifica intervențiile menite să reducă sau să combată factorii etiologici. De asemenea, se va avea în vedere o supraveghere atentă și frecventă a manifestărilor clinice a problemei.

Pentru *diagnosticul potențial* – asistența va analiza factorii care pot determina o problemă, va identifica intervenții de diminuare sau combatere a acestor factori, va supraveghea atent pacientul pentru a sesiza orice schimbare nou apărută în starea lui.

Exemplu de stabilire a intervențiilor în funcție de diagnosticul de nursing și obiectiv

Diagnostic de nursing: Potențialul de deficit al volumului de lichid legat de ingestia insuficientă de lichide.

Obiectiv: Pacientul va consuma zilnic câte 2000 ml lichid.

Intervenții: – Încurajarea pacientului să bea 2000 ml lichid astfel:

- ora 8–16 1000 ml;
- ora 18–23 700 ml;
- ora 23– 8 300 ml.

- Se va oferi pacientului ceai, sucuri, apă, lapte, după preferințe;
- Se va face bilanțul hidric;
- Se va aprecia aspectul tegumentelor și mucoaselor.

Enunțul intervenției

Că și obiectivele, intervențiile trebuie să fie centrate pe pacient, măsurabile, evaluabile. Enunțul unei intervenții va cuprinde data, ora, verbul de acțiune, locul de realizare, intervalul de timp (exemplu: pacientul va fi re poziționat în pat la interval de două ore, timp de 24 de ore) sau:

- 10.02.1999 – efectuez masaj pacientului M. N., de 3 ori/zi timp de 10 minute;
- 11.02.1999 – explic pacientului M. N., importanța mobilizării precoce după intervenția chirurgicală.

Notarea intervenției

În documentele utilizate pentru scrierea planului de nursing, intervențiile vor fi consemnate clar, complet, lizibil pentru ceilalți membri ai echipei.

4. Scrierea planului de nursing

Este etapa finală a procesului de planificare. Planul de nursing constituie un ghid care organizează informațiile despre starea de sănătate a pacientului și acțiunile asistenței. Are drept scop:

- *orientarea spre îngrijiri individualizate* – planul este întocmit pentru fiecare pacient în funcție de nevoile sale de îngrijiri; se întocmește în momentul admiterii pacientului în unitatea spitalicească după modelul standard al unității respective;
 - *promovarea continuității îngrijirilor;*
 - *evaluarea activității asistenței.*
- Planul de nursing conține o listare a următoarelor componente: manifestări de dependență, diagnostic de nursing, obiective, intervenții, evaluare.

Plan de nursing – model

Data	Aprecierea	Diagnostic de nursing	Obiective	Intervenții	Evaluare

Concluzii:

- planificarea este un proces de stabilire a strategiilor de nursing menite să prevină, să reducă sau să combată o problemă de sănătate;
- strategiile de nursing sunt planificate pe baza diagnosticului de nursing și a obiectivelor stabilite;
- componentele planificării sunt: stabilirea priorităților, stabilirea obiectivelor, stabilirea strategiilor de nursing, scrierea planului de nursing;
- prioritățile se stabilesc împreună cu pacientul;
- obiectivele trebuie să anticipeze schimbări în starea pacientului pe criterii măsurabile, evaluabile;
- aprecierea rezultatului fiecărei strategii necesită cunoștințe de nursing și experiență;
- planul de nursing furnizează direcții pentru îngrijirea individualizată a pacientului

IV. Implementarea

- ◆ CULEGEREA DE NOI DATE
- ◆ EFECTUAREA INTERVENȚIILOR

Implementarea este cea de-a patra etapă a procesului de nursing, în care planul de nursing este pus în acțiune.

Activitățile desfășurate de asistentă în această etapă sunt:

- ◆ continuarea culegerii de informații despre starea de sănătate a pacientului;
- ◆ efectuarea intervenției;
- ◆ notarea intervenției în planul de nursing;
- ◆ menținerea la zi a planului de nursing.

Continuarea obținerii de date

Când se implementează acțiunile de nursing, este foarte important ca asistaenta să continue să culegă date pertinente și să aprecieze schimbări nou apărute în starea sau comportamentul pacientului. În timpul procedurilor se pot obține date despre: starea lui fizică, starea pielii, abilitatea de a se mișca, statusul mental, utilizând comunicarea terapeutică și încurajându-l să-și exprime sentimentele.

Efectuarea intervenției

Termenii de *independentă*, *dependentă* sau *interdependentă* sunt utilizați pentru a descrie tipul unei acțiuni de nursing. În acest context, acțiunea este o activitate specifică rolului asistentei.

Intervenția independentă este o acțiune inițiată de asistentă ca urmare a cunoștințelor și priceperilor sale. Aceasta este latura autonomă a activității asistentei. De exemplu: planificarea și promovarea măsurilor de menținere a igienei personale a unui pacient.

Intervenția dependentă este o acțiune efectuată la indicația medicului. De exemplu: administrarea medicamentelor.

Intervenția interdependentă este aceea activitate stabilită în colaborare cu alți membri ai echipei de sănătate și care reflectă o relație colegială între profesioniști.

Pentru efectuarea unei tehnici, asistaenta va respecta următoarele principii:

- ◆ aprecierea necesității tehnicii și a performanței acesteia pentru pacient; asistaenta trebuie să cunoască indicațiile și contraindicațiile fiecărei proceduri; orice procedură contraindicată este aceea pentru care există motive ca răspunsul pacientului să fie negativ; în unele situații, o procedură poate fi contraindicată din cauza unor schimbări survenite în starea pacientului;

- ◆ efectuarea tehnicii cu competență: asistaenta trebuie să-și perfecționeze acțiunile și procedurile care-i sunt familiare, pe baze științifice și să cunoască raționamentul fiecărei etape;

- ◆ pregătirea locului unde se realizează acțiunea: unele tehnici presupun modificarea mediului (temperatură, lumină), necesitatea unui pat accesibil și care să permită așezarea pacientului în diferite poziții, securitate fizică pentru prevenirea accidentelor;

- ◆ asigurarea echipamentului necesar: acesta va fi ales în funcție de tehnica ce urmează a fi executată; va fi pregătit lângă patul pacientului și la îndemâna asistentei pentru a crește eficiența și a reduce timpul necesar și energia;

- ◆ asigurarea intimității pacientului: asistaenta va descoperi numai partea necesară efectuării tehnicii; va utiliza paravane de protecție; nu va face aprecieri asupra aspectului fizic al pacientului sau asupra mirosului emanat de acesta;

- ◆ pregătirea psihică a pacientului: asistaenta va explica tehnica în termeni accesibili, fără exagerări; va permite pacientului să pună întrebări; va răspunde la întrebări (atenție – pacienții sunt mai puțin capabili să facă față durerii, stresului situational, dacă nu cunosc ce-i așteaptă);

- ◆ pregătirea fizică a pacientului: aceasta presupune asigurarea poziției (când nu este capabil – ajutarea și menținerea în poziție pentru a preveni accidentele), pregătire alimentară sau medicamentasă înaintea efectuării tehnicii;

- ◆ respectarea măsurilor de asepsie: materialul și instrumentarul utilizat va fi dezinfectat sau sterilizat în funcție de cerințe; se va purta echipamentul de protecție corespunzător; spălarea pe mâini înainte și după efectuarea fiecărei tehnici;

- ◆ respectarea comportamentului obișnuit al pacientului; i se vor respecta, pe cât posibil, orele de somn, de masă; i se va acorda un timp între tehnici pentru că el să aibă sentimentul de independentă;

- ◆ îngrijirea după procedură: presupune poziție confortabilă, menținerea în repaus corespunzător, aprecierea acțiunilor de nursing sunt strâns legate de cunoștințele și priceperile asistentei. Pentru siguranța pacientului, ele trebuie să aibă un scop și baze științifice;

- ◆ acțiunile vor fi adaptate în mod individual, pacientul fiind privit în mod holistic – ca un întreg; vârsta, valorile, credința, starea de sănătate și mediul înconjurător sunt factori care pot afecta intervențiile de nursing;

- ◆ intervențiile trebuie să fie inofensive pentru pacient; asistaenta va lua măsuri de prevenire a accidentelor;

- ◆ acțiunile de nursing trebuie să respecte demnitatea pacientului; i se va asigura intimitatea și va fi implicat în luarea deciziilor referitoare la starea lui de sănătate;

- ◆ nu se vor efectua intervenții fără cunoașterea raționamentului științific;

- ◆ curățirea, dezinfectarea și sterilizarea echipamentului utilizat;

- ◆ pregătirea speciemenelor pentru laborator și completarea buletinelor de analize;

- ◆ notarea tehnicii și a incidentelor sau accidentelor.

Intervențiile stabilite în planul de nursing nu sunt fixe, ci flexibile. Ele pot fi schimbate pe baza noilor date culese de asistentă.

În cazul în care o asistentă nu poate implementa singură o intervenție va solicita ajutorul altor membri ai echipei. De exemplu: dacă asistența nu este familiarizată cu un model particular de mască de oxigen, aceasta necesită la început asistență din partea unei colige.

În implementarea intervențiilor asistența va ține cont de:

- ✓ individualitatea pacientului, fără a viola bazele științifice ale activității. De exemplu: un pacient poate prefera să ia medicație pe cale orală în loc de cea parenterală; dacă asistența știe că medicamentul respectiv este inactivat parțial de sucul gastric, îi va oferi aceste informații;
- ✓ implicarea pacientului – unii pacienți doresc să se implice total, alții doresc o implicare minoră, iar alții deloc. Aceasta depinde de energia lui, de numărul factorilor de stres, de frică, neînțelegerea bolii și a intervențiilor;
- ✓ prevenirea complicațiilor – se impune deci respectarea măsurilor de asepse și efectuarea tehnicii cu profesionalism și responsabilitate;
- ✓ asigurarea confortului fizic și psihic al pacientului.

Notarea intervenției

După efectuarea unei tehnici, aceasta va fi consemnată în planul de nursing împreună cu alte date: cum a răspuns pacientul la intervenție, ce trebuie făcut în următoarele zile, schimbarea unei anumite intervenții. Transmiterea acțiunilor de nursing se poate face și verbal.

Completarea la zi a planului de nursing

Pentru atingerea scopului pentru care a fost conceput, planul de nursing trebuie actualizat permanent, completând fiecare rubrică în parte.

Concluzii:

- acțiunile de nursing sunt strâns legate de cunoștințele și priceperile asistentei. Pentru siguranța pacientului, ele trebuie să aibă un scop și baze științifice;
- acțiunile vor fi adaptate în mod individual, pacientul fiind privit în mod holistic ca un întreg; vârsta, valorile, credința, starea de sănătate și mediul înconjurător sunt factori care pot afecta intervențiile nursing;
- intervențiile de nursing trebuie să fie inofensive pentru pacient, asistența va lua măsuri de prevenire a accidentelor;
- acțiunile de nursing trebuie să respecte demnitatea pacientului; el va fi implicat în luarea deciziilor referitoare la starea lui de sănătate;

- nu se vor efectua intervenții fără cunoașterea raționamentului științific;
- nu se vor efectua intervenții în mod mecanic, ci urmărind răspunsul pacientului;

- dacă răspunsul acestuia nu este cel scontat, se va alege o altă intervenție;
- în efectuarea unei tehnici, se va respecta protocolul stabilit.

V. Evaluarea

- ◆ STABILIREA CRITERIILOR DE EVALUARE
- ◆ EVALUAREA ATINGERII OBIECTIVELOR
- ◆ IDENTIFICAREA FACTORILOR CARE AFECTEAZĂ ATINGEREA OBIECTIVELOR

Evaluarea este cea de-a cincea etapă a procesului de îngrijire, în care se face o apreciere asupra rezultatelor obținute în starea de sănătate a pacientului în funcție de obiectivele propuse. Se face periodic, cu regularitate, la intervalele stabilite în obiectiv.

Pentru evaluare, asistența culege date obiective și subiective, care să evalueze obiectivele și le interpretează. De exemplu: frecvența respiratorie a crescut de la 12 pe minut la 18 pe minut. Datele colectate sunt comparate cu criteriile stabilite. În urma comparației există trei posibilități:

- obiectivele au fost atinse în totalitate;
- obiectivele au fost atinse parțial;
- obiectivele nu au fost atinse.

Dacă obiectivele au fost atinse, asistența va decide asupra intervențiilor ce vor fi efectuate în continuare.

Dacă obiectivele au fost atinse parțial sau nu au fost atinse, asistența va reanaliza planul de nursing, punându-și următoarele întrebări (fig. 3):

- am cules suficiente date?
- am identificat corect problema de sănătate?
- am enunțat corect diagnosticul de nursing?
- am stabilit corect obiectivele?
- am ales intervenții specifice obiectivelor?

Pentru o evaluare eficace, asistența va urmări următoarele etape:

- listarea obiectivelor;
- aprecierea capacităților pacientului în raport cu obiectivele stabilite;
- aprecierea măsurii în care au fost atinse obiectivele;
- discutarea cu pacientul a rezultatelor obținute;
- identificarea factorilor care au împiedicat progresul pacientului;
- identificarea noilor probleme apărute.

În planul de nursing, evaluarea este consemnată enunțând progresele pe care le-a făcut pacientul în funcție de obiectivele propuse (de exemplu: pacientul nu prezintă escare de decubit).

Concluzii:

- evaluarea apreciază modul de atingere a obiectivelor;
- este un proces organizat;
- determină reexaminarea planului de nursing;
- duce și la evaluarea calității intervențiilor.




Fig. 3: Schema procesului de nursing – model de realizare și reanalizare


Partea a II-a

TEHNICI

Puncțiile – generalități


Definiție	<p>Puncția este operația prin care se pătrunde într-un vas, într-o cavitate naturală sau neformată, într-un organ sau orice țesut al organismului cu ajutorul unui ac sau al unui trocar. În practică, se execută următoarele punctii: venoasă, arterială, pleurală, abdominală, pericardică, articulară, rahidiană, osoasă, a vezicii urinare, a fundului de sac Douglas, puncția biopsică și puncția unor colecții purulente.</p>
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorator</i> <ul style="list-style-type: none"> – se stabilește prezența sau absența lichidului dintr-o cavitate (pleurală, abdominală, articulară) – se recoltează lichidul din cavitate în vederea examinării pentru a se stabili natura, cantitatea și caracteristicile acestuia; în același scop se efectuează și puncțiile biopsice în diferite organe pentru a se obține fragmentele de țesuturi necesare examinărilor histopatologice. • <i>terapeutic</i> <ul style="list-style-type: none"> – evacuarea lichidului abundant din cavitate (prin ac sau prin aspirație), puncția urmîndu-se evacuatoare – administrarea de medicamente, lichide hidratante, aer sau alte soluții în scop de tratament.
Pregătirea puncției	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale</i> <ul style="list-style-type: none"> – se pregătesc materiale generale și specifice fiecărei puncții – pentru dezinfecția și protecția mâinilor – apă curentă, săpun, alcool medicinal, mănuși din cauciuc sterile – pentru dezinfecția și protecția câmpului cutanat (locul puncției) – apă, săpun, aparat de ras, alcool iodat, tinctură de iod, alcool medicinal, pense, portampon, câmpuri sterile pentru izolarea locului – pentru anestezia locală – soluții anestezice (xilină 1%), seringi sterile, ace sterile (fig. 4) – instrumente specifice puncției – ace, trocar – vase colectoare – eprubete, vase colectoare gradate, cilindru gradat, lame de microscop, sticlă de ceasornic

- materiale pentru pansarea locului puncției
 - tamponare, comprese sterile, romplast
 - materiale pentru colectarea deșeurilor
 - tăviță renală, găleți.
- **pacientul**
- pregătirea psihică constă în informarea lui, încurajarea și asigurarea confortului
 - pregătirea fizică constă în asigurarea poziției corespunzătoare fiecărei puncții.



Puncția venoasă se execută de către asistenta

a) canulă b) cateter



Scara metrică în cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Acu Vim-Silverman și mărimea medie a fragmentului biopsic.



Ac pentru puncție osasă

Fig. 4. Tipuri de ace pentru puncții

medicală, celelalte puncții fiind executate de către medic, ajutat de una-două asistente, în salon sau în sala de tratament.

Asistența

- protejează patul sau masa pe care se execută puncția
- asigură poziția corespunzătoare
- pregătește câmpul cutanat:

- dezinfecție tip I: cu tamponul ținut în alcool se badionează tegumentul timp de 30 sec. (pentru puncția venoasă)
- dezinfecție tip III: constă în spălarea regiunii, raderăa pilozității, degresare, badionarea cu alcool iodat de două ori (pentru celelalte puncții)

- supraveghează pacientul în timpul puncției
- înmânează medicului instrumentele în condiții de asepsie, participă la recoltarea și evacuarea produselor din cavitatea puncționată

- îngrijește locul puncției

Îngrijiri ulterioare
Pacientul este instalat comod în pat și supravegheat; este suplinit pentru satisfacerea nevoilor sale

Pregătirea produsului recolat
- pentru examene de laborator, eprubetele se etichetează, se completează formularele de trimitere
- se măsoară cantitatea

Reorganizarea
- materialele refolosibile se dezinfectează, se spală, se pregătesc pentru o nouă sterilizare
- deșeurile se îndepărtează

Notarea puncției
- se face în foaia de temperatură sau de observație, menționându-se cantitatea de lichid evacuat, aspectul lui, puncția albă (dacă prin puncția exploratorie nu se obține lichid, accidente și incidentele produse în timpul puncției).

■ DE ȘTIUT:

- acele și seringile de unică utilizare se verifică înainte de folosire; integritatea ambalajului, data expirării valabilității sterilizării și indicațiile de capacitate pentru seringă, de lungime și diametru pentru ace
- compresele, tamponarele sterile se pregătesc în casolete, de asemenea câmpurile chirurgicale

■ DE EVITAT:

- atingerea produsului evacuat din cavitate pentru a preveni îmbolnăvirile profesionale

PUNCTIA VENOASĂ

Definiție	Puncția venoasă reprezintă crearea unei căi de acces într-o venă prin intermediul unui ac de puncție
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorator</i> <ul style="list-style-type: none"> – recoltarea sângelui pentru examene de laborator: biochimice, hematologice, serologice și bacteriologice • <i>terapeutic</i> <ul style="list-style-type: none"> – administrarea unor medicamente sub forma injectiei și perfuziei intravenoase – recoltarea sângelui în vederea transfuzării sale – executarea transfuziei de sânge sau derivate ale sângelui – sângerare 300–500 ml în edemul pulmonar acut, hipertensiune arterială
Locul puncției	<ul style="list-style-type: none"> – venele de la plica cotului (bazilică și cefalică), unde se formează un „M” venos prin anastomozarea lor – venele antebrățului – venele de pe față dorsală a mâinii – venele subclaviculare – venele femurale – venele maleolare interne – venele jugulare și epicraniene (mai ales la sugari și copiii mici)
Pregătirea puncției	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale</i> <ul style="list-style-type: none"> – de protecție – pernă elastică pentru sprijinirea brațului, mușama, aleză – pentru dezinfecția tegumentului tip I (vezi generalități) – instrumentar și materiale sterile – ace de 25-30 mm, diametrul 6/10, 7/10, 10/10 mm (în funcție de scop), seringi de capacitate (în funcție de scop), pense, mănuși chirurgicale, tampoane – alte materiale – garou sau bandă Esmarch, eprubete uscate și etichetate, cilindru gradat, fiole cu soluții medicamentoase, soluții perfuzabile, tăviță renală (materialele se vor pregăti în funcție de scopul puncției) • <i>pacientului</i> <ul style="list-style-type: none"> – pregătirea psihică – se informează asupra scopului puncției – pregătirea fizică – pentru puncția la venele brațului, antebrațului: <ul style="list-style-type: none"> – se așază într-o poziție confortabilă atât pentru pacient, cât și pentru persoana care execută puncția (decubit dorsal) – se examinează calitatea și starea venelor având grijă ca hanțele să nu împiedice circulația de întoarcere la nivelul brațului – se așază brațul pe pernă și mușama în abducție și extensie maximă

Execuția puncției	<ul style="list-style-type: none"> – se dezinfectează tegumentele – se aplică garoul la o distanță de 7-8 cm deasupra locului puncției, strângându-l astfel încât să oprească circulația venoasă țărâ a comprimită artera – se recomandă pacientului să strângă pumnul, venele devenind astfel turgescente <p>Asistența îmbracă mănușile sterile și se așază vizavi de bolnav:</p> <ul style="list-style-type: none"> – se fixează vena cu policele mâinii stângi, la 4-5 cm sub locul puncției, exercitând o ușoară compresie, și tracțiune în jos asupra țesuturilor vecine – se fixează siringa, gradajile fiind în sus, acul atașat cu bizoul în sus, în mâna dreaptă, între police și restul degetelor – se pătrunde cu acul traversând, în ordine, tegumentul – în direcție oblică (unghi de 30 de grade), apoi peretele venos – învingându-se o rezistență elastică, până când acul înaintează în gol (fig. 5) – se schimbă direcția acului 1-2 cm în lumenul venei – se controveriază pătrunderea acului în vena prin aspirație cu siringa – se continuă tehnica în funcție de scopul puncției venoase: <ul style="list-style-type: none"> – injectarea medicamentelor, recoltarea sângelui, perfuzie – în caz de sângerare, se prelungește acul de puncție cu un tub din polietilenă care se introduce în vasul colector, garoul rămânând legat pe braț – se îndepărtează staza venoasă după executarea tehnicii prin desfacerea garoului și a pumnului – se aplică tampoanel imbibat în soluție dezinfectantă la locul de pătrundere a acului și se retrage brusc acul – se comprimă locul puncției 1-3 minute, brațul fiind în poziție verticală
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – se face toaletă locală a tegumentului – se schimbă lenjeria dacă este murdară – se asigură o poziție comodă în pat – se supraveghează pacientul
Pregătirea sângelui pentru trimiterea la laborator	<ul style="list-style-type: none"> – se face imediat (vezi generalități)
Reorganizare	




Fig. 5 - Puncția venoasă

Accidente	Intervențiile asistentei
Hematom (prin infiltrarea sângelui în țesutul perivenos)	- se retrage acul și se comprimă locul puncției 1-3 minute
Străpungerea venei (perforarea peretelui opus)	- se retrage acul în lumenul venei
Armele, paioare, lipolime	- se întrerupe puncția, pacientul se așază în decubit dorsal fără pernă, se anunță medicul

■ DE ȘTIUT: <ul style="list-style-type: none">- pentru evidențierea venelor<ul style="list-style-type: none">- se fac mișcări în sensul circulației de întoarcere cu partea cubitală a mâinii pe fața anterioară a antebrațului- se introduce mâna și antebrațul în apă caldă- pentru evidențierea venelor la care nu se poate aplica garoul se face o presiune digitală pe traiecul venei deasupra locului puncției (în sensul circulației venoase)- pentru puncționarea venelor jugulare, pacientul se așază în decubit dorsal, transversal pe pat, cu capul lăsat să atârne- prin puncția venoasă se pot fixa, pe cale transcutanată, catetere din material plastic -- ace Braunliën sau Verflons (cateterul este introdus în lumenul acului cu care se face puncția; după puncționarea venei, acul se retrage rămânând numai cateterul). Se utilizează numai materiale de unică folosință.	■ DE EVITAT: <ul style="list-style-type: none">- puncționarea venei din lateral- puncționarea venei cu acul având bizoul în jos- manevrarea incorectă a instrumentarului sterili- atingerea produsului recoltat (puncția creând o legătură directă între mediul exterior și sistemul vascular pot intra și ieși germeni patogeni)- flexarea antebrațului pe braț cu tamponul la plica cotului, deoarece împiedică închiderea plăgii venoase, favorizând revărsarea sângelui
---	--

PUNCTIA ARTERIALĂ

Definiție	Puncția arterială reprezintă crearea unei căi de acces într-o arteră prin intermediul unui ac de puncție
Scop	<ul style="list-style-type: none">• explorator<ul style="list-style-type: none">- recoltarea sângelui pentru analiza gazelor sanguine- introducerea substanțelor de contrast pentru examenul radiologic al arterelor -- arteriografie• terapeutic<ul style="list-style-type: none">- injectarea medicamentelor cu acțiune vasodilatatoare

Indicații	- arteropatii, cu scop de diagnostic și tratament
Contraindicații	- tendință crescută la hemoragii, infecții
Locul puncției	- artera femurală (fig. 6) - artera humerală - artera radială (fig. 7) - artera cubitală
Pregătirea puncției	<ul style="list-style-type: none">• materiale<ul style="list-style-type: none">- de protecție- pentru crearea câmpului cutanat, dezinfecție tip III (vezi generalități)- instrumentar și materiale sterile: ace de mărimi diferite în funcție de artera puncționată, seringi, heparinizate pentru examenul gazelor sanguine, mănuși, pense, comprese, tamponae, câmp chirurgical, seringi pentru injectarea substanțelor de contrast și anestezice- medicamente: soluții anestezice, substanțe de contrast- alte materiale: eprubete, săculeț cu nisip, țaviță renală• pacientul<ul style="list-style-type: none">- pregătirea psihică: se informează cu privire la scopul puncției, poziția în care va sta în timpul și după puncție- pregătirea fizică: pentru puncția arterei femurale, pacientul stă în decubit dorsal pe un plan tare cu coapsa în extensie; pentru puncția arterei radiale, pacientul stă în decubit dorsal cu mâna întinsă, hiperextensia articulației pumnului sprijinit pe un săculeț cu nisip- sub regiunea puncționată se așază musama și ațază
Execuția puncției	Se face de către medic, ajutat de asistenta medicală.




Fig. 6 - Puncția arterei femurale




Fig. 7 - Puncția arterei radiale

Medicul	Asistenta
– își spală și dezinfectează mâinile	– își spală și dezinfectează mâinile
– alege locul puncției	– dezinfectează locul puncției (dezinfecție tip III), prepară seringă cu medicație anestezică (după caz)
– face anestezia locală	– servește mănușile sterile
– îmbracă mănușile	– dezinfectează din nou locul puncției
– acoperă locul puncției cu câmpul steril	– servește câmpul steril
– execută puncția	– prepară seringă cu acul de puncție și le servește în mod aseptice
– reține acul de puncție	– asistenta menține pacientul în poziția dată, îl supraveghează
	– aplică tampon compresiv pe care îl ține cu pensă porttampon 5 minute
	– aplică pansament uscat pe care îl comprimă cu un săculeț cu nisip 1-5 kg în funcție de arteră

Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – rămâne la pat, în repaus, 1-6 ore în funcție de artera puncționată – se controlează locul puncției și aspectul pansamentului (roșeață, hemoragie, hematom) – se măsoară pulsul, tensiunea arterială, respirația, se apreciază culoarea și temperatura locală a tegumentelor
Pregătirea sângelui pentru examenul de laborator	<ul style="list-style-type: none"> – pentru analiza gazelor sanguine, produsul va fi ferit de contactul cu aerul, se etichetează și se trimite imediat la laborator
Reorganizarea	
Notarea puncției	
Complicații	<p>în timpul puncției</p> <ul style="list-style-type: none"> – puncționarea altor formațiuni (vase, nervi, țesuturi) – hemoragie – injectare periatenală <p>după puncție</p> <ul style="list-style-type: none"> – hemoragii – hematoame cu compresunea țesuturilor – obstrucție vasculară din cauza spasmelor, trombozelor

■ **DE ȘTIUT:**

– prin puncția arterială, se poate introduce un cateter în vederea efectuării unor explorări ale parametrilor sângelui arterial.

■ **DE EVITAT:**

– atingerea produsului, pentru a preveni îmbolnăvirea persoanelor care lucrează cu sângele

PUNCȚIA PLEURALĂ

Definiție	Puncția pleurală sau toracocenteza reprezintă stabilirea unei legături între cavitatea pleurală și mediul exterior prin intermediul unui ac.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • explorator <ul style="list-style-type: none"> – punerea în evidență a prezenței lichidului pleural – recoltarea lichidului pentru examinarea sa cantitativă și calitativă • terapeutic <ul style="list-style-type: none"> – evacuarea lichidului – administrarea medicamentelor în cavitatea pleurală (antibiotice, citostatice) după spălarea cavității
Indicații	<ul style="list-style-type: none"> – boală inflamatorie sau tumoră pulmonară, insuficiență cardiacă – însoțită de colecții lichidiene în cavitatea pleurală. Se recurge la puncție când cantitatea revărsatului pleural depășește 1,5 l și exercită o presiune asupra inimii și plămânului, împiedicându-le funcțiile
Contraindicații	<ul style="list-style-type: none"> – tuburări de coagulare a sângelui – hemofilie – tratament cu anticoagulante
Locul puncției	<ul style="list-style-type: none"> – se alege după situația și cantitatea de lichid pleural: <ul style="list-style-type: none"> – dacă lichidul este în stare liberă, puncția se face în spațiul VII – VIII intercostal pe linia axilară posterioară – dacă lichidul este închisat, puncția se face în plină matitate, zonă stabilită prin examen clinic – colecțiile purulente și tuberculoase se puncționează cât mai aproape de nivelul lor superior pentru a preîntâmpina fistulizarea lor – puncția se face deasupra marginii superioare a coastei inferioare, îndiferent de locul puncției
Pregătirea puncției	<ul style="list-style-type: none"> • materiale <ul style="list-style-type: none"> – de protecție a patului – pentru dezinfecția tegumentului – tip III – instrumente și materiale sterile: 2 – 3 ace de 10 cm lungime, cu diametrul de 1 mm, 2-3 seringi de 20 – 50 ml, seringă de 5 ml și ace pentru anestezie, pense, mănuși, câmp chirurgical, tamponare, comprese

- alte materiale: romplast, eprubete, lampă de spirit, aparate aspiratoare (Dieulafoy sau Potain), recipiente pentru colectarea lichidului, tăviță renală
 - medicamente: atropină, morfina, tonice-cardiace, soluții anestezice
 - materiale pentru reacția Rivalta: pahar conic de 200 ml, 50 ml apă distilată, soluție de acid acetic glacial, pipete
- **pacientul**
- pregătirea psihică: se informează pacientul cu privire la scopul puncției și la poziția în care va sta în timpul puncției
 - pregătirea fizică: se administrează cu 30 de minute înaintea puncției o fiolă de atropină pentru a preveni accidentele (atropina scade excitabilitatea generată și a nervului pneumogastic)
 - se așază în poziție sezând la marginea patului sau a mesei de examinare cu picioarele sprijinite pe un scăunel, cu mâna de partea bolnavă ridicată peste cap până la urechea opusă sau cu trunchiul ușor aplecat în față, cu antebrațele flectate pe brațe, cu mâinile la ceafă, coatele înainte (fig. 8)




Fig. 8 - Puncția pleurală:
a. - locul de pătrundere a acului
b. - plămân; c. revărsat pleural;
d. poziția corectă a acului

- se face de către medic, ajutor de două asistente medicale
- se desășoară în salon sau în sala de tratament


Medicul	Asistenta I	Asistenta II
	- pregătește radiografia pacientului	
	Își spală mâinile, le dezinfectează	
		- administrează o fiolă de atropină cu 30 de minute înaintea puncției - așază mușamaua și aleza pe masa de puncție - dezbracă toracele pacientului
- stabilește locul puncției		- așază pacientul în poziția corespunzătoare locului ales
	- pregătește locul puncției, dezinfecte tip II - servește seringă cu anestezic	
- efectuează anestezia		
- așteaptă efectul anesteziei	- servește mănușile chirurgicale, apoi câmpul chirurgical	- menține pacientul, îl supraveghează
- așază câmpul chirurgical în jurul toracelui, sub locul puncției		
	- servește acul de puncție adaptat la seringă - dezinfectează locul puncției	
- execută puncția, aspiră lichidul	- preia seringă cu lichid și îl introduce în eprubete - servește aparatul aspirator	- menține pacientul, îl îndrumă să-și rețină tusea, observă culoarea feței și respirația
- introduce soluțiile medicamentoase	- servește seringă cu soluție medicamentoasă în tuncție de scopul puncției	- idem

- retrage acul de puncție	- dezinfectează locul și îl comprimă cu un tampon steril	- idem
	- aplică pansament uscat fixat cu romplast	- idem
Ingrijirea ulterioară a pacientului	- asigură repausul la pat pe o perioadă prescrisă de medic	- se supraveghează pulsul, tensiunea arterială, respirația, culoarea tegumentelor, periodic
	- se informează imediat medicul în cazul apariției cianozelor, dispneei, tahicardiei, secrețiilor bronhice	
Pregătirea produsului pentru examinare	- examinarea macroscopică se face imediat, apreciindu-se culoarea, aspectul și cantitatea lichidului extras. Lichidul poate fi:	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>seros sau serochim:</i> este limpede, găben deschis, având cauze inflamatoare (tuberculoză), sau având drept cauză o tulburare circulatorie (insuficiență cardiacă, cancer pulmonar) • <i>turbure:</i> este purulent sau chilos cu aspect albicios lăptos • <i>hemoragic sau serohemoragic:</i> este roz sau roșu intens în hemoragiile pleurale și pleurezia hemoragică - se măsoară cantitatea lichidului extras - examinarea biochimică constă în reacția Rivalta: - în paharul conic se pun 50 ml de apă distilată și o picătură de acid acetic glacial, se adaugă 1-2 picături din lichidul de cercetat; <i>reacția este pozitivă</i> când picătura de lichid se transformă într-un nor ca un „fum de țigară”, ceea ce înseamnă că lichidul pleural este bogat în albumine fiind de natură inflamatorie și purtând numele de exsudat; <i>reacția este negativă</i> când picătura de lichid cade în pahar fără să producă modificări, ceea ce înseamnă că lichidul este sărac în albumine, având drept cauză tulburările circulatorii și purtând numele de <i>transsudat</i>. - pentru dozarea cantității de albumină, pentru examenul citologic și bacteriologic, eprubetele etichetate se trimit la laborator 	
Reorganizarea		
Notarea puncției		
Complicații	- hemoragii intrapleurale, rupтури pleuropulmonare	

Accidente:	Intervenții:
<ul style="list-style-type: none"> • accese de tuse, determinate de iritația pleurei • lipotimie, colaps • edem pulmonar acut, determinat de evacuarea rapidă a lichidului • pneumotorax prin rănirea plămânului cu acul 	<ul style="list-style-type: none"> - se întrerupe puncția - se suspendă tehnica, se culcă pacientul în decubit dorsal, se administrează analeptice cardiorespiratorii - se întrerupe puncția, se administrează tonice cardiace și diuretice

<p>■ DE ȘTIUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspirarea lichidului pleural se poate face alternativ cu două seringi de 20 ml, dar demontarea și adaptarea lor repetată la acul de puncție traumatizează pacientul și permite pătrunderea unei cantități necontrolabile de aer - aparatele aspiratoare înăltură neajunsul aspirației cu seringă 	<p>■ DE EVITAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evacuarea unei cantități de lichid pleural mai mare de 1000 - 1200 ml - evacuarea completă a lichidului pleural pentru a împiedica formarea aderențelor
---	---

PUNCȚIA ABDOMINALĂ (PARACENTEZA)	
Definiție	Puncția abdominală sau paracenteza constă în traversarea peretelui abdominal cu ajutorul unui trocar în diferite scopuri. În cavitatea peritoneală, se poate acumula lichid (ascită) care poate avea drept cauză: • obstacole în circulația portală, ceea ce determină hipertensiune în ramurile venei porte (în ciroza hepatică, insuficiența cardiacă, tumorile peritoneale) • inflamația (în peritonita tuberculoasă).
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorator</i> - punere în evidență a prezenței lichidului peritoneal - recoltarea lichidului și examinarea sa în laborator pentru stabilirea naturii sale • <i>terapeutic</i> - evacuarea unei colecții libere de lichid în ascitele masive - pentru efectuarea dializei peritoneale
Indicații	<ul style="list-style-type: none"> - ascitele masive care provoacă tulburări circulatorii și respiratorii prin presiunea asupra diafragmului, venei cave inferioare - ascitele care nu se resorb prin metodele obișnuite de tratament - traumatismele închise ale viscerelor abdominale, când se bănuiește hemoperitoneu

	<ul style="list-style-type: none"> – pentru diagnosticul citologic, bacteriologic și enzimatic al ascitei
Contraindicații	<ul style="list-style-type: none"> – chisturi ovariene mari, hidronefroză, sarcină; – se execută cu prudență la pacienții cu diateze hemoragice și în precomă; – colecțiile de lichid închistate se evacuează numai chirurgical.
Locul punctiei	<ul style="list-style-type: none"> – pe linia Morrie <p>Fichier – în fosa iliacă stângă, la punctul de unire a 1/3 medii cu cea mijlocie a liniei ce unește ombilicul cu spina iliacă antero-superioară stângă (fig. 9)</p>  <p>– pe linia ombilico-pubiană, la mijlocul ei</p> <p>Fig. 9 – Locul punctiei peritoneale</p>
Pregătirea punctiei	<ul style="list-style-type: none"> • materiale <ul style="list-style-type: none"> – de protecție a patului pe care se execută punctia – pentru dezinfecția tegumentului tip III – instrumente și materiale sterile: trocar gros cu diametrul de 3-4 mm cu un mandrin ascuțit și unul bont de rezervă, seringi de 5 și 20 ml, ace de 5-6 mm, bisturiu, pense hemostatice, câmp chirurgical, mănuși chirurgicale, comprese, tamponae, tuburi prelungitoare – pentru recoltarea și colectarea lichidului, eprubete, cilindru gradat, găleată gradată de 10 l – pentru îngrijirea locului punctiei – cearșaf împăturit pe lungeime, romplast – substanțe medicamentoase, anestezice locale, tonice-cardiace – paravan, tăviță renală • pacientul <ul style="list-style-type: none"> – pregătirea psihică: se informează asupra necesității punctiei, i se asigură securitatea și intimitatea – pregătirea fizică: se invită să urineze (dacă este cazul, se va ține sondeaj vezical); se dezbracă regiunea abdominală; se așază pacientul în poziție decubit dorsal în pat, peste cearșaful împăturit în lung, cu flancul stâng la marginea patului și trunchiul ușor ridicat; se măsoară circumferința abdominală
Execuția punctiei	<ul style="list-style-type: none"> – se face de către medic, ajutat de una-două asistente – se derulează în salon sau în sala de tratament

Medicul	Asistenta I	Asistenta II
Își spală mâinile, le dezinfectează		
– alege locul punctiei		– pregătește patul cu mușama, așază, cearșaf – așază pacientul în poziția corespunzătoare locului ales
	– pregătește locul punctiei, dezinfecție tip III	
	– servește seringă încărcată cu anestezic	
– face anestezia locală		– menține pacientul în poziția dată
	– servește mănușile chirurgicale medicului	
– protejează locul punctiei cu câmpul steril	– servește câmpul chirurgical	
	– dezinfectează locul punctiei	
	– servește bisturiul sau direct trocarul	
– execută incizia sau direct punctia cu trocarul, scoate mandrinul		– supraveghează permanent taciesul, respirația, starea bolnavului
	– recoltează în eprubete lichidul de ascită;	
	– servește tubul prelungitor al canulei trocarului (pentru evacuare)	
– adaptează tubul prelungitor	– supraveghează scurgerea lichidului în vasul colector	– supraveghează pacientul
	– schimbă poziția pacientului dacă se întrerupe scurgerea lichidului	
– reține trocarul		

— aplică agrață Michei dacă a folosit bisturiu pentru incizie	— dezinfectează locul puncției — face o cută a pielii — aplică pansament uscat compresiv	
	— se strânge cearsaful în jurul abdomenului, fixându-se cu ace de siguranță	

Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> — se așază comod în pat, astfel ca locul puncției să fie cât mai sus pentru a evita presiunea asupra orificiului și scurgerea lichidului în continuare — se asigură o temperatură optimă în încăperea și liniște — după 6 ore se îndepărtează cearsaful strâns în jurul abdomenului — se măsoară circumferința abdominală și se notează — se suplinește pacientul pentru satisfacerea nevoilor sale — se monitorizează pulsul, tensiunea arterială, se notează valorile înregistrate în primele 24 de ore — pansamentul se schimbă, respectând măsurile de asepsie — agrațele se scot după 48 – 72 de ore
Pregătirea produsului pentru examinare	<ul style="list-style-type: none"> — examenul macroscopic constă în măsurarea cantității de lichid evacuat, aprecierea aspectului lui, determinarea densității — reacția Rivalta (vezi punctia pleurală) — examenul citologic, bacteriologic, biochimic – eprubetele cu lichid, etichetate, se trimit la laborator
Reorganizarea	
Notarea puncției în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> — se notează cantitatea de lichid evacuat, data, ora, numele persoanei care a executat puncția — se notează circumferința abdominală înainte și după evacuarea lichidului
Accidente	<ul style="list-style-type: none"> — colaps vascular prin decompresia bruscă a cavității abdominale — hemoragie digestivă manifestată prin hematemeză, melenă — perforarea intestinului determină peritonită — persistența orificiului de puncție prin care se scurge lichid

■ **DE STIUT:**

- dacă scurgerea lichidului se oprește brusc, se restabilește prin schimbarea poziției pacientului sau se introduce mandrinul bant pentru a îndepărta o ansă intestinală sau flocoanele de fibrină care acoperă orificiul canalului trocarului
- viteza de scurgere a lichidului este de 1 l în 15 minute
- la prima paracenteză se evacuează o cantitate de maximum 4 – 5 l
- la următoarele paracenteze se pot evacua 10 l de lichid ascitic.

■ **DE EVITAT:**

- decompresia bruscă a cavității abdominale
- puncțiile evacuate repede, deoarece duc la stări de hipoproteinemie și cașecitează organismul

PUNCTIA PERICARDICĂ

Definiție	Puncția pericardică constă din pătrunderea cu un ac în cavitatea pericardică, care se transformă din spațiu virtual în cavitate reală, prin acumularea sângelui sau lichidului de transudație.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorativ</i> <ul style="list-style-type: none"> — constatarea prezenței lichidului în cavitatea pericardică — recoltarea lichidului pentru examinare în vederea stabilirii naturii sale • <i>terapeutic</i> <ul style="list-style-type: none"> — evacuarea lichidului acumulat — introducerea substanțelor medicamentoase după evacuarea lichidului
Indicații	<ul style="list-style-type: none"> — puncția se execută în cazurile în care se acumulează lichid între foițele pericardului ca urmare a inflamației, transudației sau hemoragiei; pericardul fiind inextensibil, lichidul tamponază inima și îi îngreunează funcția; apare, astfel, o dispnee accentuată, hipotensiune arterială, puncția având caracter de urgență
Locul puncției	<ul style="list-style-type: none"> — spațiul V intercostal stâng la 6 cm de marginea sternului în cazul puncției exploratoare; — spațiul VI-VII la jumătatea distanței dintre linia axilară anterioară și cea medioclaviculară stângă. În cazul în care cantitatea de lichid este mare (după un control radiologic); — la extremitatea apendicelui xifoid, bolnavul fiind în poziție semizeșând în cazul puncției evacuate (cafea epigastrică) (fig. 10)



Fig. 10 – Poziția pacientului pentru puncția pericardică

Pregătirea puncției	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale</i> <ul style="list-style-type: none"> – se pregătesc aceleași materiale ca și pentru puncția pleurală, în afara aparatelor aspiratoare – acul de puncție are o lungime de 8-10 cm • <i>pacientul</i> <ul style="list-style-type: none"> – pregătirea psihică: se informează, se încurajează – pregătirea fizică: se face un examen radiologic al toracelui, oxigenoterapie; se acordă poziția în funcție de scopul puncției și cantitatea de lichid existent • semisezând, pentru puncția evacuatoare • în decubi dorsal, în celelalte cazuri 	
	– se face de către medic, ajutat de două asistente.	
Execuția puncției		
Medicul	Asistenta I	Asistenta II
	– pregătește radiografia pacientului	– administrează o fiolă de atropină cu 30 de minute înainte
	Își spală mâinile, le dezinfectează	
		– așază materialul de protecție pe pat
		– dezbracă toracele pacientului
– stabilește locul puncției		– așază pacientul în poziția recomandată de medic
	– pregătește locul puncției, dezinfectie tip III	
	– servește siringa cu anestezic	
– efectuează anestezia		– menține pacientul în poziția dată
	– servește mănușile chirurgicale	
– așază câmpul sub locul puncției	– servește câmpul chirurgical	
	– servește siringa cu acul de puncție	

	- dezinfectează locul puncției	- menține pacientul imobilizându-i brațele
- execută puncția		
- aspiră lichidul	- preia siringa cu lichid pe care îl introduce în eprubete	- supraveghează culoarea feței, respirația, pulsul, apariția dispneei
- retrage acul de puncție	- dezinfectează locul puncției	
	- aplică pansament steril, uscat la locul puncției, fixat cu benzi de romplast	
	- așază pacientul în decubi dorsal cu toracele ușor ridicat	
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - se asigură repausul fizic și psihic - se monitorizează pulsul, tensiunea arterială, respirația - se aplică comprese reci în regiunea precordială (dacă se presupune o hemoragie intrapericardică) - se administrează tonice-cardiace 	
Pregătirea produsului pentru examinarea	- se face ca și pentru lichidul pleural	
Reorganizarea		
Notarea puncției	- se notează în foaia de observație cantitatea și aspectul lichidului extras și eventualele accidente survenite	
Accidente	Intervenții	
<ul style="list-style-type: none"> • pătrunderea acului în miocard (apar mișcări ale acului sincrone cu mișcările inimii) • fenomene de insuficiență cardiacă prin decompresia bruscă a cavității pericardice • infecții ale mediastinului prin traversarea fundului de sac pleural dacă conținutul pericardic este septic • soc pericardic 	<ul style="list-style-type: none"> - se retrage acul, dându-i o poziție paralelă cu pereții inimii (accidentul este grav dacă se ating vasele coronariene) - medicul recomandă administrarea de tonice-cardiace 	
	<ul style="list-style-type: none"> - se previne prin anestezia de bază - dacă apare, se face reanimarea cardiorespiratorie 	

■ DE ȘTIUT:

– în timpul puncției, pacientul trebuie să fie imobilizat pentru a se preveni orice deviere de la poziția dată, fapt ce poate avea urmări periculoase prin lezarea inimii sau a vaselor mari.

PUNCȚIA RAHIDIANĂ

Definiție	Puncția rahidiană reprezintă pătrunderea cu un ac în spațiul subarahnoidian, printre vertebre.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorator</i> <ul style="list-style-type: none"> – măsurarea presiunii lichidului cefalorahidian – recoltarea lichidului în vederea examenului macroscopic și de laborator – injectarea de substanțe radiopace pentru examenul radiologic al măduvei (aer sau substanțe pe bază de iod) • <i>terapeutic</i> <ul style="list-style-type: none"> – prin puncție se face decomprimarea în cazul sindromului de hipertensiune intracraniană – introducerea medicamentelor citostatice, antibioticelor sau serurilor imune în spațiul subarahnoidian • <i>scop anestezic</i> <ul style="list-style-type: none"> – introducerea substanțelor anestezice – rahianestezia
Indicații	<ul style="list-style-type: none"> – boli inflamatorii ale sistemului nervos central (meningită, encefalită), scleroză multiplă, hemoragie subarahnoidiană, tumori cerebrale – intervenții chirurgicale – cu scop anestezic
Locul puncției	<ul style="list-style-type: none"> – puncția lombară – D_{12} – L_1 sau L_4 – L_5 – puncția dorsală – D_6 – D_7 – puncția suboccipitală – între protuberanța occipitală externă și apofiza axisului, pe linia mediană
Pregătirea puncției	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale</i> <ul style="list-style-type: none"> – de protecție a mesei sau a patului – pentru dezinfecția pielii tip III – instrumente și materiale sterile, ace lungi cu diametrul 1–1,5 mm cu mandrin, seringi, ace și seringă pentru anestezie, câmpuri chirurgicale, comprese și tamponare, mănuși de cauciuc, pense hemostatice, anatomice – alte materiale: eprubete, lampă de spirt, tăviță renală, manometru Claude – medicamente – anestezice locale; pentru rahianestezie, antibiotice, citostatice, seruri imune, preparate cortizonice Materialele se aleg în funcție de scopul puncției.

• *pacientul*

– pregătirea psihică: se informează pacientul cu privire la necesitatea efectuării puncției, i se explică poziția în care va sta




Fig. 17 – Poziția pacientului pentru puncția rahidiană

– pregătirea fizică: – pacientul este ă lăun

– poziția este dată în funcție de locul puncției și starea lui

– poziția decubit lateral în pat cu spatele la marginea patului, coapsele flectate pe abdomen, băbia atinge pieptul (poziție „spate de pisică” sau asemănătoare cu cea a embrionului)

– poziție sezând pe masa de operație sau de tratament cu mâinile pe coapse, capul în hiperflexie

Pacientul este menținut în aceste poziții de asistenta medicală (fig. 17).

– se face de către medic, ajutat de una–două asistente medicale
– se desfășoară în salon, în sala de tratamente sau în sala de operație (puncția anestezică)

Medici	Asistenta I	Asistenta II
	își spală mâinile, le dezinfectează	– dezbracă pacientul – protejează patul sau masa de puncție cu mușamă, alăză
– stabilește locul puncției		– așază pacientul în poziție corespunzătoare, în funcție de starea lui și locul puncției
	– pregătește locul puncției, dezinfecte tip III	
– face anestezia locală	– servește siringa cu anestezic (dacă e cazul)	

– așază câmpul steril sub locul puncției	– servește mânușile chirurgicale – servește câmpul steril	
	– dezinfectează locul puncției – servește acul de puncție cu mandrin	
– execută puncția		– menține pacientul în poziția recomandată, susținându-i ceafa cu o mână, iar cu cealaltă împingând ușor regiunea epigastrică
– scoate mandrinul	– menține epurbele pentru recoltarea lichidului	
– măsoară tensiunea LCR	– servește manometrul Claude	
	– servește seringă cu soluțiile medicamentose pregătite	
– tetrage acul de puncție	– dezinfectează locul puncției – comprimă cu o compresă sterilă locul puncției – aplică pansament uscat fixat cu romplasi – așază pacientul în pat în poziție decubit dorsal, fără pernă	

Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – pacientul stă în decubit dorsal, fără pernă, 24 de ore – după 6 ore se poate alimenta și hidrata la pat – se supraveghează semnele vitale: puls, tensiune arterială, respirație – se informează medicul în cazul apariției unor manifestări cum ar fi: vărsături, grețuri, cefalee
Pregătirea produsului pentru examinare	<ul style="list-style-type: none"> – examinarea macroscopică se face imediat, apreciindu-se culoarea, aspectul, presiunea lichidului (normal lichidul este limpede, clar ca apa de stâncă, se scurge picătură cu picătură); în stări patologice, lichidul cefalorahidian poate fi hemoragic, purulent, xantocrom, iar viteza sa de scurgere poate crește – pentru examenul citologic, biochimic, bacteriologic lichidul este trimis la laborator
Reorganizarea	





Notarea puncției în foaia de observație	– se notează aspectul lichidului și presiunea, precum și data, ora, numele persoanei care a executat puncția
Accidente	<ul style="list-style-type: none"> – sindrom postpuncțional (amețeli, cefalee, vărsături, rahialgi), datorat hipotensiunii lichidiene provocate de puncție – hemoragii ce apar prin ac în timpul puncției, fără importanță – dureri violente în membrele inferioare, determinate de așingerea ramificațiilor <i>cozii de cal</i> sau ale măduvei spinării, cu vârfii acului – contractura țetei, gâtului sau a unui membru prin atingerea măduvei cervicale, când s-a executat puncția sub occipital – socul reflex poate duce la sincopă mortale; accidentul este foarte rar (se vor pregăti mijloacele obișnuite de reanimare)

■ DE ȘTIUT: <ul style="list-style-type: none"> – mandrinul, după scoaterea din interiorul acului, se menține steril pentru a putea fi refolosit dacă se întrerupe scurgerea lichidului în timpul recoltării (când lichidul este purulent, vâscos sau cu sfăcele de fibrină) – în cazul evacuării unei cantități mari de lichid, după puncție, pacientul se va așeza în poziție Trendelenburg – puncția suboccipitală se poate executa și pacienților ambulatori deoarece nu necesită post puncțional poziția decubit dorsal 24 de ore – dacă după câteva picături de sânge la începutul puncției apare lichidul clar, se schimbă eprubeta; la laborator se trimite lichidul limpede 	■ DE EVITAT: <ul style="list-style-type: none"> – evacuarea unei cantități mari de lichid cefalorahidian – modificarea poziției pacientului în timpul puncției (îndreptarea coloanei vertebrale) care poate determina ruperea acului și traumatizarea substanței nervoase – suprainfectarea produsului în timpul pregătirii pentru trimitere la laborator
--	---

PUNCTIA ARTICULARĂ

Definiție	Puncția articulară reprezintă realizarea unei comunicări instrumentale între cavitatea articulară și mediul extern.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>explorator</i> <ul style="list-style-type: none"> – punerea în evidență a prezenței lichidului articular (seros, purulent, sanguinolent) – recoltarea lichidului articular în vederea examinării sale ● <i>terapeutic</i> <ul style="list-style-type: none"> – evacuarea lichidului – administrarea medicamentelor în cavitatea articulară (produse cortizonice, anestezice locale, substanțe de contrast pentru examen radiologic)



Indicații	– artroză acută sau cronică, leziunile articulare însoțite de hemartroză – procese inflamatorii tegumentare în zona în care urmează a se face puncția	
Contraindicații	– se puncționează mai frecvent articulațiile: genunchiului, cotului, umărului, gleznei (fig. 12)	
Locul puncției	 puncția genunchiului	 puncția cotului
	 puncția umărului	 puncția gleznei
	Fig. 12 – Puncția articulară	
Pregătirea puncției	<ul style="list-style-type: none"> • materiale <ul style="list-style-type: none"> – de protecție a patului – pentru dezinfectia pielii tip III – instrumentar și materiale sterile: ace de 4-5 cm lungime, seringă de 5 ml pentru anestezie, ace de 8-10 cm lungime cu diametrul 0,5-2 mm pentru aspirat lichidul, pense, mănuși, câmp chirurgical, tamponare, comprese – alte materiale: romplast, feși, tăviță renală, pahar conic gradat, atele – medicamente anestezice locale – xilină 1%, medicamente antiinflamatoare, antibiotice, substanțe de contrast radiologic • pacientul <ul style="list-style-type: none"> – pregătirea psihică: se informează cu privire la scopul puncției – pregătirea fizică: se așază într-o poziție care să permită excuțarea puncției, cu articulația relaxată; eventual articulația se așază pe o pernă; se îndepărtează pilozitatea 	

Execuția puncției	– se face de către medic ajutat de una, două asistente în sala de tratament sau în salon		
	Medicul	Asistenta I	Asistenta II
	Își spală mâinile, le dezinfectează		
	– alege locul puncției (zona de maximă fluctuență)		– protejează patul sub articulația puncționată
		– pregătește locul puncției, dezinfectie tip II	– menține pacientul în poziția adecvată
	– efectuează anestezia locală	– servește seringă cu anestezic	
		– servește mănușile sterile	
	– așază câmpul sub locul puncției	– servește câmpul protector	
		– dezinfectează locul puncției	
	– execută puncția, aspiră lichidul	– servește seringă cu acul de puncție	– menține pacientul, îl supraveghează
		– colectează lichidul în vasul gradat, recoltează în eprubete	
	– retrace acul de puncție	– dezinfectează locul puncției și comprimă cu tampon steril	
		– aplică pansament compresiv la locul puncției, fixat cu fașă	
		– aplică atele care să imobilizeze articulația puncționată	
Îngrijirea ulterioară a pacientului	– se asigură repaosul regiunii – se supraveghează starea generală și semnele vitale – se supraveghează aspectul pansamentului – se menține pansamentul compresiv și imobilizarea în atelă timp de 24-48 de ore		

Pregătirea produsului pentru examinare	<ul style="list-style-type: none"> – se pregătesc eprubetele cu lichid pentru trimitere la laborator, se etichetează menționându-se examenul cerut (citologic, bacteriologic) – examenul microscopic se face imediat, măsurându-se cantitatea și apreciindu-se aspectul lichidului (seros, purulent, sanguinolent)
Reorganizarea	
Notarea punctiei în foaia de observație	– se notează cantitatea și aspectul lichidului extras
Complicații	<ul style="list-style-type: none"> • imediate – lezarea pachetului vasculonervos • tardive • infecții

■ **DE STIUT:**

- tehnica se desfășoară în condiții de asepse desăvârșită
- seroasele articulare prezintă receptivitate deosebită față de infecții

■ **DE EVITAT:**

- zonele tegumentare în care se găsesc procese inflamatoare pentru execuția punctiei

PUNCTIA OSOASĂ

Definiție	Puncția osoasă reprezintă crearea unei comunicări între mediul extern și zona spongioasă a osului, străbătând stratul său cortical, prin intermediul unui ac.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • explorator <ul style="list-style-type: none"> – recoltarea măduvei pentru examinare, în vederea stabilirii structurii, compoziției și pentru studierea elementelor figurate ale sângelui în diferitele faze ale dezvoltării lor • terapeutic <ul style="list-style-type: none"> – administrarea de medicamente lichide, hidratante și nutritive, precum și transfuzia intraosoasă; recoltarea măduvei de la persoane sănătoase în vederea transfuzării sale la un pacient
Indicații	– boli hematologice
Locul punctiei	<ul style="list-style-type: none"> – este de obicei la nivelul oaselor superficiale, ușor accesibile, cum ar fi: <ul style="list-style-type: none"> – spina iliacă posterosuperioară – creasta iliacă – sternul – manubriul sau corpul – maleolele tibiale – calcaneul

Pregătirea punctiei	<ul style="list-style-type: none"> – apofizele spinose ale ultimelor vertebre dorsale și primelor vertebre lombare 		
	<ul style="list-style-type: none"> • materiale <ul style="list-style-type: none"> – materiale pentru protecția patului – materiale pentru dezinfecție tip III – instrumentar și materiale sterile: ace de puncție Roehr, Rosegger, Klima (de cca 5 cm lungime, rezistente, cu diametrul 1-2 mm, vârful scurt, ascuțit, prevăzute cu mandrin); seringi de 10-20 ml, ace și seringă pentru anestezia locală, pense, tamponane, comprese, câmp chirurgical, mănuși, medul de cultură – alte materiale: sticlă de ceasornic, lame de microscop – medicamente: anestezice, ser fiziologic, soluții perfuzabile și medicamentele recomandate în cazul punctiei terapeutice 		
	<ul style="list-style-type: none"> • pacientul <ul style="list-style-type: none"> – pregătirea psihică: se informează cu privire la necesitatea punctiei; se explică că se va înălțura durerea prin anestezie – pregătirea fizică: se controlează, în preția punctiei, timpul de sângereare, timpul de coagulare și timpul Quick – se așază în poziția adecvată locului de puncție și anume: <ul style="list-style-type: none"> – decubit dorsal cu toracele puțin ridicat, pe un plan dur, pentru puncția sternală – decubit ventral pe un plan dur sau decubit lateral cu genunchii flectați pentru puncția în creasta iliacă; – se rade pilozitatea 		
Execuția punctiei	<ul style="list-style-type: none"> – se face de către medic ajutat de una – două asistente – se desfășoară în sala de tratamente 		

Medicul	Asistenta I	Asistenta II
Își spală mâinile, le dezinfectează		
– stabilește locul punctiei		– protejează patul
		– dezbracă reglunea
		– așază pacientul în poziție corespunzătoare locului ales
	– pregătește locul punctiei, dezinfecte tip III	
– face anestezia	– servește seringă încălcată cu anestezic	– menține poziția pacientului
	– servește mănușile chirurgicale	

— asază câmpul chirurgical	— servește câmpul chirurgical	
— execută puncția, scoate mandrinul	— dezinfectează locul puncției	— menține pacientul în poziție fixă, îl supraveghează
— adaptează seringă, aspiră 1-2 ml de măduvă	— ia mandrinul cu pensa și îl asază pe un câmp steril	
	— servește seringă pentru aspirație	
	— servește seringă cu medicamente	
— retrage acul de puncție	— dezinfectează locul puncției și face comprese-siune cu un tampon steril	
	— aplică comprese sterile pe locul puncției pe care le fixează cu benzi de compres	
	— îmbracă pacientul, îl asază comod în pat	

Îngrijirea ulterioară a pacientului	— se asigură repausul la pat, se supraveghează starea generală și semnele vitale — se observă pansamentul dacă se îmbibă cu sânge	
Pregătirea produsului pentru examinare	— este făcând de asistența de la laborator care evacuează imediat produsul aspirat din seringă pe sticla de ceasornic sau pe o lamă de sticlă mare 20/30 cm — efectuează froiturile și însămânșările pe medii de cultură	
Reorganizarea		
Notarea puncției		
Accidente	imEDIATE — puncție albă — perforație ale organelor interne (inimă, plămân) — fracturi — pneumotorax TARDIVE — hematoame — infecții ale osului (osteomielită) — tuburări de creștere la copii după puncția tibială	

■ DE ȘTIUT:

- mandrinul acului de puncție se păstrează steril pentru a încerca desfundarea acului în cazul puncției albe
- serul fiziologic se va păstra cald și va fi servit medicului în seringă dacă, deși acul a pătruns în cavitatea medulară, nu se obține măduvă; va fi introdus și apoi aspirat
- pe cale transmedulară se administrează numai soluții izotone, ritmul de administrare fiind de 15-20 picături/minut.

■ DE EVITĂT:

- manipularea incorectă a instrumentarului steril (pericol de infecții ale osului)

PUNCȚIA VEZICII URINARE

Definiție	Puncția vezicii urinare se realizează prin introducerea unui ac, pe cale transabdominală, în interiorul vezicii urinare. Este o intervenție de urgență. Se practică numai dacă vezica urinară este supradestinsă, existând pericolul ruperii ei.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>explorator</i> <ul style="list-style-type: none"> — rat — prelevarea urinei direct din vezica urinară pentru examenul de laborator, fără pericolul contaminării sale — injectarea de produse de contrast pentru examenul radiologic al vezicii urinare ● <i>terapeutic</i> <ul style="list-style-type: none"> — evacuarea urinei în cazurile de retenție acută de urină, când sondajul vezical nu poate fi executat
Indicații	<ul style="list-style-type: none"> — stricturi uretrale sau hipertrofie de prostată când încercările de pătrundere cu sonda în vezică urinară rămân fără rezultat — traumatisme uretrale sau ale vaginului când sondajul vezical este contraindicat
Locul puncției	— pe linia mediană abdominală la 2 cm deasupra simfizei pubiene (fig. 13)
Pregătirea puncției	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>materiale</i> <ul style="list-style-type: none"> — de protecție a mesei pe care se execută puncția — pentru dezinfecția locului puncției tip III — instrumente și materiale sterile: trocar subțire sau un ac pentru injecție intramusculară de 10-12 cm lungime, seringi de 2-20 ml, ace




Fig. 13 - Puncția vezicii urinare

	pentru anestezie, pense anatomice și hemostatice, tub sublingual din poliilenă, câmp chirurgical, comprese, lampoare, mănuși din cauciuc – medicamente: anestezice locale, xilină 1 % – vase colectoare, cilindru gradat, tăviță renală, eprubete – pernă tare • <i>pacientul</i> – pregătire psihică: se informează privind necesitatea puncției, se asigură securitatea și intimitatea sa prin așezarea paravanului în jurul patului – pregătirea fizică: se așază în decubit dorsal, sub bazin se introduce o pernă tare, se dezbracă regiunea abdominală – se rade părul pubian – nu urinează cu câteva ore înainte a puncției exploratoare sau dacă este puțin plină i se administrează lichide sau diuretice – se face de către medic, ajutat de una-două asistente medicale		
Execuția puncției			
Medicul	Asistenta I	Asistenta II	
	Își spală mâinile, le dezinfectează		
		– pregătește materialul de protecție	
		– așază pacientul în decubit dorsal	
– determină gradul de umplere a vezicii urinare		– dezbracă partea inferioară a corpului pacientului	
	– pregătește locul puncției, dezinfectește tip III		
– execută anestezia locală	– servește siringa încărcată cu anestezic	– menține pacientul și îl supraveghează	
– așază câmpul chirurgical sub locul puncției	– servește câmpul chirurgical		
	– servește mănușile chirurgicale		
– execută puncția	– servește acul de puncție	– idem	
– aspiră urina	– adaptează la seringă		

– adaptează tubul pentru scurgerea urinei	– recoltează urina în eprubete sterile	– idem
– reține acul de puncție	– dezinfectează locul puncției și îl comprimă	
	– aplică pansament	
	– ajută pacientul să se îmbrace	

Îngrijirea ulterioară a pacientului	– pacientul rămâne la pat, se supraveghează semnele vitale – se observă locul puncției, pansamentul, pentru a sesiza scurgerea în continuare a urinei, prin traiecul neformat
Pregătirea produsului pentru examinare	– eprubetele cu urina recoltată se etichetează și se trimt la laborator pentru urocultură – se determină volumul de urină evacuat, se măsoară densitatea acesteia
Notarea puncției	– în foaia de observație, se notează cantitatea de urină evacuată, aspectul și densitatea ei
Accidente	– puncție negativă, în cazul în care peretele abdominal prezintă un strat gros de grăsime și acul nu pătrunde profund în vezica urinară – hemoragie vezică – astuparea acului cu flocoane de fibrină sau țesuturi – infecții postpuncționale care apar tardiv – formarea de fistule urinare

■ DE ȘTIUT: – mandrinul acului se menține steril pentru a se folosi în caz de nevoie – în caz de întrerupere a scurgerii urinei se va introduce mandrinul pentru desfundarea acului – vezică urinară se golește încet și incomplet (500 ml urină) – puncția se poate repeta, la nevoie, de mai multe ori	■ DE EVITĂȚI: – comprimarea abdomenului în timpul evacuarii urinei
---	--

PUNCTIA FUNDULUI DE SAC DOUGLAS

Definiție	Puncția fundului de sac Douglas este o variantă a puncției intra-pentoneale. Prin această puncție se realizează o legătură între cavitatea peritoneală și mediul extern prin intermediul unui ac.
Scop	<ul style="list-style-type: none">• <i>explorator</i>- pentru confirmarea prezenței unei colecții lichidiene- stabilirea naturii colecției (purci, sânge, ascită)• <i>terapeutic</i>- evacuarea colecției de lichid- administrarea unor soluții medicamentoase (antibiotice)
Indicații	<ul style="list-style-type: none">- suspiciune de sarcină extrauterină- colecții purulente
Locul puncției	<ul style="list-style-type: none">- în dreapta sau în stânga colului uterin și ușor înapoia acestuia, urmărind să ajungă în regiunile parauterine; puncția se execută pe cale vaginală (fig. 14)
Pregătirea puncției	<ul style="list-style-type: none">• <i>materiale</i>- de protecție a mesei pe care se execută puncția- pentru dezinfecția mucoasei vaginale - soluție permanganat de potasiu 0,20-0,30%; alcool iodat- instrumental și materiale sterile: ace cu diametrul de 2 mm și lungi de 12-14 cm, seringi de 5-20 ml, valve vaginale, pense pentru prins colul uterin, pense lungi porttampou, sonde vezicale, eprubete sterile, tamponane, comprese din tifon, mănuși chirurgicale, câmpuri chirurgicale, canulă vaginală- alte materiale: tăviță renală, irigator- medicamente: anestezice• <i>pacienta</i>- pregătirea psihică: se informează asupra necesității puncției, se asigură că durerea este înăbușată prin anestezia locală, i se asigură intimitate- pregătirea fizică: pacienta urinează (se poate face sonda vezical)- se așază în poziția ginecologică pe masa ginecologică- se face spălătură vaginală cu soluție de permanganat de potasiu
Execuția puncției	<ul style="list-style-type: none">- se face de către medic asistat de către una sau două asistente- se desășoară în sala de tratament



Fig. 14 - Puncția fundului de sac Douglas

Medicul	Asistența I	Asistența II
<ul style="list-style-type: none">- se spală pe mâini, se dezinfectează- îmbracă mănuși chirurgicale sterile		<ul style="list-style-type: none">- ține valvele vaginale depărtate
<ul style="list-style-type: none">- introduce valvele vaginale (una superior, alta inferior)	<ul style="list-style-type: none">- servește medicul cu pensa pentru prins colul uterin	
<ul style="list-style-type: none">- pinde colul uterin cu pensa	<ul style="list-style-type: none">- preia pensa de col, o fixează cu mâna	
<ul style="list-style-type: none">- dezinfectează fundul de sac posterior al vaginului	<ul style="list-style-type: none">- servește medicul cu tampo-nul imbibat cu alcool iodat fixat în porttampou	
<ul style="list-style-type: none">- face anestezia	<ul style="list-style-type: none">- oferă seringă cu anestezic, cu acul adaptat	<ul style="list-style-type: none">- oferă acul de puncție adaptat la seringă de 20 ml pentru puncție
<ul style="list-style-type: none">- execută puncția, aspiră lichidul alternând două seringi	<ul style="list-style-type: none">- recoltează lichid în eprubetă- gosește pe rând seringile	<ul style="list-style-type: none">- idem
<ul style="list-style-type: none">- retrage acul de puncție, badionează locul puncției cu tampo-nul imbibat în alcool		
<ul style="list-style-type: none">- îndepărtează pensa de prins colul și valvele vaginale- aplică tampon vaginal		
Îngrijirea ulterioară a pacientei	<ul style="list-style-type: none">- se transportă la pat- se supraveghează pulsul, tensiunea arterială, pansamentul	
Pregătirea produsului pentru examinare	<ul style="list-style-type: none">- eprubetele cu lichidul extras se etichetează și se trimt la laborator; din lichidul purulent se fac însămănări pe medii de cultură- examen macroscopic: se examinează aspectul lichidului seros, purulent, hemoragic sau sânge pur	
Reorganizarea		
Notarea puncției în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none">- se notează cantitatea de produs extras, aspectul și conținutul lui	

PUNCTIILE BIOPSICE

Definiție	Puncția biopsică reprezintă introducerea unui ac de puncție într-un organ parenchimatous pentru recoltarea unui fragment de țesut. Puncția se practică pe ficat, splină, rinichi, ganglioni limfatici, plămâni, tumori solide.
Scop	• <i>explorator</i> – examenul histopatologic al țesutului extras pentru stabilirea diagnosticului
Indicații	– îmbolnăviri ale organelor mai sus-menționate; se face pentru confirmarea diagnosticului clinic sau pentru precizarea stadiului îmbolnăvirilor
Contraindicații	– diateze hemoragice – rinichi unic (anatomic, funcțional) – pentru puncția renală
Locul puncției	– <i>puncția hepatică</i> : – față anterioară sau laterală a ficatului pe linia mediană imediat sub rebordul costal sau în plină matitate (dacă ficatul este mărit) – de-a lungul liniei axilare posterioare în spațiul IX sau X intercostal drept (dacă ficatul se menține în limite normale sau sub aceste limite) – <i>puncția splenică</i> : spațiul VIII sau IX intercostal stâng, între linia axilară anterioară și cea medie, în afara rebordului costal – <i>puncția renală</i> : regiunea lombară, în dreptul discului intervertebral L ₁ – L ₂ la 8 cm de linia mediană; se preferă puncția rinichiului drept față de cel stâng, pentru a evita lezarea splinei sau a unor vase mari – <i>puncția ganglionară și a tumorilor solide</i> : locul se alege în funcție de masa ganglionară sau tumorală selecționată pentru examenul histopatologic.
Pregătirea puncției	• <i>materiale</i> – de protecție a mesei de operație – pentru dezinfectia pielii tip III – instrumente și materiale sterile: 2-3 ace Vim-Silverman, Menghini (pentru puncția hepatică), ace lungi de 10 cm, cu bizoni alungit (pentru puncția splenică), ace cu diametrul de 1-2 mm și lungimi diferite pentru puncția ganglionară, seringi de 5-20 ml, ace pentru anestezie, câmpuri chirurgicale, mănuși, comprese, tamponare, trusă perfuzie, pense hemostatice – alte materiale: lame de microscop, hârtie de filtru, vas cu 50 ml ser fiziologic, tăviță renală – medicamente: ionice-cardiace, hemostatice, sânge izogrup, izoRh. • <i>pacient</i> – pregătirea psihică: se informează asupra necesității puncției, a poziției în care va sta, se asigură că durerea este înălturată prin anestezie, se instruește cum să se comporte în timpul puncției

Execuția puncției	<ul style="list-style-type: none"> – pregătirea fizică: se controlează, cu câteva zile mai înainte, timpul de sângereare, timpul de coagulare, timpul de protrombină, numărul trombocitelor – se administrează cu două zile înainte puncției medicație coagulantă, tonico-capilară (vitamina C, K, preparate de calciu) care se continuă și după puncție 1-2 zile (această pregătire se face îndeosebi pentru puncția hepatică, splenică, renală) – se asigură poziția: <ul style="list-style-type: none"> – pentru puncția hepatică – decubit dorsal cu trunchiul ușor ridicat sau decubit lateral stâng cu mâna dreaptă sub cap – pentru puncția splenică – decubit dorsal cu membrele superioare pe lângă corp, necontractate sau decubit lateral drept cu mâna stângă sub cap – pentru puncția renală – decubit ventral cu un saculeț de nisip așezat sub abdomen – pentru puncția tumorilor și ganglionilor – poziția în funcție de localizarea și mărimea lor.
	<ul style="list-style-type: none"> – este făcută de către medic ajutat de două asistente – se desfășoară în sala de tratament

Medicul	Asistenta I	Asistenta II
Își spală mâinile, le dezinfectează		
– alege locul puncției	– pregătește locul puncției, dezinfectie tip III	– așază pacientul în poziție corespunzătoare locului puncției
– face anestezia locală	– servește medicului seringă cu acul pentru anestezie	– menține poziția pacientului
– protejează locul puncției cu câmpuri sterile	– servește câmpul chirurgical – servește mănușile chirurgicale sterile	
– execută puncția	– servește acul de puncție	– menține poziția pacientului
– aspiră țesutul (cu excepția puncției efectuate cu acul Vim-Silverman care este prevăzută cu obturator despicat)	– servește seringă pentru aspirație	– supraveghează pacientul pentru a sta în inspirație profundă – supraveghează pulsul, respirația, culoarea feței
– îndepărtează acul prin aspirație	– badijonează locul puncției cu tinctură de iod – aplică pansament uscat compresiv fixat cu benzi de romplast	

Recoltarea produselor biologice și patologice

GENERALITĂȚI

Importanța examinărilor de laborator	
<ul style="list-style-type: none"> - completează simptomatologia bolilor cu elemente obiective - confirmă sau infirmă diagnosticul clinic - reflectă evoluția bolii și eficacitatea tratamentului - confirmă vindecarea - semnalează apariția unor complicații - permit depistarea îmbolnăvirilor infecțioase ca și a persoanelor sănătoase purtătoare de germeni patogeni 	
Rolul asistentei	<p>asistența trebuie să respecte următoarele reguli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orarul recoltărilor - pregătirea psihică – informarea pacientului - pregătirea fizică – regim alimentar, repaus la pat, așezarea în poziție corespunzătoare în funcție de recoltare - pregătirea materialelor și a instrumentelor necesare recoltării - efectuarea tehnicii propriu-zise cu profesionalism - completarea imediată și corectă a buletinelui de analiză care va cuprinde: numele și prenumele pacientului, numărul salonului și al patului, natura produsului, analiza cerută, data recoltării - etichetarea produsului prin scriere directă pe recipient sau pe etichete bine fixate de acesta - expedierea și transportul produselor recoltate se va face astfel încât acestea să ajungă la laborator în starea în care au fost prelevate din organism - să le trimită imediat, pentru a se evita alterarea produselor recoltate, iar când se transportă în altă unitate, să le ambaleze corespunzător

Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - pacientul rămâne la pat 24-48 de ore în decubit lateral drept, pentru puncția hepatică și în decubit dorsal, după puncția splenică și renală - se supraveghează pulsul, tensiunea arterială, pansamentul timp de 24 de ore - la locul puncției se aplică pungă cu gheață - se administrează calmante ale tusei, dacă e cazul - se controlează urina 3-4 zile după puncția renală pentru a sesiza apariția hematuriei
Pregătirea materialelor extrase pentru trimiterea la laborator	<ul style="list-style-type: none"> - fragmentele de țesuturi se îndepărtează din ace prin însușirea de aer cu seringă și sunt pregătite de medic sub formă de amprente pe lama de sticlă sau sub formă de friouri - se întocmește buletinul de trimitere la laboratoruî de anatomie patologică
Reor-ganizarea	
Notarea puncției în toaia de observație	
Accidente	<ul style="list-style-type: none"> - tuse instantanee sau hemorax moderat determinat de atingerea pleurăi - hemoragie care se combate prin administrarea medicăiei hemostatice - șoc pleural

■ DE ȘTIUT:

- acele de puncție se sterilizează numai prin căldură uscată (urnezeala alterează testurile).

■ DE EVITAT:

- mișcarea pacientului în timpul puncției poate duce la ruperea acestor și lezarea organelor punctionate.

■ DE ȘTIUT:

- produsele recoltate pentru examene bacteriologice nu se amestecă cu substanțe antiseptice sau fixatoare; recipientele în care se recoltează se sterilizează la pupinei
- recoltarea produselor pentru examene bacteriologice se va face în condiții de perfectă asepse și urmărindu-se ca produsul recoltat să nu se supraîncălzeze cu germeni proveniți din aer, de pe instrumente, de la bolnavi sau de la asistentă.

RECOLTAREA SÂNGELUI

Sângele se recoltează pentru examene:

- hematologice
- biochimice
- bacteriologice
- parazitologice
- serologice.

Recoltarea se face prin:

- înțepare – la adult: pulpa degetului, lobul urechii
– la copil: fața plantară a halucelui, călcâi
- puncție venoasă
- puncție arterială.

RECOLTAREA SÂNGELUI CAPILAR PENTRU EXAMENE HEMATOLOGICE

- hemoleucogramă, hemoglobină, timp de sângerare, timp de coagulare, examen parazitologic
- grup sanguin.

Pregătire	<ul style="list-style-type: none">• <i>materiale</i>- de protecție- mănuși de cauciuc- sterile- ace, tamponare de vată, seruri test- nesterile- tavă medicală curată, cameră umedă, lame uscate, curate, degresate, șlefuite, pipete Potan- soluții dezinfectante – alcool 90°• <i>pacient</i>- pregătire psihică:<ul style="list-style-type: none">- se anunță să nu mănânce- i se explică necesitatea efectuării tehnicii- pregătire fizică:<ul style="list-style-type: none">- se așază în poziție șezând cu mâna sprijinită
Execuție	<ul style="list-style-type: none">- se aseptizează pielea degetului inelar sau mediu cu un tampon cu alcool 90°- se evită congestionarea printr-o frecare puternică și prelungită- se așteaptă evaporarea alcoolului- cu o mișcare bruscă se înțepă pielea pulpei degetului în partea laterală a extremității, perpendicular pe straturile cutanate- se șterge cu un tampon uscat prima picătură, se lasă să se formeze o altă picătură de sânge din care se recoltează cu pipeta sau lama- se șterge cu un tampon cu alcool

Pregătirea produsului pentru laborator - efectuarea frotiului (fig. 15)

- la extremitatea unei lame se pune o picătură de 3-4 mm diametru
- se așază o lamelă cu marginile șlefuite în unghi de 45° cu lama (picătura se întinde prin capilaritate)
- lamela se ține către partea liberă a lamei, păstrând aceeași înclinare și antrenând toată picătura fără să o fragmenteze
- se agită lama pentru uscare
- se etichetează și se trimite la laborator




Fig. 15 - Efectuarea frotiului

RECOLTAREA SÂNGELUI VENOS PENTRU EXAMENELE HEMATOLOGICE

Sedimentarea:

- așezarea progresivă a elementelor figurate spre fundul eprubetei din sânge necoagulabil lăsat în repaus (trecimen fizic).
- Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH):
 - rapiditatea cu care se produce depunerea lor.

Pregătire pentru VSH	<ul style="list-style-type: none">• <i>materiale</i>- sterile- seringă de 2 ml uscată- soluție de citrat de Na 3,8%- ace pentru puncția venoasă- nesterile- stativ și pipete Westergreen- pernuță, musama, eprubete, tăviță renală, garou, vată- soluții dezinfectante- alcool 70°• <i>pacient</i>- pregătire psihică:<ul style="list-style-type: none">- i se explică, cu 24 de ore înaintea, necesitatea efectuării examenului- pregătire fizică:<ul style="list-style-type: none">- se anunță să nu mănânce- să păstreze repaus fizic
Execuție	<ul style="list-style-type: none">- asistența se spală pe mâini cu apă și săpun- îmbracă mănuși de cauciuc sterile- aspiră în seringă 0,4 ml citrat de Na 3,8%- puncționează vena fără garou și aspiră sânge până la 2 ml (1,6 ml)

	<ul style="list-style-type: none"> - retrage acul și aplică tampon cu alcool - scurge amestecul sânger-citrin în eprubetă și omogenizează lent - așază eprubeta în stativ - îngrijește pacientul (vezi punctia venoasă)
Pregătirea produsului pentru laborator	<ul style="list-style-type: none"> - se completează buletinul - se etichetează produsul - se aspiră cu pipeta Westergreen până la gradajul 200 și se așază în stativ pe dopul de cauciuc, în poziție strict verticală (când examenul se face la patul bolnavului)


Hematocrit	Recollarea sângelui pentru determinarea hematocritului (VET) se face prin punctie venoasă. Se recoltează 2 ml de sânge pe cristale de EDTA (acid etilen diaminetetraacetic 1%) - 0,5 ml soluție, uscată prin evaporare.
Rezistența globulară	<ul style="list-style-type: none"> - se recoltează sângele pentru obținerea globulelor roșii - se evită hemoliza și coagularea sângelui - sângele recoltat (5-6 ml) se trece imediat într-un balon Erlenmeyer de 100 ml în care s-au pus 5-10 perle de sticlă - se agită ușor balonul timp de 5-10 minute cu mișcări circulare - sângele se defibrinează și nu se mai coagulează - se trimite imediat la laborator.

Examenul cerut	Mod de prelevare	Interpretarea rezultatelor
1	2	3
Hemoleuco-grama	înțeparea pulpei degetului	eritrocite 4,5 - 5,5 mil./mm ³ - bărbați 4,2 - 4,8 mil./mm ³ - femei reticulocite 10-15% hemoglobină 15 ± 2 g/100 ml - bărbați 13 ± 2 g/100 ml - femei leucocite 4200-8000/mm ³ din care: - polinucleare neutrofile nesegmentate: 0-5% - polinucleare neutrofile segmentate: 45-70% - eozinofile 1-3% - bazofile 0-1% limfocite 20-40% monocite 4-8% trombocite 150-400 000/mm ³
Constante eritrocitare	se recoltează și VET	Hb. eritrocitară medie HEM = 25 - 33 ug. Concentrația eritrocitară medie Hb. CHEM.: 32-37 g% Valoarea globulară (VG)=1 Volum eritrocitar mediu (VEM): 83-97 cm ³
VSH		1-10 mm/1 h { bărbați 7-15 mm/2 h

1	2	3
		2-13 mm/1 h 12-17 mm/2 h { femei
VET		46±6% bărbați 41±5% femei
Rezistența globulară		0,42-0,34%

DE ȘTIUT:

- un frotiu bun este fără goturi, cu un strat regulat
- frotiul de sânge se face numai cu sânge proaspăt
- recoltarea VSH-ului se face numai cu seringă și acul uscat (apa produce liza hematiilor) și numai cu seringă de 2 ml
- pentru examenul în *picătură groasă* (fig. 16) sângele se recoltează sub formă de picătură groasă
- se recoltează pe țecare exterminată a lamei câte 2-3 picături cât mai apropiate între ele
- cu colțul unei lame șlefuite se amestecă picăturile formând o pată circulară cu diametrul de aproximativ 1 cm
- se continuă amestecarea picăturilor până se formează un tnc cheag -- semnul unei defibrinări complete
- uscarea frotiului se face prin agitarea lamei
- numele bolnavului și numărul buletinului de analiză se înscriu direct pe lamă cu creion dermatograf
- picătura groasă se execută pentru punerea în evidență a plasmodiilor malariei (recoltarea se face în cursul accesului febril când numărul paraziților în sânge este foarte mare)



RECOLTAREA SÂNGELUI PENTRU EXAMENE BIOCHIMICE

- Se efectuează prin punctie venoasă, dimineața, bolnavul fiind „à jeun”.
- Se recoltează 5-10 ml sânge simplu, pentru a determina:

Felul analizei	Modul de prelevare	Interpretarea rezultatelor
uree sanguină	5-10 ml. p.v.	0,20-0,40 gr/1000 ml
acidul uric	"	2-6 mg %
creatinină	"	0,6-1,20 mg %
bilirubină	"	T=0,6-1 mg % D=0,1-0,4 mg %

Felul analizei	Modul de prelevare	Interpretarea rezultatelor
colesterol	"	1,80-2,80 gr %
lipemie	"	600-800 mg%
teste de disproteinemie	"	Takata-Ara-negativ R.Tymol=0-4 u ML ZnSO ₄ =0-8 u SH
fosfatază alcalină	"	2-4 u Bodansky
transaminază	"	TGO=2-20 ui TGP=2-16 ui
amilază	"	8-32 uW (Wolgemuth)
electrolizează	"	Pct = 75±10 gr % A _f = 40-50 g% G _i = 20% (R _G = 1,5-2) $\alpha_1 = 4$ $\alpha_2 = 8$ $\beta = 12$ $\gamma = 16-18\%$
calcemie	"	9-12 mg%; 4,5-5,5 mEq/l
sideremie	recoltare direct în eprubetă cu ac de platină	100-160/100 ml
rezervă alcalină	5-10 ml sânge în sticlufte heparinate	58-65 vol. %
ionograma sanguină	"	Na ⁺ =137-152 mEq/l. K ⁺ =3,8-5,4 mEq/l. Cl ⁻ =94-111 mEq/l. Ca ⁺⁺ =4,5-5,5 mEq/l.
glicemia	2 ml sânge/fiorură Na 4 mg	0,80-1,20 gr%
fibrinogen	0,5 ml citrat de Na 3,8% și 4,5 ml sânge	200-400 mg%
timp de protrombină	0,5 ml oxalat de K 4,5 ml sânge	timpi: T.Quick=12"-14" T.Howell=1'30"-2'30"

RECOLTAREA SÂNGELUI PENTRU EXAMENE SEROLOGICE

Examenetele serologice relevă prezența sau absența anticorpilor în serul bolnavului.

Aceste examene se utilizează pentru diagnosticarea bolilor infecțioase (tifos exantematic, febră tifoidă, sifilis).
Recoltarea sângelui se face prin puncție venoasă, direct în eprubetă (fără seringă), într-o cantitate de 5-10 ml.
După coagulare, se desprinde cheagul de pe perețele eprubetei și după 30 de minute, se decantează serul într-o eprubetă direct sau prin aspirare cu o pipetă Pasteur sterilă.
Serul nemolizat are o culoare gălbuiă, cel hemolizat este roz.

- R. Weill-Felix – pentru diagnosticul tifosului exantematic
- R. de precipitare sau floculare ca: Clucho, Kahn, Menike și R. de microfloculare pe lamă VDRL – în diagnosticul sifilisului
- R. de fixare a complementului R Bordet-Wassermann, pentru diagnosticul sifilisului
- Dozarea antistreptolizinelor ASLO – diagnosticarea FAA – scarlatină
- R. Water-Rose – diagnosticarea P.R. (poliartrita reumatoidă)
- R. de hemaglutinare, hemaglutinohibare – diagnosticarea unor viroze
- R. Widal și aglutinarea „V” – în diagnosticul febrei tifoidă și paratifoide

RECOLTAREA SÂNGELUI PENTRU EXAMEN BACTERIOLOGIC HEMOCULTURA

Definiție	Scop	Pregătire
Hemocultura înseamnă introducerea sângelui pe un mediu de cultură pentru examen bacteriologic.	– descoperirea bacteriilor atunci când se suspectează: ~ o septicemie cu stafilococ, meningococ, bacil Koch (bolnavul are febră ridicată cu oscilații mari, frison, stare generală alterată) – o bacteriemie: febră tifoidă, bruceloză, endocardită malignă subacută	<ul style="list-style-type: none"> • materiale – de protecție – mască de tifon, mănuși sterile – sterile – seringă a 20 cm³ – ace pentru puncție venoasă – cazoletă cu pense – tamponare și comprese – câmp, apă și săpun – medii de cultură – două recipiente cu: – bulion citrat – geloză semilichidă – nesterile – lampă de spir – chibrituri

- soluții dezinfectante
- alcool iodat
- tinctură de iod
- eter
- *pacient*
- pregătire psihică:
 - se anunță și se explică necesitatea tehnicii
- pregătire fizică:
 - se spală regiunea plicii cotului
 - se degresează cu eter
 - se aseptizează cu alcool

Execuție	
Asistenta I	Asistenta II
- îmbracă mănuși sterile	- spală, degresează și dezinfectează regiunea
- așază câmpul steril	
- aseptizează regiunea cu iod	
	- aplică garoul la 10-12 cm de locul puncției
	- aprinde lampa de spirit
	- îmbracă mănuși sterile
	- servește seringă în condiții aseptice
- la seringă și efectuează puncția venoasă	
- aspiră 20 ml de sânge	
	- deface garoul
- retrage seringă	
	- aseptizează locul puncției
	- flambează după și gura balonului
- înșămânțează: <ul style="list-style-type: none"> - 2 ml în eprubetă cu geloză; - 10 ml în bulionul citrat. 	
- omogenizează prin mișcări de înclinare și redresare	- flambează din nou gura balonului după și închide eprubeta

Pregătirea produsului pentru laborator	<ul style="list-style-type: none"> - se etichetează cu data, ora, temperatura (se pot recolta mai multe probe în 24 h) - se trimite imediat la laborator și se pun la termostat la 37°C - se notează în foaia de observație data și numele persoanei care a recoltat
Reorganizare	

■ DE ȘTIUT:

- pentru înșămânțarea cu germeni anaerobi, eprubeta cu geloză semilichidă se încălzește la bain-marie timp de 30 minute.
- în timpul înșămânțării, balonul sau eprubeta cu mediu de cultură se păstrează înclinată
- flambearea se face fără a încălzi mediul de cultură
- materialele necesare se sterilizează la pupinel
- înșămânțarea se face imediat pentru a evita coagularea sângelui
- hemocultura se efectuează la debutul bolii și înainte de administrarea antibioticelor
- Hemocultura poate fi completată cu coprocultură, urocultură etc.

RECOLTAREA SÂNGELUI VENOS CU SISTEMUL VACUTAINER

Avantaje	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizarea acestei metode de prelevare asigură: <ul style="list-style-type: none"> - confortul pacientului; - calitatea probei de sânge; - securitatea personalului medical.
Pregătire	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materiale</i> <ul style="list-style-type: none"> - holder - un tub de material plastic care prezintă, la partea superioară, amboul la care se atășază acul de puncție prin infilțare, iar la partea inferioară două anipioare; - acul de puncție protejat de carcasa bicoloură; - tuburi vacuumtainer cu dopuri de diferite culori convenționale; - materiale necesare efectuării puncției venoase. • <i>Pacient</i> <ul style="list-style-type: none"> - pregătirea psihică: <ul style="list-style-type: none"> - se anunță și i se explică necesitatea și motenșivitatea tehnicii; - pregătirea fizică: <ul style="list-style-type: none"> - recoltarea se face dimineața pe nemâncate; - se așază pacientul în decubit dorsal, confortabil, cu membrul superior în abducție, extensie și supinație.

Execuție	<p>Asistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> – se spală pe mâini cu apă și săpun; – îmbracă mănuși sterile; – verifică banda de siguranță a acului (integritate, valabilitate); – îndepărtează carcasa de culoare albă a acului prin mișcări de răsucire; – infletează capătul liber al acului în holder; – alege locul puncției și îl aseptizează; – îndepărtează carcasa colorată a acului; <p>● Execută puncția venoasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> – introduce tubul în holder apăsând aripioarele cu indexul și mediul, iar cu policele împinge tubul în holder și astfel va fi străpunsă diafragma gumată a dopului; – după prelevarea sângelui se scoate tubul din holder prin mișcări de împingere asupra aripioarelor laterale și i se imprimă mișcări ușoare de înclinare-răsturnare pentru omogenizare cu aditivul; – se introduce tubul următor; – se retrage acul din venă și se face o compresie asupra locului puncției timp de 1–3 minute fără a flexa antebrațul pe braț.
Pregătirea probelor pentru laborator	<ul style="list-style-type: none"> – se etichetează tuburile; – se trimite la laborator;
Reorganizare	<ul style="list-style-type: none"> – se reorganizează locul de muncă; – acele utilizate se depun în containerul destinat
Îngrijirea pacientului după tehnică	<ul style="list-style-type: none"> – aceeași ca la puncția venoasă.

■ **DE ȘTIUT:**

Tuburile vacuuntainer se utilizează în funcție de codul de culoare a dopului de cauciuc astfel:

- **Rosu și portocaliu:** pentru chimie clinică
- teste de disproteinemie;
- electroforeză, transaminaze, amilazemie, fosfatază, uree sanguină, glicemie, acid uric, creatinină, bilirubinemie, calcemie, fostoremie, sideremie, lipemie,
- rezervă alcalină, imunogramă, protei
- antigen Australia
- Water-Rose, Rh., Grup sanguin
- ASLO, RBW

- **Negru:** sadiutainer pentru determinarea VSH-ului (se agită după recoltare printr-o mișcare lentă)
- **Bleu:** pentru determinări de coagulare
- fibrinogen,
- timp de protrombină (se agită după recoltare cu mișcări lente).
- **Mov:** pentru determinări hematologice – EDTA-K₃
- hematocrit, HLG cu formulă leucocitară;
- indici eritrocitari VEM, HEM, CHEM;
- rezistență globulară;
- (se agită după recoltare prin mișcări lente).
- **Verde:** vacuuntainer cu litu heparină pentru analize biochimice
- când se recoltează mai multe probe de la același pacient, umplerea tuburilor vacuuntainer se face în următoarea ordine:
- tuburi fără aditivi;
- tuburi pentru probe de coagulare;
- alte tuburi cu diverși aditivi.

ATENȚIE

Nu puneți niciodată capacul acului cu mână, pe un ac deja utilizat pentru recoltare! (fig. 17 a, b, c, d, e, f, g)
În cazul în care holderul este contaminat din greșeală, aruncați-l!



Fig. 17 a. Țineți în mână partea colorată a acului, răsuciți și îndepărtați partea albă a capacului.




Fig. 17 b. Însurubați capătul liber al acului în holder. Nu scoateți capacul colorat de pe capătul opus al acului.




Fig. 17 c. Pregătiți locul de puncționare al venei. Scoateți și capacul colorat al acului. Puncționarea venei se va face ca în cazul unei recoltări obișnuite: brațul va fi ținut în poziția „jos” (poziția uzuală de recoltare).



Fig. 17 d. Introduceți tubul în holder. Apucați aripioarele laterale ale holderului cu degetul arătător și mijlociu, iar cu degetul mare împingeți tubul.



Fig. 17 e. Când sângele nu mai curge în tub (vacuumul s-a epuizat), scoateți tubul din holder printr-o ușoară împingere a degetului mare asupra arpișoarelor laterale ale holderului. În cazul în care aveți nevoie de o cantitate mai mare de sânge decât cea a volumului unui tub sau în cazul în care trebuie să utilizați alt tip de tub vacuumat pentru același pacient, nu scoateți acul din venă. Înălțați doar tubul deja plin și introduceți alt tub, conform instrucțiunilor anterioare.



Fig. 17 f. În timpul recoltării într-un tub nou, răsturnați de 8-10 ori tubul deja umplut, pentru a amesteca sângele recolat cu aditivul din tub. Nu agitați puternic tubul - agitarea puternică a tubului poate provoca hemolizarea probei de sânge. Nu scoateți acul din venă decât după ce ați scos din holder ultimul tub ce trebuie umplut.



Fig. 17 g. Aruncați acul utilizat pentru recoltare în containerul destinat special acestui scop.

DETERMINAREA GLICEMIEI FOLOSIND TESTELE REACTIVE

- determinarea glicemiei se mai poate face folosind testele reactive, bandelele sau stripsuri;
- acestea reacționează specific cu glucoză (metodă enzimatică cu glucozooxidază);
- sunt însoțite de instrucțiuni de folosire atât pentru citirea vizuală, cât și electronică;
- autocontrolul se bazează pe acest tip de determinări citite vizual prin comparație cu o scală de culori sau electronic - Glucometru, Reflotlux și altele;
- substanțele chimice imprimare determină schimbarea culorii când vin în contact cu zahărul;
- picătura de sânge se așază în centrul zonei mono- sau bicolore;
- depunerea picăturii se face prin atingerea ușoară a capătului reactiv al bandelei;
- se evită frecarea pulpei degetului de bandă;
- se cronometrează timpul până la îndepărtarea sângelui în funcție de tipul testelor astfel:
 - 60" pentru Hemoglucotest;




Fig. 18 a

Glucometru

- îndepărtarea sângelui se face diferit:
 - stergerea cu tampon de vată (Hemoglucotest);
 - absorbție cu hârtie absorbantă (Glucofix);
 - jet de apă (Dextrostix).
- se compară culoarea cu cea de pe panglica de control care arată valoarea glicemiei în acel moment.
- pacienții își pot testa singuri glicemia folosind aparate cu afișaj electronic, cum ar fi ONE TOUCH BASIC care arată cu rapiditate și precizie valoarea glicemiei. (fig. 18 a, b, c)
- trusa completă ONE TOUCH este formată din:
 - aparatul propriu-zis;
 - dispozitiv automat de întepare;
 - ace de unică folosință;
 - testele corespunzătoare;
 - se procedează astfel:
 - se apasă butonul de pornire;
 - se introduce testul;
 - se aplică picătura de sânge;
 - se obține rezultatul în 45".
- Gama ONE TOUCH este completată cu un model nou ONE TOUCH PROFILE, care are capacitate de memorie mai mare și dă posibilitatea conectării la computer.

RECOLTAREA EXSUDATULUI FARINGIAN

Definiție	Exsudatul faringian este un lichid rezultat în urma unui proces inflamator faringian.
Ț scop	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>explorator</i> - depistarea germinilor patogeni de la nivelul faringelui în vederea tratamentului - depistarea persoanelor sănătoase purtătoare de germeni
Pregătirea	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>materiale</i> - de protecție - mască de tifon - sterile - spatulă linguală - eprubetă cu tampon faringian sau ansă de platină - eprubete medii de cultură - ser fiziologic sau glicerină 15%




Fig. 18 b



Fig. 18 c

RECOLTAREA SECRETELII NAZALE, OTICE ȘI OCULARE

	<ul style="list-style-type: none"> - nesfârșita - tăviță renală - stativ pentru eprubete - lampă de spirt - cilindru - pacient - pregătire psihică: - se anunță și i se explică tehnica - pregătire fizică: - se anunță să nu mănânce, să nu bea apă - să nu i se instileze soluții dezinfectante în nas, să nu facă gargară - se așază pacientul pe un scaun
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - se recoltează înainte de administrarea antibioticelor sau sulfamidelor - asistenta se spală pe mâini și se dezinfectează cu alcool - își pune masca de protecție - invită pacientul să deschidă gura și inspectează fundul de gât - deschide eprubeta cu tamponul faringian - flambează gâtul eprubetei și o închide cu dop steril - apasă limba cu spatula linguală - cu tamponul faringian șterge depozitul de pe faringe și amigdale, dezlipește o porțiune din falsele membrane (când este cazul) - flambează gura eprubetei și introduce tamponul faringian în eprubeta care se închide cu dopul flambat - la indicația medicului, înainte produsul obținut pe lamă de sticlă pentru froturi colorate sau însămânțează imediat pe medii de cultură, succesiv două eprubete din aceeași recoltare - se spală pe mâini cu apă și săpun
Pregătirea produsului pentru laborator	<ul style="list-style-type: none"> - se transportă produsul la laborator evitând suprainfectarea - dacă nu este posibilă însămânțarea la patul bolnavului, tamponul se umezește în prealabil cu ser fiziologic sau glicerină 15 %
Reorganizarea	
Notarea în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> - se notează data recoltării, numele persoanei căreia i s-a efectuat recoltarea - dacă s-au făcut însămânțări sau nu

■ DE ȘTIUT:

- timpul scurs de la recoltare la însămânțare să nu depășească 5-6 ore
- înainte de recoltare se inspectează regiunile de unde urmează să se recolteze
- recoltarea se face nu numai în angine ci și în alte boli care pot fi declanșate de o infecție faringiană (nefrite, RAA).

■ DE EVITAT:

- înbibarea tamponului cu salivă
- atingerea dinților

Recoltarea secreției nazale	<ul style="list-style-type: none"> - recoltarea se face cu un tampon mai subțire fixat pe un portatampon de sârmă ușor îndoită, cu care se poate pătrunde în nazo-faringe - pentru examinări virusologice, recoltarea se face fie prin suflarea puternică a nasului într-o cutie Petri sterilă, fie prin spălare nazo-faringiană
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - recoltarea se face dimineața, după trezirea pacientului - pacientul este așezat în poziție șezând, cu capul în extensie forțată - se injectează în fosele nazale o soluție izotonică de NaCl sterilă, cu ajutorul unei seringi ce se prelungeste cu un tub de cauciuc de 2-4 cm - capătul liber al tubului rătat oblic se introduce în una din fosele nazale și se injectează soluția de spălare - pacientul apăsăcă imediat capul înainte și lasă să se scurgă lichidul într-o cutie Petri sterilă - se trece imediat lichidul în eprubete etichetate și se trimite la laborator - dacă se întârzie trimiterea la laborator, atunci produsul va fi așezat la gheață
Recoltarea secreției otice	<ul style="list-style-type: none"> - se face, cu tamponul, sub control vizual (otoscop), din conductul auditiv extern - flora normală a pavilionului urechii și a conductului auditiv extern este reprezentată de bacterii ce se întâlnesc pe piele - în etiologia otitei medii acute se întâlnesc stafilococi, streptococi, Haemophilus - la nou-născuți și copii se întâlnesc: E. coli, Klebsiella, stafilococ, Pseudomonas etc.
Recoltarea secreției oculare	<ul style="list-style-type: none"> - infecțiile oculare care necesită un examen bacteriologic sunt: - cele care afectează învelișul pleoapelor (biefante) - conjunctiva (conjunctivită acută sau cronică) - corneea și umoarea camerei anterioare (keratită acută și cronică) - înșul și umoarea camerei anterioare (irită acută și cronică) - canalul și sacul lacrimal - cristalinul, coroida sau retina și corpur vitros - secreția din conjunctivite și dacriocistite se recoltează cu tampon sterili - colecțiile purulente ale pleoapelor cu seringa și ace sterile - din umoarea apoasă a camerei anterioare, cu seringa și ace sterile

<ul style="list-style-type: none"> - porțiuni din iris îndepărtate prin incizie sunt puse direct pe medii de îmbogățire pentru pneumococi și streptococi - în cazul de exsudate bogate este indicată o spălare anterioară cu ser fiziologic steril - se face anestezia ochiului prin instilarea locală de soluție din cocaină 4%, apoi se poate șterge conjunctiva sau corneea cu o spatulă de platină sau tampon steril (după alți autori nu se folosește anestezice locale deosebite, uneori, sunt bactericide) - se fac froitur și culturi pe geloză simplă, bulion glucozat 2%, mediu Löffler

RECOLTAREA SPUTEI

Definiție	Sputa este un produs ce reprezintă totalitatea secrețiilor ce se expulzează din căile respiratorii prin tuse
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorator</i> - pentru examinări macroscopice, citologice, bacteriologice, parazitologice, în vederea stabilirii diagnosticului
Pregătire	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale</i> - sterilie - cutie Petri, pahar conic - sculpătoare specială (sterilizată fără substanță dezinfectantă) - nesterile - pahar cu apă - servețele sau batiste de unică întrebuințare • <i>pacient</i> - psihic - se anunță și i se explică necesitatea executării examinării - se instruește să nu înghită sputa - să nu o împrăște - să expectoreze numai în vasul dat - să nu introducă în vas și saliva
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - i se oferă paharul cu apă să-și clătească gura și faringele - i se oferă vasul de colectare, în funcție de examenul cerut - se solicită pacientului să expectoreze după un efort de tuse - se colectează sputa matinală sau adunată din 24 h.
Recoltarea sputei prin froitu faringian și laringian	<ul style="list-style-type: none"> - se umezește tamponul de vată cu apă distilată sterilă - se apasă limba cu spatula - se introduce tamponul în faringe cerând pacientului să tușească - sputa eliminată se prinde pe tamponul de vată care se introduce imediat în eprubeta sterilă

Recoltarea sputei prin spălătură bronșică	<ul style="list-style-type: none"> - froitul laringian se recoltează de medie pătrunzând cu tamponul în laringe sub control laringoscopic
Recoltarea sputei prin spălătură gastrică	<ul style="list-style-type: none"> - se introduce sonda (Einhorn sau Faucher), în stomac, dimineața, pe nemâncate - se introduce prin sondă 200 ml apă distilată, bicarbonată, caldută, care este evacuată imediat sau extrasă cu seringă - lichidul recoltat se trimite imediat la laborator pentru că germeni căutați pot fi distruși dacă stau mai mult timp în contact cu mediul acid al sucului gastric - dacă recoltarea se face pentru însămânțare și lichidul trebuie trimis la alt laborator, sucul obținut poate fi neutralizat cu bicarbonat de Na
Pregătirea produselor pentru laborator	<ul style="list-style-type: none"> - se utilizează la pacienții cu TBC cavitară, care nu expectorează - se pun în evidență bacili încapsulați în submucosă, care nu apar în mod obișnuit în spută - se introduc în recipientul de aerosoli 5 ml ser fiziologic sau 4 ml soluție teofilină 3% cu un ml soluție de sticlină 1% - pacientul inhalează de câteva ori prin inspirații adânci, repetate, urmate de expirații scurte - se face o scurtă pauză de 4-5 secunde și se repetă până la aerosolizarea întregii cantități de lichid - după aspirații, pacientul începe să tușească chiar dacă nu a tușit niciodată - sputa expectorată se recoltează într-un vas steril, recoltarea se repetă zilnic, în următoarele 4 zile, în vase separate
Pregătirea produselor pentru laborator	<ul style="list-style-type: none"> - se acoperă recipientele - se etichetează - se trimite la laborator
Reorganizarea	
Notarea în foaia de observație	

RECOLTAREA URINEI

Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorator</i> - informează asupra stării funcționale a rinichilor, cât și a întregului organism
Pregătire	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale</i> - urinar sau ploscă

Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - musama, alegez - materiale pentru toaleta organelor genitale externe - eprubete sterile sau alte recipiente în funcție de examenul cerut - lampă de spirit și chibrituri
	<ul style="list-style-type: none"> ● pacient <ul style="list-style-type: none"> - psihic <ul style="list-style-type: none"> - se anunță și se instruește privind folosirea bazinului - să știe să utilizeze numai recipientul gol și curat - să urineze fără defecție - să verse imediat urina în vasul colector - să nu urineze în timpul toaletei - fizic <ul style="list-style-type: none"> - se protejează patul cu musama și alegez - se așază plosca sub pacient - se face toaleta organelor genitale externe - se îndepărtează bazinul și se înlocuiește cu altul curat
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> ● recoltarea urinei pentru examen sumar: <ul style="list-style-type: none"> - din urina obținută se trimite un esanțon de 100-150 ml ● recoltarea urinei pentru urocultură la jumătatea micțiunii: <ul style="list-style-type: none"> - urocultura stabilește prezența bacteriilor în urină - se recoltează urina de dimineață (concentrație mare de germeni), în absența unui tratament cu penicilină (efect de diluție) - înainte de începerea tratamentului cu antibiotice, se spală mâinile cu atenție și se usucă cu prosop curat - prima cantitate de urină emisă, aproximativ 50 ml, se elimină la toaletă sau în bazinet, apoi tăia să se interzică jetul urinar, se recoltează aproximativ 5 ml urină într-o eprubetă sterilă - se flambază gura eprubetei înainte și după recoltare - se astupă repede cu dopul - se transportă la laborator sau se înșământează direct pe mediul de cultură și se introduce la termostat ● recoltarea urinei prin sondaj vezical: <ul style="list-style-type: none"> - se utilizează atunci când recoltarea la jumătatea micțiunii nu este posibilă și când puncția vezicală nu este dorită - se folosesc sonde (catetere) cu o singură cale unidirecțională (există risc de infecție externă) - se face toaleta organelor genitale cu atenție (vezi sondajul vezical) - în caz de sondă vezicală permanentă, nu se recoltează urina din punga colectoră, ci numai prin puncție în porțiunea proximală a sondei după o dezinfectare atentă a suprafeței acesteia ● recoltarea urinei prin puncție vezicală: <ul style="list-style-type: none"> - se face numai în caz de vezică plină, când nu se poate recolta urina la jumătatea micțiunii sau prin sondaj vezical - se execută puncția vezicii urinare (vezi capitolul „puncții”) - se repartizează urina recoltată în recipiente în funcție de scop

Ingrrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - este ajutat să se îmbrace - este așezat într-o poziție comodă - se aerisește salonul
Reorganizarea	
Notarea în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> - se notează examenul, numele persoanei care a efectuat recoltarea

<p>■ DE ȘTIUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă se face examen biochimic din urina emisă în 24 de ore, se instruește pacientul în legătură cu modul de colectare, se omogenizează întreaga cantitate și se trimite un esanțon la laborator, precizând volumul din 24 h. 	<p>■ DE EVITAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recoltarea urinei pentru urocultură după administrarea antibioticelor - consumul de lichide cu 12 ore înainte de recoltare
--	--

Definiție	Vărsătura - conținut gastric care se elimină spontan, de obicei în afecțiuni digestive, dar întâlnit și ca un simptom în alte afecțiuni (alcoolism, tensiune intra-craniană) sau în sarcină.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> ● explorator <ul style="list-style-type: none"> - se fac examinări macroscopice, bacteriologice, chimice pentru stabilirea diagnosticului
Pregătire	<ul style="list-style-type: none"> ● materiale <ul style="list-style-type: none"> - 2 tăvițe renale curate și uscate - pahar cu soluție aromată - musama, traversă, prosop ● pacient <ul style="list-style-type: none"> - psihic: <ul style="list-style-type: none"> - va fi încurajat și susținut în timpul vărsăturii - fizic: <ul style="list-style-type: none"> - se așază în poziție șezând sau decubit dorsal cu capul întors lateral - se așază sub cap un prosop sau în jurul gâtului - se protejează lenjeria de pat și de corp cu musama sau traversă
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - se îndepărtează proteza dentară (când este cazul) - i se oferă tăvița renală sau o susține asistența

RECOLTAREA VĂRSĂTURILOR

	<ul style="list-style-type: none"> – sprijină truntea bolnavului – dacă varsă după intervenții chirurgicale intraabdominale, va fi sfătuit să-și comprime ușor cu palma piaga operatorie – după vărsătură se îndepărtează tăvița – i se oferă paharul cu apă să-și clătească gura (aruncă în altă tăviță)
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – se șterge gura pacientului – se îndepărtează materialele folosite – se așază pacientul în poziție comodă și se acoperă – se aerisește salonul – se supraveghează pacientul în continuare
Pregătirea produsului pentru examen de laborator	<ul style="list-style-type: none"> – se completează buletinul de recoltare – se trimite produsul la laborator
Reorganizare	
Notarea în toaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> – se notează aspectul macroscopic, cantitatea – unele semne însoțitoare sau premergătoare (cefalee, verigi, transpirații, emisie fără efort, în jet etc.)

RECOLTAREA MATERILOR FECALE

Definiție	Scaun – resturile alimentare supuse procesului de digestie, eliminate din organism prin actul defecației.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorator</i> – depistarea unor germeni patogeni responsabili de îmbolnăvirea tubului digestiv – depistarea unor purtători sănătoși de germeni – depistarea unor turburări în digestia alimentelor
Generalități	<ul style="list-style-type: none"> – recoltarea materiilor fecale se realizează în vederea examinării lor macroscopice, biochimice, bacteriologice și parazitologice – examenul bacteriologic permite diagnosticarea bolilor infecțioase, gastrointestinale, prin depistarea bacilului tific, dizenteric, tuberculos, vibrii holerei și enterobacteriilor toxinfecțioase alimentare; după stabilirea diagnosticului, recoltarea se efectuează pentru supravegherea evoluției bolii – examenul biochimic și de digestie permit descoperirea unor turburări în secreția fermetiilor digestivi, prezența microscopică a sângelui etc. – examenul parazitologic descoperă parazitozele intestinale prin evidențierea ouălor de paraziți

Pregătire	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale</i> – lavă medicală, ploscă sterilă, lub recoltator – tamponare sterilizate, montate pe porttampon prevăzute cu dopuri de cauciuc și introduse în eprubete sterile – sondă Nélaton nr. 16-18, purgativ salin – eprubete cu medii de cultură – materiale pentru toaleta perineală – mușama, aleză, lampă de spirit, chibrituri • <i>pacient</i> – psihic: – se anunță și i se explică necesitatea efectuării examinării – fizic: – în prezua examenului, seara, se administrează un purgativ salin (sulfat de magneziu 20-30 g) – își golește vezica urinară – se efectuează toaleta regiunii perineale – se instituiește pacientul să folosească recipientul steril pentru defecare
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> • <i>recoltare din scaun spontan sau provocat</i> – spălarea mâinilor – se protejează patul cu mușamaua și aleză – se așază bazinetul sub pacient – se recoltează cu lingura recipientului câteva fragmente din diferite părți ale scaunului (mucus, puroi) – se introduce lingura în recipient • <i>recoltare directă din rect</i> – se așază pacientul în decubit lateral stâng cu membrul inferior drept întins, iar cel stâng în flexie – se îndepărtează țesutele și se introduce tamponul steril, prin mișcări de rotație prin anus în rect – se șterge mucoasa rectală – se îndepărtează tamponul și se introduce în eprubeta sterilă, după tiimbarea gâtului ei • <i>recoltare la copil</i> – se face cu sonda Nélaton – se așează la capătul liber al sondei o seringă – se introduce sonda prin anus pe o distanță de 10-15 cm – se aspiră cu siringa – se îndepărtează sonda și se golește conținutul prin însuflare într-o eprubetă sterilă • <i>recoltare pentru ouă de paraziți</i> – se poate face și prin racleare cu o spatulă de os sau cu o baghetă de lemn plată și bine lustruită, înmuiată în glicerină cu apă în părți egale – metoda constă în raclearea pielii din vecinătatea orificiului anal în special pentru ouă, care se depun în această regiune

Ingrrijirea ulterioară a pacientului	raciarea se face la 2-3 ore după caldare sau dimineata devreme după raciata, bechieta va fi introdusă într-o eprubetă curată și se trimite imediat la laborator se efectuează lozeta în regiunea anală se îmbracă pacientul și se așază comod se așesește camera
Reorganizare	se împănăează materialele folosite se curăță riguroz și se pregătesc pentru sterilizare
Notarea în foaia de observație	

■ DE ȘTIUT:

- la copii, în atară de raciarea pielii din regiunea anală, se recomandă și recoltarea mucusului nazal și a depozitului de sub unghii
- depozitul de sub unghii se recoltează înmuiind toată marginea unghiei cu o soluție de hidrat de Na sau K 0,5 - 1%, după care se curăță capătul proximal al unghiei, marginea și spațiul de sub unghie cu un tampon de vată și o pensă
- materiului recoltat se introduce într-un flacon cu soluție de hidrat de Na 1 %, se astupă, se agită bine și se trimite la laborator
- pentru punerea în evidență a virusurilor se adaugă peste materiile fecale câteva picături dintr-o soluție de penicilină 200 000 ui/10 ml apă distilată și aceeași cantitate dintr-o soluție de streptomycină 1 g/10 ml apă distilată (previne distrugerea virusului de către flora microbiană)
- în același scop, în cazul recoltării cu tampon, în soluția nutritivă (Hanks) se adaugă 100 ui penicilină și 25 mg streptomycină înainte de efectuarea recoltării
- pentru punerea în evidență a agenților patogeni intestinali se fac coproculturi timp de 3 zile consecutiv, dacă scaunul este lichid se recoltează 0,5 - 1 ml
- probele se trimiță întârziere la laborator (germenii sensibili mor repede)

RECOLTAREA LICHIDULUI CEFALORAHIDIAN

Definiție	LCR este un produs de secreție al plexurilor coroidale la nivelul ventriculului IV, cu rol de protecție a SNC, cu rol nutritiv și excretor, care circula în spațiul subarahnoidian.
Scop	<i>diagnostic:</i> este o metodă de rutină, care furnizează date esențiale în diagnosticul neuroinfecțiilor și hemoragiilor meningeale, în afecțiuni neurologice și neurochirurgicale, al stărilor comatoase
Execuție	recoltarea se execută pe nemâncate, prin puncție lombară, suboccipitală sau ventriculară

	<ul style="list-style-type: none"> la pacienții cu stare generală alterată se execută în decubit lateral pentru a evita lipotimia tehnică de puncționare și prelevare va fi studiat aseptică se observă presiunea de scurgere sau se măsoară tensiunea cu manometru Claude se extrag 10-20 ml LCR (după surgerea cătorva picături) lichidul se repartizează în trei oule eprubete sterile (pentru diferite examinări) — aproximativ 4 ml în fiecare eprubetă se fac examinări: <ul style="list-style-type: none"> <i>citologice</i> (măsurarea elementelor celulare/mm³: limfocite, polinucleare, eozinofile, alipii celulare) <i>bacteriologice</i> - BK și alți germeni <i>serologice</i> - sifilisul SNC <i>biotactice</i>
--	---

LCR = soluție apoasă, bogat salină, împede ca apa de stâncă

- volum:* 100-150 ml; D=1005-1009; pH=7,4-7,5
- tensiunea:* 10-20 cm apă în decubit lateral
20-25 cm apă în poziție șezând
0-suboccipital
0-5 cm apă la sugari
5-15 cm apă la copii

Valori normale ale constituenților chimici:

- albuminorahie = 20-60 mg %	- Ca ⁺⁺ = 4,5-5,5 mg %
- R. Pandry, None Apelt	- Mg ⁺⁺ = 3-3,5 mg %
- glicorahia = 50-60 mg %	- Na ⁺ = 300-350 mg %
- clororahia = 700-760 mg %	- K ⁺ = 12-17 mg %
- azot total = 15-30 mg %	- Cl ⁻ = 420-450 mg %
- creatinină = 0,5-1 mg %	- P mineral = 1,2-2 mg %
- acid lactic = 10-25 mg %	

RECOLTAREA SECREȚIILOR PURULENTE

Definiție	Secrețiile purulente se recoltează de pe suprafața tegumentelor, din plăgi supurate, ulceratii, organele genitale, conjunctiva oculară, leziuni ale cavității bucale și din conductul auditiv extern.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> <i>explorator</i> depistarea florei microbiene generatoare și efectuarea antibiogrammei <i>terapeutic</i> evacuarea și tratarea cavităților purulente

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale</i> <ul style="list-style-type: none"> – sterile – eprubete, ansă de platină – 2-3 lame de sticlă bine degresate – seringi și ace – ser fiziologic – alcool iodat – tinctură de iod – pipete Pasteur – nesterile – creion dermatograf – lampă de spirit și chibrituri • <i>pacient</i> <ul style="list-style-type: none"> – se anunță și i se explică necesitatea efectuării examinării – fizică: <ul style="list-style-type: none"> – se așază în poziția adecvată
Recoltarea din vezicule, pustule, ulcerări	<ul style="list-style-type: none"> – se curăță și se dezinfectează suprafața veziculelor, pustulelor, ulcerărilor – se sterilizează ansa prin încălzire la roșu și se așteaptă să se răcească – se recoltează o mică porțiune de puroi, de sub crustă sau de la marginea ulcerărilor – materialul recoltat se trece pe o lamă de sticlă sterilă – se efectuează froitiu
Recoltarea din papule, noduli sau alte leziuni inflamatoare	<ul style="list-style-type: none"> – se dezinfectează tegumentele cu tinctură de iod – se puncționează regiunea cu un ac steril montat la seringă – se plimbă acul în teren în mai multe direcții până se obține serozitate la aspirație – se spală seringă cu ser fiziologic sau mediu de cultură – se introduce lichidul într-o eprubetă sterilă și se închide cu dopul, după flambare
Recoltarea puroiului din abcese, flegmoane, colecții	<ul style="list-style-type: none"> • <i>abcesul, flegmonul este deschis</i> <ul style="list-style-type: none"> – se recoltează aseptice cu o pipetă Pasteur, flambată și răcită sau cu o ansă de platină • <i>când abcesul este închis</i> <ul style="list-style-type: none"> – recoltarea se face cu seringă prin puncționare – transportul produsului se face în cel mult 2 ore, iar pentru anaerobi se anunță laboratorul cu o oră înainte pentru regenerarea mediilor – examenul direct (citobacteriologic) se face pe lamă colorată May-Grimwald-Giemsa)

RECOLTAREA SECRETIILOR VAGINALE

Definiție	<p>Secreția vaginală reprezintă un transsudat al mucoasei vaginale</p> <ul style="list-style-type: none"> – conține celule epiteliale de descuamare și germeni a căror varietate este în funcție de diferiți factori (vârsta, stări fiziologice sau patologice) și de conținutul în glicogen (condiționat la rândul lui de ciclul menstrual) – glicogenul favorizează flora microbiană să fie reprezentată de germeni din grupul <i>Lactobacillus</i> – prezența glicogenului, a acidului lactic și <i>Lactobacillus</i> dau secreției vaginale un pH acid cu rol de apărare contra infecțiilor – perturbarea acestor prezente determină apariția inflamațiilor (vaginitelor) – examenul bacteriologic al secreției este dificil și fidelitatea rezultatelor este condiționată de: prelevare, transport, examinare, interpretare – prelevarea se face în primele 10 zile după ciclul menstrual
Pregătire	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale</i> <ul style="list-style-type: none"> – de protecție – mănuși sterile de cauciuc – sterile <ul style="list-style-type: none"> – specule vaginale, ansă de platină – pipete Pasteur, eprubete – lame de sticlă – nesterile <ul style="list-style-type: none"> – lampă de spirit – creion dermatograf • <i>pacient</i> <ul style="list-style-type: none"> – psihic: <ul style="list-style-type: none"> – se anunță și i se explică necesitatea efectuării examinării – fizic: <ul style="list-style-type: none"> – cu 2 zile înainte de recoltare se recomandă repaus terapeutic și sexual – se așază pacienta în poziție ginecologică pe masa ginecologică – se efectuează toaleta organelor genitale externe cu apă sterilă călduță, fără soluții dezinfectante sau săpun
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> – asistenta se spală pe mâini – îmbracă mănuși sterile – îndepărtează labile mari și mici – recoltează cu ansă sau cu tamponul fixat în porttampon din următoarele locuri de eiecție: <ul style="list-style-type: none"> – orificiul glandelor Bartholin – orificiul colului uterin

	<p>material urinar</p> <ul style="list-style-type: none"> - recoltarea se face cu valve și specule; sterile evitând atingerea valvei și a mucozității vaginului - se adună în 3-4 gaze sterile pentru fiecare produs recoltat - la lefje, se recoltază cu atenție în gâtul sticlei - la lefje, se recoltază cu atenție în caz de suspiciune de diferite infecții se recoltează trei lampare: vaginal, nazal, fecal
Interpretarea examenului	<p>La examenul microscopic, apar patru imagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipul I - epitelii și lactobacili (secreție normală) - tipul II - epitelii, lactobacili, ran bacili gram-negativi sau leucocite - tipul III - epitelii, foarte ran lactobacili, foarte frecvenți bacili gram-negativi, coci gram-pozitivi și negativi, frecvențe leucocite - tipul IV - rare epitelii, lactobacili absenți, foarte frecvențe leucocite, foarte abundentă floră mixtă, Trichomonas prezent
Reorganizare	
Notarea în foaia de observație	

<p>■ DE ȘTIUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - timpul admis de la recoltare până la examinare este de 1-2 ore - pentru gonococ înșămânțarea se face imediat (lamelile se fixează la cald sau cu alcool 90%) - examenul bacteriologic al secreției vaginale se face între lamă și lamelă, colorate gram-negativ și albastru de metilen - prezența leucocitelor este certitudinea unui proces infecțios, în timp ce o floră bogată dar fără leucocite poate coexista cu o mucoasă vaginală normală - între cele 4 tipuri mai pot fi și situații intermediare
--

Sondaje, spălături, clisme

GENERALITĂȚI

Definiție	<p>Sondajul reprezintă introducerea unei sonde sau cateter din metal, caotic sau material plastic, prin căile naturale, într-o cavitate naturală a organismului.</p>
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorator</i> <ul style="list-style-type: none"> - recoltarea produselor cavității sondate în vederea efectuării examenelor de laborator • <i>terapeutic</i> <ul style="list-style-type: none"> - evacuarea conținutului cavității sondate - introducerea unor substanțe medicamentoase - hidratare - alimentare - curățirea cavității de substanțe dăunătoare organismului introduse accidental sau formate printr-o dereglare a proceselor de digestie și de metabolism
Principii de respectat	<p>Instrumentele folosite pentru sondaje și spălături trebuie să corespundă unor criterii generale, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suprafața sondelor trebuie să fie netedă, pentru a nu leza mucoasele - materialul din care sunt confecționate să fie rezistent pentru a nu se rupe în cursul sondajelor și spălăturilor - vârful sondelor să fie bont pentru a nu produce leziuni ale canalelor sau conductelor prin care sunt introduse și pentru a nu forma căi false
Rolul asistentei	<ul style="list-style-type: none"> - respectarea unei asepsii perfecte prin utilizarea soluțiilor și a materialelor sterilizate - pregătirea psihică a bolnavului - va urmări liniștirea acestuia, înștiințarea privind modul de colaborare în timpul sondajului pentru obținerea rezultatului dorit - sonda se va lubrifia sau uda, după caz, pentru a ușura înaintarea, pentru a nu produce căi false, fisuri sau pentru a nu perfora organelor sondat - în cazul spălăturilor, rășinarea lichidului introdus trebuie să fie întotdeauna mai mică decât capacitatea cavității organului spălat - este interzisă introducerea lichidului de spălare sub presiune

- conținutul evacuat prin sondaje sau spăături se păstrează (pentru a fi văzut de medic și trimis la laborator pentru analiză)
- sondele și spăăturile vor fi notate în foaia de observație însoțite de numele persoanei care le-a efectuat
- eventualele greșeli comise cu ocazia sonajului și spăăturii vor fi raportate imediat medicului pentru a combate de urgență complicațiile survenite

TIPURI DE SONDE

I. Pentru alimentația enterală artificială

Sonda naso-gastrică	- indicată în alimentarea de scurtă durată, când nu există risc important de inhalare (boli intestinale inflamatorii, pacienți anorexici sau cașectici).
Sonda naso-duodenală și naso-jejunală	- indicată în nutriția de durată scurtă, în risc major de inhalare sau tulburări de evacuare ale stomacului (pacienți cu tulburări de conștiență, AVC etc.).
Gastrostomie endoscopică percutanată	- indicată în alimentația enterală de durată lungă (pacienți cu tumori esofagiene, tulburări persistente de deglutiție în boli neurologice etc.).
Jejunostomie endoscopică percutanată	- indicată în alimentația enterală de durată lungă cu risc major de inhalare, fără intervenție chirurgicală (pacienți care prezintă tulburări de deglutiție însoțite de tulburări ale conștienței și diminuarea reflexelor de apărare).




Fig. 19 - Tipuri de sonde și poziția lor în diferite tipuri de alimentație enterală artificială

1. Sonda naso-gastrică
2. Sonda naso-jejunală
3. Gastrostomie endoscopică percutanată
4. Jejunostomie endoscopică percutanată

II. Sonde gastroduodenale (adesea numite sonde gastrice) sunt utilizate pentru următoarele scopuri:

- prelevarea lichidului gastric în scop diagnostic;
- evacuarea sau aspirația lichidului gastric sau a sângelui;
- evacuarea aerului sau gazului după o reanimare cu ventilație prin mască;
- evacuarea conținutului gastric înainte de anestezie în intervenția chirurgicală de urgență;
- evacuarea stomacului după absorbție orală de substanțe toxice cu tentativă de suicid;
- sonda de alimentație gastrică sau duodenală la pacienți cu AVC.

Tipuri de sonde gastroduodenale:

- pentru utilizarea de scurtă durată
 - din PVC sau cauciuc
 - cu lumen unic
 - folosite în scop diagnostic sau postoperator
- pentru utilizare de lungă durată
 - din material sintetic (poliuretan, silicon) rezistent la aciditate
 - cu lumen unic sau dublu
 - folosite pentru alimentație enterală, aspirația secrețiilor, evacuare
- sondele sunt lungi de 75-120 cm cu diametru de 8-12 ch pe scara Charrière (1ch = 1,3 mm) pentru alimentație, de 12-15 ch pentru evacuare și spătură, iar pentru spătură gastrică de 30 ch.





Fig. 20 - Sonda gastrică și sonda duodenală

III. Sonde de compresie esofagiene

- folosite pentru oprirea hemoragiei produse de varicele esofagiene sau a hemoragiei gastrice
- tipuri - sonda Blakemore - cu două baloane și trei deschideri
- sonda Linton - cu un balonaș și trei deschideri

cu un peritonsilărit acut, sonda care introduce obstrucția laringelui
 prezența de obstrucție
 laringelui de esofag, cauzează
 efect de compresie al esofagului cu risc de esofagită

Sonda de compresie esofagiene



Sonda Blakemore

- balonete de control
- cate balonete esofagici
- lumen de spălătură gastrică
- balonete de control gastric
- lumen pentru aspirația soroșilor
- balonete de compresie a varicelor
- balonete gastric de fixare a sondei
- varice

Sonda Linton

1. lumen gastric
2. lumen esofagian
3. bușor de închidere a balonșului de compresie
4. balonș de control
5. varice ale funcțiunii gastrice
6. balonș

Fig 21 - Sonda Blakemore și sonda Linton

IV. Sondele intestinale subțire

- lungime 120-310 cm
- confecționate din cauciuc sau material plastic, cu un balonș ce poate fi umplut
- nel, apă sau mercur pentru a facilita înclădirea în aval prin peristaltism
- balonșe pentru
- tipuri
- sonda Miller-Abbott
- sonda Miller-Abbott
- cu lumen dublu, balonș distal, lungime
- 110 cm (12-18 ch)
- cu glvă metalică distală ce poate fi înlocuită de un balonș,
- care se umple cu mercur
- la compresionată din cauciuc și are o lungime de 250 cm (14 ch)

- sonda Cannon - din cauciuc cu un singur lumen și balonș distal umplut cu

mercur, pentru asigurarea înclădării

- lungime = 310 cm (12-18 ch)

- sonda Dennis - din material plastic cu 3 lumene: unul pentru a umfla

balonșul, unul pentru aspirația conținutului gastric și unul

pentru spălătură sau evacuarea gazelor

- lungime = 250 cm

V. Sonde vezicale

- instalate în scop - diagnostic (prelevare de urină sau injectarea substanței de

contrast)

terapeutice (tulburări de evacuare a vezicii, obstrucții

subvezicale, intervenții chirurgicale)

- tipuri: sonda pentru evaluare simplă - Nélaton (c) - pentru spălătură vezică

- Mercier (c)

- Nélaton (c)

- sondă de demerure

- Nélaton (c)

- Thiemann (c)

- cateterism suprapubic - Pezzet (c)



Sondă uretrală Nelaton



Sondă uretrală Thiemann



Sondă Thiemann cu balonș



Sondă Malzer

Sondă Pezzet



Sondă Foley

Fig 22 - Tipuri de sonde vezicale

SONDAJUL GASTRIC

Definiție	Sonda sau tubajul gastric reprezintă introducerea unui tub de cauciuc – sonda gastrică Faucher sau Einhorn prin faringe și esofag în stomac.
Scop	<ul style="list-style-type: none">● <i>explorator</i>– recoltarea conținutului stomacal în vederea evaluării funcției chimice și secretor (cîtivismul gastric)– Pentru studierea funcției evacuatoare a stomacului● <i>terapeutic</i>– evacuarea conținutului stomacal toxic– curățirea mucoasei de exsudate și substanțe străine depuse– hidratarea și alimentarea bolnavului– introducerea unor substanțe medicamentoase
Indicații	– în gastritele acute sau cronice, boala ulcerasă
Pregătiri	<ul style="list-style-type: none">● <i>materiale</i>– de protecție:<ul style="list-style-type: none">– două sorturi din cauciuc sau din material plastic– musama și aleză– prosopae– sterile:<ul style="list-style-type: none">– sonda Faucher sau Einhorn– 2 seringi de 20 ml– casoleță cu mănuși de cauciuc– pense hemostatice– eprubete– nesterile:<ul style="list-style-type: none">– tăviță renală– tavă medicală– pahar cu apă aromată– pahar cu apă pentru proteză– recipient pentru colectare– medicamente– la indicația medicului● <i>pacient</i>– psihic:<ul style="list-style-type: none">– se informează pacientul și i se explică necesitatea tehnicii– este rugat să respecte indicațiile date în timpul sondaajului

Execuție	<ul style="list-style-type: none">– fizic:<ul style="list-style-type: none">– se așază pacientul pe un scaun cu spatează, cu spatele cât mai drept– se protejează cu sortul de cauciuc sau de material plastic– i se îndepărtează proteza dentară (când este cazul) și se așază într-un pahar cu apă– se așază tăvița renală sub bărbia pacientului pentru a capta saliva ce se scurge din cavitatea bucală– este solicitat să mențină tăvița în această poziție– pacientul nu va mânca în dimineața efectuării examenului– asistența se spală pe mâini cu apă și săpun– îmbracă sortul de cauciuc– își pune mănușile sterile– umezește sonda pentru a favoriza alunecarea prin faringe și esofag– se așază în dreapta bolnavului și îi fixează capul cu mîna stîngă, ținîndu-l între mîna și torace– prinde cu mîna dreaptă extremitatea rotunjită a sondei ca pe un creion– cere pacientului să deschidă larg gura, să respire adînc și introduce capătul sondei până la peretele posterior al faringelui, cât mai aproape de rădăcina limbii, în-vitînd bolnavul să înghită– prin deglutiție sonda pătrunde în esofag și este împinsă foarte atent spre stomac (la marcajul 40-50 cm cît la arcada dentară)– verifică prezența sondei în stomac prin aspirarea conținutului stomacal cu ajutorul seringii– se fixează sonda– așază la extremitatea liberă a sondei balonul Erlenmeyer (cînd se colectează pentru o probă) sau aspiră suctul gastric cu siringa– pentru a favoriza golirea stomacului, pacientul este rugat să-și contracte pereții abdominali
----------	---




Fig. 23 – Fixarea sondei gastrice

INTRODUCEREA SONDEI BLAKEMORE

Pentru compresia segmentului a esofagiului și a cardiei în vederea unui tamponament esofagian se folosesc mai multe tipuri de sonde, dintre care cea mai utilizată este sonda Blakemore

Scop	<ul style="list-style-type: none"> realizarea hemostazei în hemoragia digestivă superioară prin rupura varicelor esofagiene; când cantitatea de sânge pierdută este importantă și/sau persistentă peste 2 u (1000 ml) când tulburările hemodinamice nu se restabilesc după umplere vasculară cu 1000 ml
Pregătiri	<ul style="list-style-type: none"> materiale <ul style="list-style-type: none"> sterile sonda Blakemore cu dublu balonaș (fig. 24) sondă gastrică, laringoscop seringi de 20 ml pense hemostatice comprese nestente aparat de aspirație vas colector medicamente soluție novocaină, coccaină pentru anestezie substianță lubrifiantă pacient <ul style="list-style-type: none"> psihic; se anunță și se explică necesitatea și intoleranțivitatea tehnicii fizic: <ul style="list-style-type: none"> se evacuează conținutul gastric se verifică etanșeitatea și funcționalitatea balonaseilor se lubrifică sonda Blakemore se face anestezia orificiilor nazale se verifică aparatul de aspirație se reperează pe sondă distanța nas-omblic
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> se introduce sonda endonazală, este împinsă progresiv și prin mișcări de deglutiție va fi înghițită până la mărca (refluxul de sânge sau suc gastric dovedeste prezența ei în stomac)




Fig. 24 - Sonda Blakemore cu dublu balonaș

Înghițirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> se oferă un pahar cu apă nămolă să și clătească gura se șterge mucozitățile de pe față și bărbie se îndepărtează băuța și sonul de cauciuc se oferă probele dentare (după caz) se așază pacientul în poziție comodă
Pregătirea produsului pentru examenul de laborator	<ul style="list-style-type: none"> se determină cantitatea evacuată se completează formularele de recoltare se trimite probele etichetate la laborator
Reorganizare	
Notarea în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> se notează tehnica, data, cantitatea și spectrul macroscopic al sucului gastric extras
Accidente	<ul style="list-style-type: none"> greață și senzație de vărsătură; se îndalătură fie printr-o respirație frecventă, fie se efectuează anestezia laringelui cu o soluție de coccaină 2% sonda poate pătrunde în laringe; apare reflexul de tuse, hiperemia feței, apoi cianoza; se îndepărtează sonda sonda se poate înfundă cu resturi alimentare; desfundarea se face prin insuflație cu aer se pot produce bronhopneumonii de aspirație

■ DE ȘTIUT:

- lubrifiul gastric se efectuează în condiții de perfectă asepsie
- sondajul gastric se poate efectua și pe cale endonazală cu sonda Einfeldt
- pacienților inconștienți li se umectese respirația, culcarea feței; verificarea căii de pătrundere a sondei se face prin introducerea capătului liber într-un pahar cu apă - aparitia bulelor de aer confirmă pătrunderea în căile respiratorii
- o formă particulară de sondare în scop hemostatic este introducerea sondei Blakemore

■ DE EVITAT:

- ungerea sondei cu ulei sau alte substanțe grase (provoacă greață pacientului)

- se umflă balonasul gastric cu 200-250 ml aer
- se trage sonda astfel ca balonasul să fie în dreptul joncțiunii eso-cardiale
- se fixează la orificiul nazal printr-un sistem de prindere (guleras)
- se umflă balonasul esofagian 60-80 ml aer
- se aspiră conținutul sondei
- se atasează sonda la punga colectoare care va fi situată deciv (silonaj)
- se verifică permanent presiunea din balonase prin intermediul manometrului
- presiunea necesară asigurării hemostazei este de 50-60 mm Hg
- se supraveghează fixarea, permeabilitatea sondei, tensiunea arterială și pulsul
- se supraveghează episodul hemoragic

■ DE ȘTIUT:

- se va înscrie cantitatea de aer injectat pe fiecare tub al balonasului
- pentru prevenirea ischemiei mucoasei și ulcerarea bazei esofagului se controlează presiunea balonasului - 50-60 mm Hg; se dezumflă periodic balonasul esofagian, la 4 ore, timp de 15 minute
- dacă sângerarea nu este controlată, balonasul gastric se umflă la 300 ml, dar volumul de aer să nu depășească 100 ml în balonasul esofagian

■ DE EVITAT:

- compresia traheei prin balonasul esofagian care poate determina necroză esofagiană, pneumonie de inhalajie, suflăi, dureri toracice

SONDAJUL DUODENAL

Definiție	Sondaajul sau tubaajul duodenal constă din introducerea unei sonde Einhorn dincolo de pilor, realizând o comunicare între duoden și mediul exterior.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>explorator</i> <ul style="list-style-type: none"> – extragerea conținutului duodenal format din conținut gastric, bilă (A, B, C), suc pancreatic și secreție proprie – aprecierea funcției bilare hepatice, a căilor extrahepatice – descoperirea unor modificări anatomo-patologice ale organelor care dau aspectul, cantitatea, compoziția chimică sau morfologică a sucurilor extrase prin sondaaj – evidențierea unor boli parazitare ale duodenului sau căilor bilare

- *terapeutic*
 - drenarea căilor bilare și introducerea unor medicamente care au acțiune directă asupra ficatului, a căilor bilare sau a tubului digestiv. Acestea vor acționa fie local, fie se vor resorbi prin pereții intestinali, ajungând prin vena portă în ficat, de unde apoi vor fi excretele împreună cu bila în căile bilare, urmând calea circulației entero-hepatice
- *alimentație artificială*
 - se introduc lichide hidratante și alimente lichide în organismul pacienților inconștienți sau cu imposibilitate de înghițire
- *aspirație continuă*
 - în cazul ocluziilor sau subocluziilor intestinale
 - după intervenții chirurgicale pe tub digestiv (postoperator, vezi nevoia de eliminare)

Generalități

- se verifică totodată și permeabilitatea căilor bilare
- se pot localiza procesele patologice hepatobiliare, prin separarea bilei veziculare de cea hepatică din conținutul sucului duodenal
- analiza sucului pancreatic urmărește dozarea fermentilor din conținutul lui
- recoltarea sucului pancreatic se face prin tubaajul duodenal

Pregătiri

- *materiale:*
 - de protecție
 - musama și aleză
 - sorț de cauciuc sau alt material impermeabil
 - prosopale
 - sterile:
 - sonda Einhorn
 - 2 seringi de 20 ml
 - mănuși de cauciuc sterile
 - pensă hemostatică
 - medii de cultură
 - eprubete
 - nesterile:
 - tăviță renală
 - tavă medicală
 - stativ pentru eprubete
 - pahar cu apă aromată
 - pernă cilindrică dură sau pătură rulantă
 - hârtie de turnesol roșie și albastră
 - medicamente:
 - sulfat de magneziu 33%
 - ulei de măsline
 - novocaină
 - soluții necesare hidratării și alimentării (materialele se vor alege în funcție de scopul sondaajului)

- **pacientul**
 - psihic:
 - se informează pacientul
 - i se explică necesitatea tehnicii
 - fizic:
 - pacientul va fi nemâncat
 - se izolează patul cu un *paravan*
 - se protejează cu musamaua și alează
 - se așază pacientul în poziție șezând la marginea patului
 - se protejează cu șorțul din material plastic
 - i se îndepărtează proteza (după caz)
 - i se dă tăvița renală să o țină sub bărbie

Execuția

- **introducerea sondei**
 - asistența se spală pe mâini
 - îmbracă mănuși sterile
 - prinde sonda (umezită) cât mai aproape de olivă și o introduce cu blândețe prin cavitatea bucală sau nazală până în faringe
 - cere pacientului să respire adânc, cu gura deschisă și să înghită de câteva ori până când olivă trece în esofag
 - cu mișcări blânde ajută înaintarea sondei până la marcajul 45 cm la arcada dentară, moment în care se consideră că sonda a trecut de cardia și a pătruns în stomac
 - se așază pacientul în decubit lateral drept, cu trunchiul ușor ridicat și capul mai jos, coapsele flexate pe bazin
 - se introduce perna cilindrică sub regiunea hepatică
 - se împinge ușor sonda spre pilor până la marcajul 60 cm
 - se continuă introducerea sondei cu răbdare și atenție concomitent cu acțiunea de înghițire a ei de către pacient (1-2 cm la 3-5 minute)
 - când diviziunea 75 cm se află la arcada dentară, olivă sondei a ajuns în duoden (după circa 1-1 1/2 ore de la pătrunderea ei în stomac)
 - **verificarea poziției sondei**
 - dacă nu se scurge bilă sau lichidul scurs nu are aspectul bilei, se verifică dacă sonda a ajuns în duoden sau s-a încolăcit în stomac (fig. 25)
 - se însuflă 60 ml de aer prin sondă cu seringă și după un minut se aspiră. Dacă sonda a ajuns în duoden se recuperează mai puțin de 20 ml



Fig. 25 -- Verificarea poziției sondei

- se introduc 10 ml de lapte care nu mai poate fi extras dacă sonda a ajuns în duoden, dar poate fi extras dacă ea se află în stomac
- se face control radiologic, sonda urmărindu-se sub ecran, ea fiind vizibilă datorită impregnării cu săruri de plumb

• **caplarea bilei**

- după 1-1 1/2 h de la pătrunderea sondei în stomac, la capătul liber al sondei apare bila A, coledociană, de culoare galben-aure, care se colectează într-o eprubetă
- se verifică reacția sucului duodenal cu hârtia de turnesol
- se introduc prin sondă 40 ml soluție sulfat de magneziu 33%, sterilă, încălzită la temperatura camerei pentru a favoriza drenarea bilei veziculare
- se închide extremitatea liberă a sondei prin înnodare sau cu o pensă
- după 15-30 minute se deschide sonda și se colectează 30-40 ml bilă vâscoasă de culoare închisă castanie - bila B, veziculară
- la indicăția medicului se pot recolta 3-5 ml bilă B într-o eprubetă sterilă sau pe medii de cultură pentru examen bacteriologic
- după evacuarea bilei B se colectează o bilă clară care provine direct din ficat - bila C, hepatică; aceasta, fiind în cantitate mai mare, se va capta într-un recipient corespunzător
- extragerea sondei se face după ce se însuflă câțiva ml de aer și se închide capătul liber cu o pensă
- extremitatea sondei se va ține sub nivelul stomacului pacientului pentru a împiedica scurgerea conținutului ei în faringe sau în cavitatea bucală
- se golește conținutul sondei și se așază în tăvița renală

Înghițirea ulterioară a pacientului

- se oferă un pahar cu apă aromată pentru clătirea gurii
- se șterg mucozitățile de pe față și bărbie
- se îndepărtează șorțul din material plastic
- se așază pacientul în poziție comodă

Pregătirea produsului pentru examen de laborator

- se determină cantitatea de bilă obținută
- se etichetează recipientele
- se trimite probele la laborator

Reorganizarea

Notarea în foaia de observație

Accidente

- înnodarea sondei datorită contracțiilor pereților stomacali în timpul senzației de vărsături
- încolăcirea sondei în stomac

- grefuri și vărsături
- imposibilitatea drenării bilei cauzată de un obstacol funcțional (spasmul sfincterului Oddi) sau anatomic (coagularea bilei vâscoase)

■ DE ȘTIUT:

- sunt situații când sonda nu pătrunde în duoden datorită unui spasm piloric; închiderea și deschiderea duodenumului fiind reglată de reacția conținutului gastric se încearcă neutralizarea succului acid stomacal cu bicarbonat de sodiu sol. 10% -20-40 ml.
- relaxarea spasmului piloric se poate face prin administrare de medicamente anti-spastice
- în cazul înmădării sondei în stomac, extragerea se va face cu atenție pe cale bucală cu ajutorul unei spatule linguale și a unei pense (chiar dacă a fost introdusă pe cale endonazală)
- relaxarea sfincterului Oddi se poate realiza prin introducerea a 5-10 ml novocaină soluție 1-2%

■ DE EVITAT:

- aspirarea conținutului sondei la extragerea ei
- oboseala pacientului prin prelungirea duratei sondaajului peste 3 ore
- grăbirea înaintării sondei
- depășirea duratei de execuție (3 1/2 ore)

SONDAJUL VEZICAL

Definiție	Prin sonda vezicală se înțelege introducerea unui instrument tubular (sondă sau cateter) prin uretră în vezica urinară, realizând astfel o comunicație instrumentală între interiorul vezicii și mediul extern.
Generalități	- în îngrijirea curentă a pacientului, asistenta trebuie să cunoască tehnica sondaajului evacuator la femei și la bărbai, precum și drenarea vezicii urinare
Scop	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>explorator</i> - recoltarea unei cantități de urină pentru examen de laborator - depistarea unor modificări patologice ale uretrei și vezicii urinare ● <i>terapeutic</i> - evacuarea conținutului (când aceasta nu se face spontan) - executarea unor procedee terapeutice prin sondă

Pregătiri

- *materiale*
- de protecție:
 - mușama și traversă
 - mănuși sterile de cauciuc
- sterile:
 - două sonde lungi de aproximativ 15 cm cu vârful ușor îndoit, complet rotunjit având unu-două orificii laterale aproape de vârf
 - 1-2 eprubete pentru urocultură
 - medii de cultură în funcție de gramenii căutați
 - ser fiziologic
 - cascade cu tamponare de vară
 - două pense hemostatice
- nesterile:
 - materiale pentru toaleta organelor genitale
 - tavă renală, bazinet
 - paravan (când se execută în salon)
 - recipient pentru colectare
- medicamente:
 - l'ei de parafină steril
 - lichidură de mercur 1/5000
- *pacientă*
- psihic:
 - se anunță și se explică necesitatea tehnicii
- fizic:
 - se izolează patul cu paravan
 - se protejează cu mușama și se așază pacienta în decubit dorsal cu genunchii ridicați și coapsele îndepărtate (poziție ginecologică)
 - se îndepărtează perna și pătura
 - se acoperă pacienta lăsând liberă regiunea genitală
 - se așază bazinetul și se efectuează toaleta organelor genitale externe
 - se îndepărtează bazinetul și se așază tavă renală între coapsele pacientei

Execuție

- sondaajul se efectuează în condiții de perfectă asepsie atât a pacientei și a instrumentelor, cât și a mâinilor celui care o execută
- asistenta îmbracă mănuși sterile
- evidentiază meatul urinar
- dezinfectează cu oxicianură de mercur orificiul uretral de sus în jos în direcția anusului (vezi „Breviar” de Lucreția Tâlcă, cap. 2.12 - *Îngrijirea pacientului cu cateterism vezical și/sau sondă „A Demure”*).
- scoate sonda cu o perna și o prinde între degetele mediu și inelar ale mâinii drepte

	<ul style="list-style-type: none"> - lubrifică sonda cu ulei steril - orientată cu vârful în sus, sonda se introduce în uretră 4-5 cm - paralel cu înalțarea sondei, extremitatea acesteia va fi coborâtă printr-o mișcare în formă de arc pentru a-i usura trecerea în vezică - primele picături se lasă să se scurgă în tăvița renală, apoi în recipientele pregătite în funcție de scop (urocultură, examene biochimice) sau într-un recipient de colectare - extragerea sondei se face după pensarea orificiului extern prin aceeași mișcăre, în sens invers
Îngrijirea ulterioară a pacientei	<ul style="list-style-type: none"> - se efectuează toaleta regiunii vulvare - se îmbracă și se așază comod în pat - se va supraveghea în continuare
Reorganizare	
Notarea în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> - se notează tehnica și numele persoanei care a efectuat-o - cantitatea de urină recoltată (volum, densitate) - aspectul macroscopic al urinei

SONDAJUL VEZICAL LA BĂRBAT

Pregătiri	<ul style="list-style-type: none"> ● materiale <ul style="list-style-type: none"> - la fel ca la sondaajul vezical la femeie ● pacient <ul style="list-style-type: none"> - psihic: <ul style="list-style-type: none"> - se anunță și se explică necesitatea și inofensivitatea tehnicii - fizic: <ul style="list-style-type: none"> - se așază pacientul în decubit dorsal cu picioarele întinse și ușor depărtate - se izolează patul cu paravan - se acoperă pacientul lăsând accesibilă regiunea genitală - se face toaleta organelor genitale - sub bazin se așază o pernă tare, mușamala și aleza - se așază tăvița renală între coapse
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - asistenta îmbracă mănuși de cauciuc - alege sonda și o lubrifică - dezinfectează meatul urinar cu ser fiziologic și oxicianură de mercur - între degetele inelar și mic ale mâinii drepte prinde extremitatea liberă a sondei și cu ajutorul unei pense sterile, ținută în aceeași mână, apucă sonda în imediata vecinătate a vârfului - introduce vârful sondei în meat și împinge ușor cu pensa, în timp ce cu mâna stângă ține penisul cât mai bine, pentru ca să dispară culele l. versale ale mucoasei uretrale care ar putea împiedica pătrunderea sondei în vezică

	<ul style="list-style-type: none"> - dacă pe parcursul înaintării sondei apar obstacole anatomice sau funcționale, spasme, asistenta retrage sonda și pregătește alta de calibru mai mic (Mercier sau Thiemann) - pătrunderea sondei în vezică se semnalează prin scurgerea urinei prin sondă - se fixează sonda până se evacuează urina - se recoltează urina în eprubetele sau recipientele pregătite în funcție de examenele de laborator ce se vor efectua - restul urinei se captează în tăvița renală sau alt recipient - îndepărtarea sondei se face cu ajutorul pensei după ce extremitatea liberă a fost închisă prin comprimare
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - se efectuează toaleta și se îmbracă pacientul - se schimbă lenjeria care s-a pătat cu urină
Reorganizare	
Notarea în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> - cantitatea de urină recoltată (volum, densitate) - aspectul macroscopic al urinei - numele persoanei care a efectuat-o - eventualele accidente sau incidente
Complicații	<ul style="list-style-type: none"> ● imediate: <ul style="list-style-type: none"> - lezarea traumatică a mucoasei uretrale (se trădează prin hemoragie de diferite grade); se impune întreruperea imediată a tehnicii - crearea unei căi false prin forțarea sondei; se previne prin efectuarea sondaajului cu blândețe și răbdare fără să se forțeze înaintarea sondei - astuparea sondei în cursul evacuării vezicii (oprirea curentului de urină); se desupă prin insuflarea cu aer sau injectarea a câțiva ml de soluție dezinfectantă ● tardive: <ul style="list-style-type: none"> - infecțioase, prin introducerea germenilor patogeni prin manevre și instrumente nesterile

■ DE ȘTIUT:

- nu se vor exercita presiuni externe asupra hipogastrului pentru a accelera evacuarea urinei; conținutul vezical trebuie să se evacueze singur, datorită elasticității și contracțiilor vezicii urinare

■ DE EVITAT:

- golirea bruscă sau rapidă a vezicii destinse, în special la persoanele în vârstă, poate provoca hemoragie; de aceea evacuarea se va face încet, iar dacă vezica a fost foarte destinsă se va face parțial, urmând ca restul să se elimine printr-un nou sondaaj, după câteva ore.

SONDAJUL TRAHEO-BRONȘIC

Definiție	Prin sondaj traheo-bronșic se înțelege introducerea unei sonde de cauciuc prin cavitatea bucală și laringe în trahee și bronhii (Sondaj Metras).
Scop	<ul style="list-style-type: none">• explorator<ul style="list-style-type: none">- în caz de bronhografie: întite pentru obținerea imaginii arborescenței bronșice dintr-un lob sau dintr-un segment pulmonar; în acest caz, substanța radiopacă se introduce direct prin sondă în ramura bronșică respectivă• terapeutic<ul style="list-style-type: none">- pentru extragerea exsudatelor din căile respiratorii, conținutul abceselor și al ectaziilor bronșice- pentru mobilizarea dopurilor de secreție intrabronșice care închid unele ramuri bronșice- pentru tratamentul local al proceselor pulmonare supurative (bronșiectazia, abces pulmonar, chist aerian supurat)
Pregătiri	<ul style="list-style-type: none">• materiale<ul style="list-style-type: none">- de protecție- prosoape- măști de tifon- sterilitate- seria sondelor Metras<ul style="list-style-type: none">- instrumente pentru laringoscopia indirectă: spatulă linguală, oglindă laringiană- comprese de tifon- instrumente pentru anestezia laringelui, traheei și bronhiilor, seringă laringiană- seringi de diferite dimensiuni pentru extragerea exsudatelor și injectarea medicamentelor- nesterilitate<ul style="list-style-type: none">- tăviță renală- sursă de lumină- medicamente<ul style="list-style-type: none">- adrenalină, cateină, plegomezin, fenobarbital- excitante ale centrului respirator- soluție medicamentoasă în cantitatea și diluția prescrisă (soluție de antibiotice)- soluție de cocaină 2% pentru anestezia laringelui• pacient<ul style="list-style-type: none">- psihic:<ul style="list-style-type: none">- se va liniști bolnavul- se va instrui în legătură cu tehnica (de felul cum această colaborează depinde reușita sondajului)

- fizic:
 - pacientul va fi nemăncat în dimineața examenului
 - cu o oră înainte, i se administrează o fiolă de fenobarbital
 - i se oferă un pahar cu soluție cocaină 2% cu care face gargară timp de 5-10 minute (fără să o înghită)
 - va fi așezat pe un scaun, protejat cu un prosop în jurul gâtului
 - i se oferă tăviță renală, imobilizându-i brațele, pentru a nu încurca operatorul

EXECUȚIE

Medici	Asistența I	Asistența II
- se spală pe mâini, se dezinfectează, îmbracă mănuși sterile și masca de tifon	- ține capul bolnavului asigurând poziția	- servește medicului se- ringa cu anestezic
- execută anestezia <ul style="list-style-type: none">- alege sonda corespun- zătoare lobului în care vrea să pătrundă		- pune în funcțiune sis- temul de iluminat
- sub controlul laringo- scopului introduce son- da până în regiunea subglotică		
- după ce sonda a pă- truns sub glotă, retrage mandrini și o împinge mai departe sub control radioscopic spre locul leziunii	- susține limba pacien- tului în afară	
- injectează substanța de contrast cu presiune moderată <ul style="list-style-type: none">- însuflă sonda cu aer pentru a elimina, către bronhi, substanța ră- masă pe sondă- extrage sonda- face examenul radio- logic	- așază bolnavul în de- cubit dorsal, puțin înclinat spre partea care trebuie injectată <ul style="list-style-type: none">- schimbă poziția pacien- tului (decubit lateral stâng-drept, decubit ven- tral, poziție Trendelen- burg)	- în funcție de scop oferă substanța de contrast, soluția medicamentoasă, aspiră secrețiile, exsu- datele etc.

Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - după introducerea medicamentelor și extragerea sondei, pacientul păstrează poziția încă o jumătate de oră, pentru a menține substanța medicamentoasă pe loc - se ajută să se întbrace și este condus la pat - nu ingeră nimic timp de 2 ore până când încetează efectul anestezicului - va fi învățat să colecteze în sculpătoare substanța de contrast care se elimină prin tuse, să nu o înghită (produce intoxicații)
Reorganizare	
Notarea în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> - numele persoanei care l-a efectuat - aspectul produsului recoltat
Complicații	<ul style="list-style-type: none"> • imediate: <ul style="list-style-type: none"> - tuse: - se întrerupe sondajul și se completează anestezia - intoxicația cu cocaină manifestată prin dispnee, palpitații, transpirații reci, fenomene de colaps, după utilizarea unei cantități mari de cocaină • tardive: <ul style="list-style-type: none"> - suprainfecții prin introducerea gemenilor patogeni prin mamele și materiale nesterile

■ **DE ȘTIUT:**

- deglutiția și regurgitarea, fără controlul local al sistemului nervos, dă naștere la accidente grave, de aspirație în căile respiratorii

■ **DE EVITAT:**

- reluarea substanței de contrast și pătrunderea ei în stomac, deoarece rezorbtia produce intoxicații

SPĂLĂTURA OCULARĂ

Definiție	Prin spălătură oculară se înțelege introducerea unui curent de lichid în sacul conjunctival.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • terapeutic <ul style="list-style-type: none"> - în procesele inflamatoare ale conjunctivei - în prezența unor secreții conjunctivale abundente - pentru îndepărtarea corpiilor străini
Pregătire	<ul style="list-style-type: none"> • materiale <ul style="list-style-type: none"> - de protecție - prosopape - sterile - comprese, tamponare de vată - undină sau alt recipient (picurător)

Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - nesterile - tăviță renală - medicamente <ul style="list-style-type: none"> - acid boric 3% - ser fiziologic - oxicianat de mercur 1/5000 - apă bicarbonată 22‰ • pacient <ul style="list-style-type: none"> - psihic: <ul style="list-style-type: none"> - se anunță pacientul - i se explică necesitatea și inofensivitatea tehnicii - fizic: <ul style="list-style-type: none"> - se așază pacientul în poziție șezând, cu capul aplecat pe spate, cu privirea în sus - se protejează ochiul sănătos cu o compresă sterilă - se proiectează cu un prosop în jurul gâtului - se așază tăvița renală lipită de gât, de partea ochiului ce urmează a fi spălat (susținută de bolnav sau ajutor) - dacă starea generală nu permite poziția șezând, pacientul va sta în decubit dorsal sau lateral, cu capul aplecat înapoi
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - usucă fața pacientului - aspiră lichidul rămas în unghiul nazal al ochiului - îndepărtează compresa de pe ochiul protejat - așază pacientul în poziție comodă
Reorganizare	
Notarea în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> - se notează tehnica și numele persoanei care a efectuat-o - aspectul lichidului de spălătură

■ **DE ȘTIUT:**

- ciocul urelei va fi ținut la distanța de 6-7 cm de ochiul pacientului pentru ca eventualele mișcări reflexe produse de acesta sau gesturile greșite ale asistentei să nu traumatizeze ochiul cu vârtul recipientului

■ **DE EVITAT:**

- injectarea ochiului sănătos prin lichidul de spălătură de la ochiul bolnav

SPĂLĂTURA AURICULARĂ

Definiție	Prin spălătură auriculară se înțelege spălarea conductului auditiv extern prin introducerea unui curent de lichid.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>terapeutic</i> <ul style="list-style-type: none"> - îndepărtarea secrețiilor (purii, cerumen) - îndepărtarea corpiilor străini ajunși în urechea externă - tratamentul otitelor cronice
Pregătiri	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiala</i> <ul style="list-style-type: none"> - de protecție - două șofuri de cauciuc - mușama, prosop, aleză - sterile - seringă Guyon, vată - lichidul de spălătură la 37°C - soluția medicamentasă prescrisă - soluție de bicarbonat de sodiu 1% - nesterile - masa de tratamente - tăvița renală - scaun • <i>pacient</i> <ul style="list-style-type: none"> - psihic: <ul style="list-style-type: none"> - se anunță pacientul - i se explică scopul tehnicii - fizic: <ul style="list-style-type: none"> - în cazul dopului de cerumen, cu 24 ore înainte se instilează în conductul auditiv extern de 3 ori pe zi soluție de bicarbonat de Na în glicerină 1/20 - în cazul dopului epidemic se instilează soluție de acid salicilic 1% în ulei de vaselină - în cazul corpiilor străini hidrofilii (boabe de legume și cereale), se instilează alcool

Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - în cazul insectelor vii se fac instalații cu ulei de vaselină, glicerină sau se aplică un tampon cu alcool cu efect narcotizant - pacientul se așază în poziție șezând pe scaun - se protejează cu prosopul și șofuri - se așază tăvița sub urechea pacientului care va ține capul înclinat spre tăvița - asistenta se spală pe mâini și îmbracă șoful de cauciuc - verifică temperatura lichidului de spălătură și încarcă seringă Guyon - solicită pacientului să deschidă gura (conductul se lărgeste și conținutul patologic se îndepărtază mai ușor) - trage pavilionul urechii în sus și înapoi cu mâna stângă, iar cu dreapta injectează lichidul de spălătură spre perețele posterio-superior și așteaptă evacuarea - operația se repetă la nevoie - se usucă conductul auditiv extern - medicul controlează rezultatul spălăturii prin otoscopie. - se introduce un tampon de vată în conduct - se așază pacientul în decubit dorsal 1/2-1 oră - se examinează lichidul de spălătură
Reorganizare	
Notare în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> - se notează tehnica și rezultatul spălăturii (corpi străini extrași etc.)

■ **DE ȘTIUT:**

- pot apărea accidente ca vărsături, amețeli, lipotimie, dureri, traumatizarea timpămului datorate presiunii prea mari sau temperaturii scăzute sau crescute a lichidului de spălătură

SPĂLĂTURA GASTRICĂ

Definiție	Prin spălătură gastrică înțelegem evacuarea conținutului stomacal și curățirea mucoasei de exsudate și substanțe străine.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • <i>terapeutic</i> <ul style="list-style-type: none"> - evacuarea conținutului stomacal toxic
Indicații	<ul style="list-style-type: none"> - intoxicații alimentare sau cu substanțe toxice - stază gastrică însoțită de procese fermentative - pregătirea preoperatorie în intervențiile de urgență sau pe stomac - pregătirea pentru examen gastroscopic

Contraindicații	<ul style="list-style-type: none"> - intoxicații cu substanțe caustice - hepatite cronice; varice esofagiene - îmbolnăviri cardio-pulmonare decompensate - ulcer gastric în perioada durerosă - cancer gastric
Pregătiri	<ul style="list-style-type: none"> • materiale <ul style="list-style-type: none"> - de protecție: <ul style="list-style-type: none"> - 2 șorțuri din material plastic - mușama, traversă - prosope - sterile - sonda gastrică Faucher - 2 seringi de 20 ml - casoleță cu mănuși de cauciuc - pensă hemostatică - nesterile <ul style="list-style-type: none"> - cană de sticlă sau de metal de 5 l - pâlnie, apă caldă la 25-26°C - recipient pentru captarea lichidului (găleată, lighean) - scaun - medicamente - câmbure animal, alt antiodor la indicația medicului • pacient <ul style="list-style-type: none"> - psihic: <ul style="list-style-type: none"> - se anunță și se explică importanța examenului și a colaborării sale - fizic: <ul style="list-style-type: none"> - se așază pacientul pe scaun și se protejează cu un prosop în jurul gâtului - se așază șorțul de cauciuc - se îndepărtează proteza dentară (când este cazul) - i se oferă tăvița renală și este rugat să și-o țină sub bărbie (pentru captarea salivei și pentru imobilizarea pacientului)
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - asistența se spală pe mâini, îmbracă mănuși sterile și șorțul de cauciuc - umezește sonda, se așază în dreapta pacientului și îi fixează capul între mână și torace - cere pacientului să deschidă gura, să respire adânc - introduce capătul sondei până la perețele posterior al faringelui cât mai aproape de rădăcina limbii invitând pacientul să înghită - prin deglutiție, sonda pătrunde în esofag și prin mișcări blande de împingere ajunge în stomac (la marcajul 40-50 cm la arcada dentară) - la capătul liber al sondei se adaptează pâlnia și se aduce la nivelul toracelui pacientului

	<ul style="list-style-type: none"> - se verifică temperatura lichidului de spălătură și se umple pâlnia. - se ridică pâlnia deasupra capului pacientului - înainte ca ea să se golească complet, se coboară cu 30-40 cm sub nivelul epigastriului în poziție verticală pentru a se aduna în ea lichidul din stomac - se golește conținutul pâlniei în vasul colector - se repetă operația până ce lichidul este curat, limpede, fără resturi alimentare sau substanțe străine - se îndepărtează pâlnia și se pensează capătul liber al sondei după care se extrage cu atenție, pentru a se împiedica scurgerea conținutului ei în faringe, de unde ar putea fi aspirat de pacient
Pregătirea produsului pentru examen de laborator	<ul style="list-style-type: none"> - dacă spălătura s-a efectuat pentru eliminarea unei substanțe toxice ingerate accidental sau voluntar, tot ceea ce s-a evacuat din stomac se va păstra pentru examinarea de către medic, iar un esanșon va fi trimis la laborator
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - i se oferă un pahar cu apă să și clătească gura - se sting mucozitățile de pe față și bărbie - se îndepărtează tăvița renală și șorțul - se așază pacientul în poziție comodă
Reorganizare	
Notarea în foaia de observație	

DE ȘTUT:	<ul style="list-style-type: none"> - dacă apare senzația de greață și vărsătură, se indică respirație profundă sau se face anestezia faringelui cu soluție de cocaină 2% - sonda poate ajunge în laringe, apare reflexul de tuse, hiperemia feței apoi cianoza - se retrage sonda - sonda se poate înfunda cu resturi alimentare - se îndepărtează prin insuflație de aer cu seringă - se pot produce bronhopneumonii de aspirație
-----------------	--

SPĂLĂTURA VEZICII URINARE

Definiție	Prin spălătura vezicii urinare se înțelege introducerea unei soluții medicamentoase prin sondă sau cateter în vezică.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • terapeutic: <ul style="list-style-type: none"> - îndepărtarea exsudatelor patologice rezultate din inflamația peretilor vezicii

DE ȘTIUT:
 - tehnica se execută în condiții de perfectă asepsie a materialelor și manevrelor
 - sonda se poate astupa prin cheaguri de sânge — se destupă prin însuflare de aer
 - sonda se fizilogic
 sau ser fiziologic
 - tehnica se execută cu prudență pentru a preveni complicațiile: hemoragii, traumatisme, infecții

SPĂLĂTURA VAGINALĂ

Definiție	Prin spălătură vaginală se înțelege introducerea unui curent de lichid — apă sau soluție medicamentoasă — în vagin, care, după ce spală pereții vaginali, se evacuează pe lângă canală.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> • terapeutic <ul style="list-style-type: none"> — îndepărtarea conținutului vaginal (produse normale sau patologice), dezlipirea exsudatelor patologice de pe mucoasă — dezinfectia locală înaintea intervențiilor chirurgicale — calmarea durerilor — reducerea proceselor inflamatoare
Pregătiri	<ul style="list-style-type: none"> • materiale <ul style="list-style-type: none"> — de protecție <ul style="list-style-type: none"> — paravan, prosopape — traversă, mușama — înveliuri, je flanelă — sterile <ul style="list-style-type: none"> — canală vaginală — irigator, vală — nesterile <ul style="list-style-type: none"> — stativ pentru irigator — bazinet — medicamente <ul style="list-style-type: none"> — 2 l soluție medicamentoasă (apă oxigenată, soluție cloramină, permanganat de K 1/2000, oxicianură de mercur 1/4000, soluție sublimat 1%) • pacienta <ul style="list-style-type: none"> — psihic: <ul style="list-style-type: none"> — se anunță și i se explică necesitatea efectuării examenului — fizic: <ul style="list-style-type: none"> — se izolează patul cu paravan (dacă nu se efectuează în sala de tratamente) — se protejează patul cu mușama și alează — se așază pacienta în poziție ginecologică — se introduce bazinetul sub bazinul pacientei — se spală organele genitale cu apă și săpun

Pregătiri	<p>— pregătirea în vederea unor explorări (distoscopie, piekografie)</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiale <ul style="list-style-type: none"> — de protecție <ul style="list-style-type: none"> — mușama și aleză — prosopape — sterile <ul style="list-style-type: none"> — două sonde Thiemann, Nélaton sau sonde cu o singură cale — unidirecționale — casoleță cu lampoane — casoleță cu mănuiși — două pense hemostatice — seringă Guyon, medii de cultură — nesterile <ul style="list-style-type: none"> — bazinet — fâvița renală — medicamente <ul style="list-style-type: none"> — ser fiziologic — oxicianură de mercur 1/5000 — ulei de parafină — soluție de spălătură 1 l — soluție rivanol 0,1-2% — nitrat de argint 1-4‰ • pacient <ul style="list-style-type: none"> — psihic: <ul style="list-style-type: none"> — se anunță și se explică necesitatea tehnicii — fizic: <ul style="list-style-type: none"> — se izolează patul cu paravan — se protejează cu mușama și aleză — se așază pacientul în poziție ginecologică — se efectuează toaleta regiunii genitale 	Execuție	<ul style="list-style-type: none"> — tehnica începe cu sondeajul vezical — după evacuarea vezicii se adaptează la sondă seringă Guyon sau un irigator și se introduc 80-100 ml soluție, fără să se destindă vezica — se retrage seringă și se lasă să se scurgă lichidul introdus, capătul sondei așezându-se pe o compresă — se repetă operația până ce lichidul evacuat este limpede
Reorganizare			
Notarea în foaia de observație	— se notează tehnica și aspectul lichidului de spălătură		

	se acoperă regiunea vulvei cu un strat subțire de vaselină (pentru spălăturile calde)
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> – începe cu spălarea și dezinfectarea mâinilor – se adaptează canula la tubul irigatorului, se elimină aerul – se așază irigatorul la 50-75 cm înălțime față de simfiză pubiană – se verifică temperatura soluției – se reperează orificiul de intrare în vagin, se deschide robinetul și se introduce canula odată cu curentul de lichid până în fundul de sac posterior al vaginului – se spală bine fundul de sac posterior și apoi se schimbă canula pe toată suprafața vaginului – se retrage canula înainte ca irigatorul să se golească, se pensionează tubul și se depune în tavila renală
Îngrijirea ulterioară a pacientei	<ul style="list-style-type: none"> – se usucă regiunea genitală cu vală și prosopale – se îndepărtează materialele folosite – se ajută să se îmbrace – se așază comod în pat – se aerisește salonul
Pregătirea produsului pentru laborator	<ul style="list-style-type: none"> – se examinează lichidul de spălătură, care poate conține: flo-coare de mucus, puroi, cheaguri de sânge – se trimite la laborator la solicitarea medicului
Reorganizare	
Notarea în foaia de observație	
■ DE STIUT:	<ul style="list-style-type: none"> – după temperatura lor, spălăturile vaginale se împart în: <ul style="list-style-type: none"> – spălături reci (până la 20°C) – spălături căldute (35-37°C) – spălături calde (45-50°C) – soluțiile medicamentoase (preparate farmaceutice sau pe loc) vor fi încălzite la temperatura necesară în baie de apă – înainte de utilizare, se va verifica temperatura acestora
Definiție	Clisma este o formă specială a tubajului, prin care se introduc diferite lichide în intestinul gros (prin anus, în rect și colon).

CLISME

Scop	<ul style="list-style-type: none"> • evacuator <ul style="list-style-type: none"> – evacuarea conținutului intestinului gros – pregătirea pacientului pentru examinare (rectoscopie, sigmoidoscopie) – intervenții chirurgicale asupra rectului • terapeutic <ul style="list-style-type: none"> – introducerea de medicamente – alimentarea sau hidratarea pacientului
Clasificare după efect	<ul style="list-style-type: none"> – clisme evacuatoare care pot fi: simple, înalte, prin sifonaj, ulioase, purgative – clisme terapeutice – medicamentoase cu efect local, anestezic – clisme alimentare – hidratante – clisme bariate – cu scop explorator
Pregătiri	<ul style="list-style-type: none"> • materiale <ul style="list-style-type: none"> – de protecție – paravan, mușama, aleză, învelitoare – sterilizate – canulă rectală – casoleță cu comprese – pară de cauciuc pentru copii – nesterile – stativ pentru irigator – irigatorul și tubul de cauciuc de 1,5-2 m lungime și 10 mm diametru – tavilă renală, bazinet – apă caldă la 35°C-37°C (500-1000ml pentru adulți, 250 ml pentru adolescenți, 150 ml pentru copil, 50-60 ml pentru sugar) – sare (1 linguriță la un litru de apă) – ulei (4 linguri la 1 litru de apă) sau – glicerină (40 gr la 500 ml) – săpun (1 linguriță rasă la 1 litru) – medicamente <ul style="list-style-type: none"> – soluții medicamentoase în cantitatea și concentrația cerută de medic – substanță lubrifiantă (Vaselină) • pacient <ul style="list-style-type: none"> – psihic: <ul style="list-style-type: none"> – se anunță și i se explică tehnica – se respectă pudorarea – fizic: <ul style="list-style-type: none"> – se izolează patul cu paravanul și se protejează cu mușamaua și aleză – se așază pacientul în funcție de starea generală în poziție: <ul style="list-style-type: none"> – decubit dorsal, cu membrele inferioare ușor flectate – decubit lateral stâng cu membrul inferior stâng întins și dreptul flectat – genupectorală – se așază bazinetul sub regiunea sacrală și se învelește pacientul cu învelitoare

Execuția

• *clisma evacuatoare simplă:*

- se fixează canula la tubul irigatorului și se închide robinetul
- se verifică temperatura apei sau a soluției medicamentoase
- se umple irigatorul
- se evacuează aerul și prima porțiune de apă
- se lubrifică canula cu o compresă de tifon
- se fixează irigatorul pe stativ
- asistența se spală pe mâini și se dezinfectează
- îndepărtează țesutele pacientului cu mâna stângă
- introduce canula prin anus în rect (cu mâna dreaptă) perpendicular pe suprafața subiacentă, cu vârful îndreptat înainte în direcția vezicii urinare
- după ce vârful canulei a trecut prin sfîncier se ridică extremitatea externă și se îndreaptă vârful în axa ampulei rectale
- se introduce canula 10-12 cm
- se deschide robinetul sau pensa și se reglează viteza de scurgere a apei prin ridicarea irigatorului la aproximativ 50 cm deasupra patului pacientului
- pacientul este rugat să respire adânc, să-și relaxeze musculatura abdominală, să rețină soluția 10-15 minute
- se închide robinetul înainte ca nivelul apei să se apropie de nivelul tubului de scurgere
- se îndepărtează canula și se așază în tăvița renală
- pacientul este adus în poziție de decubit lateral drept, apoi decubit dorsal pentru a ușura pătrunderea apei la o adâncime mai mare
- se captează scaunul la pat sau la toaletă

• *clisma înaltă:*

- se procedează la fel ca la clisma evacuatoare simplă
- se introduce o canulă flexibilă la 30-40 cm în colon
- se ridică irigatorul la 1,5 m pentru a realiza o presiune mai mare a apei
- temperatura apei va fi mai scăzută (15-16°C)

• *clisma prin sifonaj:*

- se practică pentru îndepărtarea mucozităților, puroiului, exsudatelor sau toxinelor microbiene de pe suprafața mucoaselor
- în parezele intestinale, ocluzia intestinală
- se folosește o canulă rectală (sondă) de 35-40 cm lungime și 1,5 cm diametru, din cauciuc semirigid și prevăzută cu orificii largi
- se adaptează la tubul irigatorului o pâlnie de 1,5 l (în loc de rezervor)
- se umple pâlnia cu apă caldă la 35°C și se deschide robinetul sau pensa lăsând să iasă aerul
- se lubrifică canula și se introduce până în colonul sigmoid
- se ridică pâlnia la înălțimea de 1 metru și se dă drumul apei înainte ca aceasta să se golească, se coboară sub nivelul colonului (apa se va reîntoarce în pâlnie)
- se golește pâlnia într-un recipient
- se repetă operația de 5-6 ori până ce prin tub se evacuează apă curată

Efectuarea climei cu trusa de unică folosință

• *clisma uleioasă:*

- se folosesc uleiuri vegetale (floarea soarelui, măsline), încălzite la 38° C în baie de apă
- introducerea în rect se face cu ajutorul unui irigator la care rezervorul este înlocuit cu o pâlnie sau cu ajutorul unei seringi
- se introduce la presiune joasă
- aproximativ 200 ml de ulei se introduc în 15-20 min
- se menține în rect 6-12 ore (este bine să se execute seara, iar pacientul va elimina dimineața un scaun moale nedureros)
- se indică în constipații cronice, fecalom

• *clisma purgativă:*

- evacuează colonul prin acțiunea purgativă (nu mecanică)
- se utilizează soluție concentrată de sulfat de magneziu (250 ml apă cu 2 linguri MgSO₄), care prin mecanism osmotic produce o transudație de lichid prin pereții intestinali în lumen, formând un scaun lichid abundent
- se mai poate folosi bila de bou (un vârf de cuțit de bilă pulbere la 250 ml apă) care are acțiune stimulantă asupra peristaltismului intestinal

Avantaje:

- pacientul își poate face clisma singur, la domiciliu.

Pregătirea pacientului:

- informarea lui asupra scopului climei și a poziției pe care trebuie să o adopte în timpul administrării (aceeași ca pentru orice clismă).

Pregătirea materialelor:

- flaconul cu soluție (flaconul este confecționat din material plastic flexibil, care constituie pară, și o prelungire lubrifiată ce constituie canula, care este protejată cu un capșon).
- Flaconul conține soluția pentru administrare:

- ex. Narmacol Lavement;
- ex. Rowasa.

Efectuarea:

- Se detașază capșonul;
- Se introduce canula prin orificiul anal;
- Se comprimă ușor, ritmic, corpul flaconului;
- Se retrage canula.

Îngrijirea pacientului:

- aceeași ca și în celelalte cazuri.

CLISMA TERAPEUTICĂ

Clisma terapeutică:

- se folosește când se dorește o acțiune locală asupra mucoasei, când calea orală nu este practicabilă sau când se dorește ocultarea căii portale
- se pot administra medicamente ca: digitală, clorură de calciu, tinctură de opiu, chinină, care se absorb prin mucoasa rectală sau cele cu efect local (soluții izotonice) în microclisme sau clisme picătură cu picătură (la o oră, 1 1/2 h după clisma evacuatoare), cu un ritm de 60 picături pe minut

INTRODUCEREA TUBULUI DE GAZE

Microclisme	<ul style="list-style-type: none"> substanța medicamentoasă se dizolvă în 10-15 ml apă ser fiziologic sau soluție izotonă de glucoză și se introduce cu ajutorul unei seringi adaptate la canula rectală
Clisma picătură cu picătură	<ul style="list-style-type: none"> se pot introduce în organism 1-2 l soluție medicamentoasă în 24 h pentru menținerea constantă a temperaturii soluției, se vor folosi rezervoare termostate sau se învelește irigatorul într-un material moale, vată, pernă electrică se folosește și în scop anestezic (când narcoza prin inhalajele este contraindicată), eterul putând fi administrat sub forma unei clisme picătură cu picătură pentru efectul local se utilizează clisme cu bicarbonat de Na, infuzie de mușețel, cortizon, vitamina A, decoct de usturoi

NOTĂ:

- Clisma alimentară hidratantă
- vezi alimentația pacientului
- Clisma baritată
- vezi explorări funcționale radiologice (irigoscopia)

Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> se efectuează toaleta regiunii anale pe un bazinet curat se îndepărtează materialele de protecție se așază pacientul comod, se învelește se aerisește salonul
Reorganizare	
Notarea în foaia de observație	

DE ȘTIUT:

- când canula întâmpină rezistență, se retrage câțiva cm sau se dă drumul apei din irigator, pentru ca aceasta să permită înaintarea canulei atât prin întinderea și lărgirea rectului, cât și prin dizolvarea și dizlocarea materiilor fecale
- dacă în fața canulei se așază șobale, se va ridica irigatorul care va mări presiunea de scurgere, restabilind curentul normal
- când apar dureri, crampe intestinale, se oprește curentul de apă câteva minute până ce se liniștește musculatura colonului
- la sugari și copii mici, clisma evacuatoră se face cu para de cauciuc cu vârt efiat (până la 6 luni se va utiliza o pară cu capacitatea de 50-60 ml; de la 6 luni-1 an capacitatea acesteia va fi de 100 ml)
- clisme medicamentoase și alimentare se administrează prin irigator, la capătul tubului fixându-se sonda Nélaton nr. 10 sau 12
- ritmul va fi de 36 picături/minut pentru clisme medicamentoase și 20-30 picături/min. pentru cele alimentare
- cantitatea nu va depăși 50 ml la sugari și 150 ml la copii mai mari

Definiție	Tubul de gaze este un tub de cauciuc semirigid, de 30-35 cm lungime și 8-12 mm diametru, cu marginile extremităților rotunjite.
Scop	eliminarea gazelor din colon în caz de meteorism abdominal (imposibilitatea de a evacua gazele în mod spontan)
Pregătiri	<ul style="list-style-type: none"> materiale <ul style="list-style-type: none"> de protecție mușama, aleză, învelitoare paravan sterile tubul de gaze comprese substanță lubrifiantă (vaselină boricată) pacient <ul style="list-style-type: none"> psihic: <ul style="list-style-type: none"> se anunță și i se explică tehnica fizic: <ul style="list-style-type: none"> se izolează patul cu paravan se protejează cu mușama și aleza se dezbracă pacientul și se așază în poziție ginecologică
Execuția	<ul style="list-style-type: none"> asistența se spală pe mâini și se dezinfectează unge tubul cu vaselină boricată depărtează fesele pacientului cu mâna stângă, iar cu dreapta introduce tubul de gaze prin anus în rect și de aici în colon, prin mișcări de „răsucire și înaintare” până la o adâncime de 15-20 cm acopește pacientul cu învelitoare menține tubul maximum 2 ore se îndepărtează după degajare la nevoie se repune după 1-2 ore (după ce se restabilește circulația la nivelul mucoasei)
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> se efectuează toaleta regiunii anale se așază pacientul comod, se învelește se aerisește salonul
Reorganizare	<ul style="list-style-type: none"> instrumentele folosite se curăță, se dezinfectează, se pregătesc pentru sterilizare

DE EVITAT:

- menținerea tubului de gaze mai mult de 2 ore (poate produce escare ale mucoasei rectale)
- folosirea tamponelor de vată pentru lubrifierea tubului (firicelele de vată introduse în rect pot irita mucoasa)

Administrarea medicamentelor

GENERALITĂȚI

Definiție	Medicamentele sunt produse de origine minerală, vegetală, animală sau chimică (de sinteză), transformate într-o formă de administrare (preparate solide sau soluții) prescrise de medic.
Scopul administrării	<ul style="list-style-type: none"> – prevenirea îmbolnăvirilor (ex. vaccinurile) – ameliorarea bolilor (ex. medicamentele analgetice) – vindecarea bolilor (ex. antibioticele), prin acțiunea lor locală sau generală
Căile de administrare	<ul style="list-style-type: none"> – calea digestivă - orală, sublinguală, gastrică, intestinală, rectală – local – pe tegumente și mucoase – respiratorie – urinară – parenterală - sub forma injecțiilor intradermice, subcutanate, intramusculare, intravenoase (executate de asistența medicală) și injecții intraarteriale, intracardiac, intratradiene, intraosose (executate de medic) – calea de administrare este aleasă de medic, în funcție de scopul urmărit, capacitatea de absorbție a căii respective, acțiunea medicamentelor asupra mucoaselor, necesitatea unei acțiuni mai lente sau mai rapide, toleranța organismului față de medicament, particularitățile (anatomice, fiziologice ale organismului)
Locul de conservare a medicamentelor	<ul style="list-style-type: none"> – în farmacii – în dulap, la loc uscat, ferite de lumină, ordonate stupefiante – în dulapul ce conține otrăvurile (închise) – toate medicamentele – în frigider – seruri imune, insulină, antibiotice
Prescrierea medicamentelor	<p>Este făcută de medic, în scris. Pentru pacienții ambulatori, prescrierea se face în rețetă, iar pentru pacienții internați în spital – în foaia de observație, în rubrica specială. Prescrierea cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> – numele medicamentului (numele comercial) – doza – cantitatea și concentrația – calea de administrare – ora administrării și durata tratamentului – administrarea în raport cu alimentația – înainte, în timpul sau după masă
Circuital medicamentelor în spital	<ul style="list-style-type: none"> – se completează cardica de medicamente în triplu exemplar (data, numele pacientului, salonul, patul, numele medicamentului, doza pe 24 de ore în cifre și litere), forma de prezentare

Reguli de administrare a medicamentelor

<ul style="list-style-type: none"> – se predă cardica de medicamente la farmacie – preluarea medicamentelor de către asistența medicală care are sarcina de a verifica – ambalajul propriu; etichetele (chenar alb) basteru pentru medicamentele de uz intern și chenar roșu pentru medicamentele de uz extern, etichetă galbenă pentru soluție perizabilă, eticheta neagră cu cap de mort și inscripția „Otravă” pentru toxice); mențiunile privind păstrarea medicamentelor „ferite de lumină”, „păstrat la rece” – depozitarea medicamentelor în secția de spital se face în dulapuri compartimentate sau în cutii pentru fiecare pacient; soluțiile perizabile preparate de farmacie – în frigider – administrarea medicamentelor la ora prescrisă 	<p>Prin respectarea unor reguli, se evită greselile care pot avea efecte nedorite asupra pacientului, uneori efecte mortale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>asistența</i> – respectă medicamentul prescris de medic – identifică medicamentul prescris după etichetă, forma de prezentare, culoare, miros, consistență – verifică calitatea medicamentelor, observând integritatea, culoarea medicamentelor solide; sedimentarea, tulburarea, opalescența medicamentelor sub formă de soluție – respectă căile de administrare prescrise de medic – respectă orarul și ritmul de administrare a medicamentelor pentru a se menține concentrația constantă în sânge, având în vedere timpul și căile de eliminare a medicamentelor – respectă doza de medicament - doza unică și doza/24 de ore – respectă somnul fiziologic al pacientului – organizează administrarea în afara orelor de somn (se trezește pacientul în cazul administrării antibioticelor, chimioterapicelor cu ore fixe de administrare) – evită incompatibilitățile medicamentoase datorate asocierilor unor soluții medicamentoase în aceeași seringă, în același pahar – servește pacientul cu doza unică de medicament pentru administrarea pe cale orală – respectă următoarea succesiune în administrarea medicamentelor: pe cale orală – solide, lichide, apoi injecții, după care administrează ovule vaginale, supozitoare – informează pacientul asupra medicamentelor prescrise în ceea ce privește efectul urmărit și efectele secundare – anunță imediat medicul privind greselile produse în administrarea medicamentelor legate de doză, calea și tehnica de administrare – administrează imediat soluțiile injectabile aspirate din fiole, flacoane – respectă măsurile de asepse, de igienă, pentru a preveni infecțiile intraspitalicești
--	--

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE ORALĂ

Definiție	Calea orală este calea naturală de administrare a medicamentelor, acestea putându-se resorbi la nivelul mucoasei bucale și a intestinului subțire sau gros.
Scop	Obținerea efectelor locale sau generale ale medicamentelor: – efecte locale: – favorizează cicatrizarea ulcerărilor mucoasei digestive – protejează mucoasa gastrointestinală – înlocuiește fermentii digestivi, secreția gastrică, în cazul lipsei acestora – dezinfectează tubul digestiv – efecte generale: – medicamentele administrate pe cale orală se resorb la nivelul mucoasei digestive, pătrund în sânge și apoi acționează asupra unor organe, sisteme, aparate (antibiotice, vasodilatatoare, cardiotonice, sedative)
Contraindicații	Administrarea medicamentelor pe cale orală: – medicamentul este inactivat de secrețiile digestive – medicamentul prezintă proprietăți iritante asupra mucoasei gastrice – pacientul refuză medicamentele – se impune o acțiune promptă a medicamentelor – medicamentul nu se resorbe pe cale digestivă – se impune evitarea circulației portale
Forme de prezentare a medicamentelor	● lichide – soluții, mixturi, infuzii, decocturi, tincturi, extracte, uleiuri, emulsii (cunoștințe din farmacologie) ● solide – pulberi, tablete, drajeuri, granule, mucilagii
Pregătirea administrării medicamentelor	● pacientul: – este informat asupra efectelor urmărite prin administrarea medicamentului respectiv și a eventualelor efecte secundare – i se dă în poziție sezând, dacă starea lui permite ● materiale: – lingură, linguriță, pipetă, sticlă picurătoare, pahar gradat, ceașcă – apă, ceai, lapte
Administrarea medicamentelor	● lichidele: – siropuri, uleiuri, ape minerale, emulsii – se măsoară doza unică cu paharul, ceașca de cafea – mixturile, soluțiile, emulsiile se măsoară cu lingura, lingurița

Reorganizarea	– <i>tincturile, extractele se dozează cu pipeta sau sticla picurătoare</i> Medicamentele lichide se pot dilua cu ceai, apă sau se administrează ca atare, apoi pacientul bea apă, ceai. ● solide: – tabletele, drajeurile se așază pe limba pacientului și se înghit ca atare. Tabletele care se resorb la nivelul mucoasei sublinguale (nitroglicerina) se așază sub limbă. – pulberile divizate în casete amilacee sau capsule cerate – se înmoaie înainte caseta în apă și se așază pe limbă pentru a fi înghițită – pulberile nedivizate – se dozează cu lingurița sau cu vârful de cuțit – granulele se măsoară cu lingurița – unele pulberi se dizolvă în apă, ceai și apoi se administrează sub formă de soluții (ex. purgativele saline) – instrumentele folosite – se dezinfectează, se spală
---------------	--

■ DE ȘTIUT:	– înaintea administrării se verifică medicamentul – ceaiurile medicinale (infuzii, decocturi) se prepară înainte de administrare, pentru a nu se degrada substanțele active – mixturile se agită înainte de administrare – conținutul unor instrumente cu care se administrează medicamentele lichide: – 1 pahar de lichior 15 g ulei – o ceașcă de cafea 50 ml soluție apoasă – un pahar de apă 200 ml soluție apoasă – o linguriță 5 ml soluție apoasă 4,5 ml ulei 6,5 ml sirop 3 lingurițe de apă 1 g soluție apoasă 1 g soluție alcoolică 1 g soluție uleioasă – conținutul unor instrumente cu care se administrează medicamentele sub formă de pulberi: – 1 linguriță rasă = 1,5-2,5 g – 1 linguriță cu vârf = 2,5 - 5 g – 1 vârf de cuțit = 0,5-1 g – gustul neplăcut al medicamentului se poate distruge prin diluare cu apă, ceai, sirop – la pacienții inconștienți, cu tuburări de deglutiție se introduc medicamentele prin sondă Elinhorn, în stomac sau duoden, împreună cu alimentele	■ DE EVITAT: – manipularea comprimatelor direct cu mâna, după scoaterea din ambalajul lor – amestecarea unor medicamente sub formă de prafuri sau sub altă formă cu carbune medicinal, care absoarbe și medicamentele, reducând din acțiunea lor – administrarea tabletelor, drajeurilor ca atare la copii sub vârsta de doi ani – atingerea dinților de către soluțiile acide și feruginoase pentru că atacă smalțul dentar (ele vor fi administrate prin aspiratoare, cu ajutorul unui tub de sticlă, pacientul își spală dinții după fiecare administrare) – folosirea aceluiași pahar, linguri, lingurițe la mai mulți pacienți
-------------	---	--

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE RECTALĂ

Definiție	Calea rectală reprezintă una din căile digestive de administrare a medicamentelor.
Indicații	– pacienți cu tulburări de deglutiție – pacienți operați pe tubul digestiv superior sau cu intoleranță digestivă (vărsături, grețuri, hemoragii) – pacienți la care se dorește evitarea circulației portale, trecerea medicamentelor prin ficat
Scop	Obținerea unor efecte locale și generale ale medicamentelor ● <i>efecte locale:</i> – golirea rectului – efect purgativ - supozitoare cu glicerină – calmarea durerilor – atenuarea peristaltismului intestinal – atenuarea proceselor inflamatoare locale ● <i>efecte generale:</i> – prin absorbția medicamentelor la nivelul mucoasei rectale pot acționa asupra unor organe sau sisteme (inimă – ex. supozitoare cu digitală, sistem nervos – ex. clisma cu cloral hidrat etc.)
Forme de administrare a medicamentelor	● <i>supozitoare</i> – forme solide conice sau ovale, cu o extremitate ascuțită, substanța activă fiind înglobată în unt de cacao, care se topește la temperatura corpului ● <i>clisme medicamentatoase</i> – medicamentele se dizolvă în apă distilată pentru a obține concentrații cât mai apropiate de soluțiile izotone; se pot face ser fiziologic, sau glucoză 5%, în mod excepțional 100-200 ml) și clisme picătură cu picătură, se pot administra 1-2 l soluție medicamentoasă în 24 de ore.
Pregătirea administrării supozitoarelor	● <i>materiale:</i> – mănuși de cauciuc, vaselină, tăviță renală, supozitoare – materiale pentru clisma evacuatoare (vezi clismele) ● <i>pacientul:</i> – pregătire psihică – este informat privitor la: calea de administrare, la poziția în care se face, la senzația de defecație resimțită la administrarea supozitoarelor, care va dispărea după topirea untului de cacao – pregătire fizică – efectuarea unei clisme evacuatoare, dacă pacientul nu a avut scaun și introducerea tubului de gaze în vederea pregătirii administrării supozitoarelor cu efect general

Administrarea supozitoarelor	– poziția decubit lateral cu membrele inferioare flectate pentru administrarea supozitoarelor – asistența își spală mâinile, apoi îmbracă mănușile de cauciuc – despachetează supozitorul din ambalaj – unge cu vaselină sau ulei de vaselină supozitorul, sau îl menține într-o atmosferă caldă – depătează fesele pacientului cu mâna stângă, pentru a evidenția orificiul anal, iar cu mâna dreaptă introduce supozitorul cu partea ascuțită înainte, în anus și îl împinge cu indexul sau inelarul, până când trece complet de sfincterul intern al anusului – vezi capitolul „clismele”
Administrarea clismelor medicamentoase	
Reorganizare	– mănușile se dezinfectează, se spală, se pregătesc pentru sterilizare – deșeurile se îndepărtează

■ **DE ȘTIUT:**
– în timpul administrării climei medicamentatoase picătură cu picătură, se va menține constantă temperatura soluției (39-42°C) pentru a evita reflexul de defecație prin administrarea soluției cu temperatură redusă, ca urmare a răcirii

■ **DE EVITAT:**
– supraincălzirea supozitorului care determină topirea lui și imposibilitatea de administrare

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE RESPIRATORIE

Definiție	Calea respiratorie se pretează la administrarea medicamentelor, având în vedere suprafața de peste 100 m ² a alveolelor pulmonare și vascularizația lor bogată. – Se administrează: – gaze sau substanțe gazeificate – lichide fin pulverizate sau sub formă de vapori, sau prin injecție intratracheală
Scop	– dezinfectia, decongestionarea mucoasei căilor respiratorii – îmbogățirea aerului inspirat în oxigen, pentru combaterea hipoxiei – fluidificarea sputei, expectorația

Inhalajia	<ul style="list-style-type: none"> – reprezintă introducerea substanțelor medicamentoase în căile respiratorii, antrenate de vapori de apă
Indicații	<ul style="list-style-type: none"> – rinite; rinofaringite – bronșite; astm bronșic
Pregătirea inhalajiei	<ul style="list-style-type: none"> • pacientul <ul style="list-style-type: none"> – pregătire psihică – este informat cu privire la scopul administrării medica-mentelor – i se explică modul în care va respira: inspirație pe gură, expirație pe nas – pregătire fizică: <ul style="list-style-type: none"> – se așază în poziție sezând – se învață să-și sufle nasul – se așază un prosop în jurul gâtului – se ung buzele și tegumentele peri-bucale cu vaselină • materiale <ul style="list-style-type: none"> – inhalator, prosop, vaselină, cort, apă cloacotindă – substanția medicamentoasă: esențe aromatate, substanțe anti-septice, substanțe alcaloide
Executarea inhalajiei	<ul style="list-style-type: none"> • asistența <ul style="list-style-type: none"> – își spală mâinile – închide ferestrele camerei – introduce în vasul inhalatorului cu apă cloacotindă o linguriță in-halant la 1-2 l de apă – așază pacientul pregătit în fața pâinii inhalatorului, îl acoperă cu cortul sau pelerina – menține distanța de 30-80 cm față de pânie – invită pacientul să inspire pe gură, să expire pe nas – supraveghează pacientul – durata unei sesiuni: 5-20 de minute – se șterge fața pacientului cu un prosop moale – este ferit de curenții reci de aer – rămâne în încăpere 15-30 de minute
Reorga-nizarea	<ul style="list-style-type: none"> – materialele se strâng, se spală – inhalatorul se dezinfectează
Oxigeno-terapia	
Inhalarea de aerosoli	<ul style="list-style-type: none"> – au fost tratate la „nevoia de a respira”

■ **DE ȘTIUT:**

- inhalatorul poate deveni sursă de con-taminare a căilor respiratorii, dacă nu este ste-rilizat în prealabil

■ **DE EVITAT:**

- inhalarea primilor vapori deoarece aceștia pot antrena picături de apă fierbinte

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE SUPRAFAȚA TEGUMENTELOR

Scop	<ul style="list-style-type: none"> – pe suprafața tegumentelor, se aplică medicamentele care au efect local la acest nivel
Forma de prezentare a medica-mentelor	<ul style="list-style-type: none"> – lichide <ul style="list-style-type: none"> – se administrează prin badjonare, compresă medica-mentasă – pudre – unguente, paste – mixturi – săpunuri medicinale – creioane caustice – băi medicinale
Pregătirea administrării	<ul style="list-style-type: none"> • materiale: <ul style="list-style-type: none"> – materiale pentru protecția patului - mușama, aleză – instrumentar și materiale sterile - pense porttampou, spatule, comprese, tamponare, mănuși de cauciuc – pudrerie cu capac perforat – tăviță renală – prosop de baie • pacientul: <ul style="list-style-type: none"> – se informează asupra efectelor medicamentelor – se așază într-o poziție care să permită aplicarea medica-mentelor
Aplicarea medica-mentelor	<ul style="list-style-type: none"> – asistența alege instrumentele, în funcție de forma de pre-zențare a medicamentelor – badjonarea constă în întinderea unei soluții medicamentoase cu ajutorul unui tampon montat pe porttampou (ex. tinctură de iod, violet de gențiană, albăstru de metil) – compresa medicamentoasă constă în imbibarea soluției me-dicamentoase într-un strat textil mui gros, care apoi se aplică pe tegumentul bolnav. Are acțiune siccativă, dezinfectantă, anti-pruriginoasă, antiinflamatoare (ex. sol. Burrow, Rivanol) – pudrajul reprezintă presărarea medicamentelor sub formă de pudră pe piele cu ajutorul tamponanelor sau cutiilor cu capac per-forat. Acțiunea pudrelor poate fi de combatere a pruritului, de absorbție a grăsimilor, de uscare și răcorire a pielii (ex. pudra de talc, talc mentolat, oxid de zinc) – unguentele și paste se aplică, cu ajutorul spațulelor, pe suprafața tegumentelor, într-un strat subțire (unguentele sunt preparate din substanță medicamentoasă, înglobată în vaselină, lanolină, paste de conțin grăsimi și pudre)

	<ul style="list-style-type: none">- <i>mixturele</i> se ținând cu ajutorul tamponanelor montate pe port-tampon sau cu mâna îmbrăcată cu mânășă, în funcție de suprafața pielii. După aplicarea pielea se lasă să se usuce- <i>săpunurile medicinale</i> sunt utilizate atât pentru spălarea pielii, cât și pentru obținerea unui efect medicamentos. Săpunul este ținut pe piele, lăsat să se usuce și îndepărtat după câteva ore sau 1-2 zile- <i>creioanele caustice</i> sunt introduse în tuburi protectoare, ele au acțiune de distrugere a țesutului granular sau de favorizare a epitelizării unor suprafețe ulcerate (ex. creioane cu nitrat de argint, cu sulfat de cupru)- <i>băile medicinale</i> se utilizează pentru efectul calmant, dezinfectant, decongestiv, antipruriginos. Se pot face băi parțiale sau complete. Se folosesc substanțe medicamentoase sau dezinfectante, infuzii de plante pregătite la temperatura corpului
Îngrijirea pacientului ulterior aplicării medicamentelor pe piele	<ul style="list-style-type: none">- acoperirea regiunii cu comprese mari de tifon- urmărirea efectului local- sesizarea unor efecte secundare apărute (prurit, reacție alergică)- schimbarea periodică a compreselor medicamentoase

■ DE ȘTUT: <ul style="list-style-type: none">- compresele medicamentoase vor fi stoarse pentru a preveni macerarea pielii- tamponanele se îmbibă prin turnarea soluției și nu prin introducerea lor în borcanul cu soluție- mixturele se agită înainte de utilizare	■ DE EVITAT: <ul style="list-style-type: none">- păstrarea unguentelor la temperaturi ridicate- folosirea aceiași tampon pentru badjionarea mai multor regiuni bolnave
--	--

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR
PE SUPRAFAȚA MUCOASELOR

Se pot administra medicamentele pe mucoasa nazală, conjunctivală, bucală, în conductului auditiv extern, pe mucoasa vaginală.

Scop	<ul style="list-style-type: none">- dezinfectia- decongestionarea mucoaselor
Forme de prezentare a medicamentelor	<ul style="list-style-type: none">- soluții- unguente- pulberi

Reprezintă tehnica de administrare a soluțiilor medicamentoase pe o mucoasă, sau un organ cavitat (nas, ureche, ochi, vezica urinară). Instilațiile nazală, oculară, în conductul auditiv extern, sunt executate de asistentă. Soluțiile se instilează cu ajutorul pipetei, sticlei picurător sau cu seringă (instilația în vezica urinară).

Pregătirea instilației	<ul style="list-style-type: none">● <i>materiale</i>- pipetă, tamponare, comprese sterile- material de protecție – prosop- soluția medicamentoasă – tăviță renală● <i>Pacientul</i>- pregătire psihică:<ul style="list-style-type: none">- se informează- este instruit cum să se comporte în timpul și după instilație- pregătire fizică:<ul style="list-style-type: none">- se așază după cum urmează:<ul style="list-style-type: none">- decubit dorsal, sau poziție șezând cu capul în hiperextensie, pentru instilația nazală și oculară- decubit lateral (pe partea sănătoasă), pentru instilația în conductul auditiv extern
Executarea instilației	<ul style="list-style-type: none">● <i>asistente:</i>- își spală mâinile- evacuează secrețiile din cavitățile (după caz, bolnavul suflă nasul, curăță cu un tampon de vată conductul auditiv extern sau șterge secrețiile oculare cu o compresă sterilă)- aspiră soluția medicamentoasă în pipetă- pune în evidență cavitatea:<ul style="list-style-type: none">- conjunctivală prin tracțiunea în jos a pleoapei inferioare, cu policele mâinii stângi- nazală – ridică ușor vârful nasului cu policele mâinii stângi- conductul auditiv extern – tracționând pavilionul urechii în sus și înapoi cu mâna stângă- instilează numărul de picături recomandate de medic- șterge cu o compresă sterilă excesul de soluție
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none">- după instilația auriculară se introduce un tampon absorbant în conductul auditiv extern- după instilația nazală, pacientul rămâne nemiscat 30-40 de secunde, ca soluția să ajungă în faringe
Reorganizarea	<ul style="list-style-type: none">- pipeta se spală, deșeurile se îndepărtază în tăviță renală

- **DE ȘTIUT:**
- soluția utilizată pentru instilația auriculară trebuie să fie încălzită la baie de apă până la 37°C
 - instilația pe mucoasa conjunctivală se face numai cu soluții izotone; după instilație pacientul mișcă globul ocular

- **DE EVITAT:**
- aspirarea soluției medicamentoase instilată în fosa nazală, deoarece poate pătrunde în laringe provocând spasme, accese de tuse

ADMINISTRAREA UNGUENTELOR

Se pot aplica unguente în fundul de sac conjunctival, pe marginea plecapelor, în vestibulul nazal, în conductul auditiv extern.

Pregătirea administrării	<ul style="list-style-type: none"> ● materiale: <ul style="list-style-type: none"> - baghetă de sticlă lătită, acoperită cu un tampon de vată - tampon montat pe o sondă butonată, comprese sterile ● pacientul: <ul style="list-style-type: none"> - se pregătește psihic și fizic, ca și pentru instilație
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> - în sacul conjunctival, unguentul se pune cu bagheta de sticlă acoperită cu tampon - în fosa nazală unguentul se aplică cu ajutorul tamponului montat pe sonda butonată - unguentul poate fi aplicat pe mucoasele menționate și cu ajutorul prelungirii tubului în care se găsește, prin apăsare pe partea plină a tubului
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - după aplicarea unguentului în sacul conjunctival, pacientul este invitat să închidă și să deschidă ochiul pentru a antrena medicamentul pe toată suprafața globului ocular - după aplicarea unguentului în vestibulul nazal, se închide narina, se apasă capul pacientului ușor înainte și i se solicită să aspire medicamentul treptat

- **DE ȘTIUT:**
- cantitatea de unguent aplicată nu trebuie să depășească mărimea unui bob de grâu
 - se folosescampoane separate pentru fiecare ochi, ureche sau vestibul nazal

- **DE EVITAT:**
- depășirea limitei de vizibilitate în conductul auditiv extern

ADMINISTRAREA PULBERILOR

Pulberile medicamentoase se pot aplica în sacul conjunctival cu ajutorul unorampoane de vată montate pe o baghetă de sticlă.

- pacientul este pregătit ca și pentru instilație
- După aplicare, pacientul închide ochiul pentru a antrena pudra pe toată suprafața globului ocular

BADIJONAREA MUCOASEI BUCALE

Badijonarea reprezintă întinderea unei soluții medicamentoase pe suprafața mucoasei bucale, total sau parțial, cu ajutorul unui tampon montat pe portitampon.

Pregătirea badijonării	<ul style="list-style-type: none"> ● materiale: <ul style="list-style-type: none"> - pentru protecția lenjeriei pacientului - trusă cu pense hemostatice, spatulă linguală - sterile - casoleță cuampoane, comprese sterile - mănuși de cauciuc - tăviță renală - soluție medicamentoasă ● pacientul: <ul style="list-style-type: none"> - este informat asupra necesității tehnicii - se așază în poziție șezând, cu capul în hiperextensie - se protejează lenjeria cu un prosop în jurul gâtului
Executarea badijonării	<ul style="list-style-type: none"> ● asistența: <ul style="list-style-type: none"> - își spală mâinile, îmbracă mănușile - examinează cavitatea bucală, invitând pacientul să deschidă gura și folosind spatula individuală. Examinează țâța dorsală a limbii, palatul dur, vâtlul palatin, pilierii anteriori, mucoasa obrajilor, arcadele dentare, țâța internă a buzelor, lojile amigdalene, pilierii posteriori, amigdalele, peretele posterior al faringelui - îmbracă tamponul fixat pe pensa hemostatică în soluție medicamentoasă - badijonează suprafața care prezintă leziuni sau întreaga mucoasă bucală dacă este cazul, în aceeași ordine în care s-a făcut examinarea
Reorganizarea	

- **DE ȘTIUT:**
- soluția medicamentoasă se încălzește la temperatura corpului
 - tamponul folosit nu se introduce în soluția medicamentoasă

- **DE EVITAT:**
- folosirea aceiași tampon pentru badijonarea mai multor zone ale mucoasei bucale

APLICAREA TAMPOANELOR VAGINALE

Soluțiile medicamentoase sau unguentele se aplică pe mucoasa vaginală sub forma tamponanelor vaginale. Tamponul este confecționat din vată presată, acoperit de tifon, care se prelungește cu 20-25 de cm de la tampon.

Pregătirea aplicării tamponelor vaginale	<ul style="list-style-type: none"> • materiale: <ul style="list-style-type: none"> – pentru protecția mesei de tratament – musama, aleză – instrumentar steril – valve vaginale, pensă, lungă portamon, mănuși chirurgicale sterile • pacienta: <ul style="list-style-type: none"> – pregătirea psihică – se informează cu privire la scopul acestei forme de tratament – i se explică durata de menținere a tamponului – pregătirea fizică – se așază în poziție ginecologică 	
Executarea tehnicii	<ul style="list-style-type: none"> • asistenta I 	<ul style="list-style-type: none"> • asistenta II
	<p>își spală mâinile, îmbracă mănușile</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> – introduce valvele vaginale – preia pensa portamon în mâna dreaptă, menținând cu stânga valva vaginală – preia tamponul în pensa portamon – introduce tamponul prin lumenul format de valve până în fundul de sac posterior al vaginului,ăsând să atârne capetele tifonului – îndepărtează valvele vaginale 	<ul style="list-style-type: none"> – servește pensa portamon în condiții aseptice – servește tamponul – toarnă soluția medicamentuoasă
	<p>– ajută pacienta să coboare de pe masa ginecologică și să meargă la pat</p>	
Îngrijirea ulterioară a pacientei	<p>– La ora fixată de medic, tamponul se îndepărtează</p>	
Reorganizarea		

ADMINISTRAREA GLOBULELOR VAGINALE

- Globulele (ovulele) vaginale sunt preparate solide, ovoide sau sferice, produsul medicamentos fiind înglobat în substanțe care se topesc la temperatura vaginală.
- Pregătirea ginecopedei pentru administrarea globulelor constă în efectuarea unei spălături vaginale înaintea administrării.
- Administrarea globulelor se face cu mâna îmbrăcată în mănușă de cauciuc.

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE PARENTERALĂ

Definiție	<p>Calea parenterală, în înțelesul strict al cuvântului, este calea care ocolește tubul digestiv. Dat fiind faptul că în afara injecțiilor și alte căi ocoleesc tubul digestiv (ex. calea respiratorie), noțiunea de cale parenterală a fost reconsiderată, păstrând în sfera ei numai calea injectabilă de administrare a medicamentelor.</p> <p>Injecția constă în introducerea substanțelor medicamentoase lichide în organism, prin intermediul unor ace care traversează țesuturile, acul fiind adaptat la seringă.</p>
Avantajele căii parenterale	<ul style="list-style-type: none"> – dozarea precisă a medicamentelor – obținerea unui efect rapid – posibilitatea administrării medicamentelor la pacientul inconștient, cu hemoragie digestivă, vărsături
Scopul injecțiilor	<ul style="list-style-type: none"> • explorator <ul style="list-style-type: none"> – care constă în testarea sensibilității organismului față de diferite substanțe • terapeutic <ul style="list-style-type: none"> – administrarea medicamentelor <p>Localitățile (ca și scopul) îl constituie țesuturile în care se introduc medicamentele:</p> <ul style="list-style-type: none"> – grosimea dermului – injecție intradermică – sub piele, în țesutul celular subcutanat – injecția subcutanată – țesutul muscular – injecția intramusculară – în vasele sanguine – injecția intravenoasă și injecția intraarterială – în inimă – injecția intracardiacă – în intervenția de urgență – în măduva roșie a oaselor – injecția intraosoasă – în spațiul subarahnoidian

Asistența efectuează injecțiile intradermică, subcutanată, intramusculară și intravenoasă.

Alegerea căii de executare a injecției este făcută de către medic în funcție de scopul injecției, rapiditatea efectului urmărit și compatibilitatea țesuturilor cu substanța injectată.

TIPUL	SCOPUL	LOCUL INECȚIEI	SOLUȚII ADMINISTRATE	RESORBȚIA
INECȚIA INTRA- DERMICĂ (i.d.)	EXPLORATOR: – intradermoreacții la tuberculină, la diverși alergeni TERAPEUTIC: – anestezie locală – desensibilizarea organismului în cazul alergiilor	REGIUNI LIPSITE DE FOLICULI PILOȘI. – fața anterioară a antebrățului; – fața externă a brațului și a coapsei; – orice regiune, în scop de anestezie	– izotone, ușor resorbabile, cu densitate mică	– foarte lentă
INECȚIA SUBCUTA- NEA (s.c.)	TERAPEUTIC	REGIUNI BOGATE ÎN ȚESUT CELULAR LAX, EXTENSIBIL: – fața externă a brațului; – fața superoexternă a coapsei; – fața supra- și subspinoasă a omoplatului; – regiunea subclaviculară; – flancurile peretelui abdominal	– soluții izotone, nedureroase; – soluții cristaline: insulina, histami- na, cofeina	– începe la 5-10 minute de la administrare; – durează în func- ție de cantitatea administrată
INECȚIA INTRAMUS- CULARĂ (i.m.)	TERAPEUTIC	MUȘCHI VOLUMINOȘI, LIPSITI DE TRUNCHIURI MARI DE VASE ȘI NERVI: – regiunea superoexternă a fesei; – fața externă a coapsei, în treimea mijlocie; – fața externă a brațului, în mușchiul deltoid	– soluții izotone; – soluții uleioase; – soluții coloidale, cu densitate mare	– începe imediat după adminis- trare; – se termină în 3-5 minute; – mai lentă pentru soluțiile uleioase
INECȚIA INTRA- VENOASĂ (i.v.)	EXPLORATOR: – se administrează substanțe de contrast radiologic TERAPEUTIC	– venele de la plica cotului; – venele antebrățului; – venele de pe fața dorsală a mâinii; – venele maleolare interne; – venele epicraniene	– soluții izotone; – soluții hipertone	– instantanee

Pregătirea injecției

- **materiale:**
 - seringi sterile, cu o capacitate în funcție de cantitatea de soluție medicamentoasă
 - pentru inecție intradermică, seringă de 0,5 ml, gradată în sutimi de ml
 - pentru inecția intravenoasă, seringă cu amboul situat excentric
- Se utilizează seringile de unică folosință, în ambalaj individual, sterilizate care prezintă următoarele avantaje:
 - condiții maxime de sterilitate
 - risc de contaminare a pacientului redus
 - economie de timp
 - economie de personal (pentru pregătirea în vederea refolosirii)
 - manipulare ușoară
- acele se găsesc împreună cu seringă în același ambalaj sau în ambalaje separate; se pregătește un ac cu diametrul mai mare pentru aspirarea soluțiilor și altul pentru inecție, după cum se arată în tabelul următor

Utilizarea acului	Diametrul (mm)	Lungimea (mm)	Bizoul
– aspirarea soluției	1/1	38	lung
– inecție i.d.	5/10; 6/10	5-10	scurt
– inecție s.c.	6/10; 7/10	30-50	lung
– inecție i.m.	7/10; 8/10; 9/10	40-70	lung
– inecție i.v.	6/10; 7/10	25	scurt




Fig. 26 – Ace pentru inecții

<p><i>Medicamentul prescurs se poate prezenta:</i></p> <p>a) ca medicament direct injectabil, în fiole sau flacoane cu doză unică sau mai multe doze, în seringă gata pregătită de înbezuințare</p> <p>b) ca medicamente indirect injectabile – pudre sau produse liofilizate în fiole sau flacoane cu dop de cauciuc, însoțite sau nu de solvent. Fiolele, flacoanele sunt etichetate, menționându-se numele medicamentului, calea de administrare, termenul de valabilitate.</p> <p>– <i>alte materiale:</i></p> <p>– tamponare sterile din vată și tifon, soluții dezinfectante (alcool), pile din metal pentru deschiderea fiolelor, lampă de spirit, tăviță renală, garou din cauciuc, perniță, mușama</p>	
<p>Pregătirea pacientului pentru injecție</p>	<p>– <i>pregătire psihică:</i></p> <p>– se informează privind scopul și locul injecției și eventualele reacții pe care le va prezenta în timpul injecției</p> <p>– <i>pregătire fizică:</i></p> <p>– se așază în poziție confortabilă, în funcție de tipul și locul injecției</p>
<p>Încărcarea seringii</p>	<p>– se spală mâinile cu apă curentă, se verifică seringă și acele – capacitatea, termenul de valabilitate al sterilizării</p> <p>– se verifică integritatea fiolelor sau flacoanelor, eticheta, doza, termenul de valabilitate, aspectul soluției</p> <p>– se îndepărtează ambalajul seringii, se adaptează acul pentru aspirat soluția, acoperit cu protectorul și se așază pe o compresă sterilă</p> <p>a) <i>aspirarea conținutului fiolelor:</i></p> <p>– se golește lichidul din vârful fiolei prin mișcări de rotație</p> <p>– se dezinfectează gâtul fiolei prin flambare sau prin ștergere cu tamponul umezit în alcool</p>




Fig. 27 – Încărcarea seringii și evacuarea aerului

– se flambază pila de oțel și se tale gâtul fiolei

– se deschide fiole astfel: se ține cu mâna stângă, iar cu policele și indexul mâinii drepte protejate cu o compresă sterilă se deschide partea subțiată a fiolei

– se trece gura fiolei deschise deasupra flaconii

– se introduce acul în fiole deschisă, ținută între policele, indexul și degetul mijlociu al mâinii stângi, seringă fiind ținută în mână dreaptă

– Se aspiră soluția din fiole, retrăgând pistonul cu indexul și policele mâinii drepte și având grijă ca bizoul acului să fie permanent acoperit cu soluția de aspirat; fiole se răstoarnă progresiv cu orificiul în jos

– se îndepărtează aerul din seringă, fiind în poziție verticală cu acul îndreptat în sus, prin împingerea pistonului până la apariția primei picături de soluție prin ac (fig. 27)

– se schimbă acul de aspirat cu cel folosit pentru injecția care se face

b) *dizolvarea pulberilor*

– se aspiră solventul în seringă

– se îndepărtează câpăcelul metalic al flaconului, se dezinfectează dopul de cauciuc, se așteaptă evaporarea alcoolului

– se pătrunde cu acul prin dopul de cauciuc și se introduce cantitatea de solvent prescursă

– se scoate acul din flacon și se agită până la completa dizolvare

c) *aspirarea soluției din flaconul închis cu dop de cauciuc:*

– se dezinfectează dopul de cauciuc, se așteaptă evaporarea alcoolului

– se încarcă seringă cu o cantitate de aer egală cu cantitatea de soluție ce urmează a fi aspirată

– se introduce acul prin dopul de cauciuc în flacon, până la nivelul dopului și se introduce aerul

– se retrage pistonul sau se lasă să se golească singur conținutul flaconului în seringă sub presiunea din flacon

– acul cu care s-a perforat dopul de cauciuc se schimbă cu acul pentru injecție

■ DE ȘTIUT:

- fiolele neetichetate sau de pe care s-a șters inscripția nu se folosesc
- dacă în timpul deschiderii fiolei cad cioburi în interior, conținutul nu se mai utilizează
- fiolele deschise se administrează imediat
- substanțele precipitate se vor agita înainte de aspirarea lor în seringă
- substanțele uleioase se pot încălzi ușor în apă caldă pentru a putea fi aspirate cu ușurință

■ DE EVITAT:

- alterarea conținutului fiolei în timpul flambării gâtului ei în vederea deschiderii

INIECȚIA INTRADERMICĂ

Executarea	<ul style="list-style-type: none"> - asistenta își spală mâinile - dezinfectează locul iniecției - se întinde și imobilizează pielea cu policele și indexul mâinii stângi - se prinde seringă în mână dreaptă (între policele și mediul mâinii drepte) și se pătrunde cu bizoul acului îndreptat în sus în grosimea dermului (fig. 28) - se injectează lent soluția prin apăsarea pistonului - se observă, la locul de injecție, formarea unei papule cu aspectul coji de portocală, având un diametru de 5-6 mm și înălțimea de 1-2 mm - se retrage brusc acul, nu se tamponează locul iniecției
Reorganizarea	
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - este informat să nu se spele pe antebraț, să nu comprime locul iniecției - se citește reacția în cazul intradermoreacțiilor la intervalul de timp stabilit
Incidente	<ul style="list-style-type: none"> - revărsarea soluției la suprafața pielii, având drept cauză pătrunderea parțială a bizoului acului în grosimea dermului - lipsa aspectului caracteristic (papula cu aspect de coajă de portocală), cauza - pătrunderea soluției sub derm - lipolime, stare de șoc cauzate de substanța injectată - necrozarea tegumentelor din jurul iniecției

Fig. 28 - Injecția intradermică



* Pregătirea materialelor, pacientului, scopul și locul injecțiilor au fost descrise în partea introductivă

■ DE ȘTIUT:

- i.d. se poate face pe orice suprafață a corpului în scop anestezic
- asistenta pregătește adrenalină, efedrină, hemisuccinat de hidrocoortizon când iniecția are drept scop testarea sensibilității organismului la diferite alergene

■ DE EVITAT:

- dezinfecția pielii cu alcool în cazul intradermoreacției la tuberculină

INIECȚIA SUBCUTANATĂ

Executarea	<ul style="list-style-type: none"> - asistenta își spală mâinile - dezinfectează locul iniecției - pentru injecția pe fața externă a brațului, poziția pacientului este șezând, cu brațul sprijinit pe șold - se prinde seringă pregătită, ca pe un creion, în mână dreaptă - se face o cută a pielii între indexul și policele mâinii stângi, care se ridică după planurile profunde - se pătrunde brusc, cu forță la baza cutei, longitudinal 2-4 cm - se verifică poziția acului prin retragerea pistonului, dacă nu s-a pătruns într-un vas sanguin - se injectează lent soluția medicamentoasă, prin apăsarea pistonului cu policele mâinii drepte (fig. 29) - se retrage brusc acul cu seringă și se dezinfectează locul iniecției, masându-se ușor, pentru a favoriza circulația și deci resorbția medicamentului
------------	---

Fig. 29 - Injecția subcutanată



Accidente	Intervenții
<ul style="list-style-type: none"> - durere violentă prin lezarea unei terminații nervoase - ruperea acului - hematom prin lezarea unui vas mai mare 	<ul style="list-style-type: none"> - se retrage acul puțin spre suprafață - extragerea manuală sau chirurgicală a acului - se previne, prin verificarea poziției acului înainte de injecție

■ DE ȘTIUT:

- locurile de elecție ale iniecției se vor alterna, pentru a asigura refacerea țesuturilor în care s-a introdus substanța medicamentoasă

■ DE EVITAT:

- injecția în regiunile infecțate sau cu modificări dermatologice

INIECȚIA INTRAMUSCULARĂ

Locul iniecției îl constituie mușchii voluminoși, lipsiți de trunchiuri importante de vase și nervi, a căror lezare ar putea provoca accidente. În mușchii fesieri se evită lezarea nervului sciatic.

— cadrulul superiorului fesier — rezultă din învelirea unei linii orizontale, care trece prin marea superioară a marelui trohanter, până deasupra șanțului interfesier, cu axa verticală perpendiculară pe mijlocul celei orizontale

— când pacientul e culcat, se caută ca repere punctuale Smirnov și Barthelmy (punctul Smirnov este situat la un lat de deget de deasupra și înapoia marelui trohanter, punctul Barthelmy e situat la unirea treimii externe cu cele două treimi interne a unei linii care unește spina iliacă anterioară cu extremitatea șanțului interfesier)

— când pacientul este în poziție sezând, injecția se poate face în toată regiunea fesieră, deasupra liniei de sprijin (fig. 30).




Fig. 30 — Locul injecției intramusculare în regiunea fesieră

Pregătirea injecției	<ul style="list-style-type: none"> • materiale: <ul style="list-style-type: none"> — vezi generalități — se încarcă seringă • pacientul: <ul style="list-style-type: none"> — se informează — se recomandă să relaxeze musculatura — se ajută să se așeze comod în poziție decubit ventral, decubit lateral, ortostatism, sezând (pacienții dispneici) — se dezbracă regiunea
Executarea	<ul style="list-style-type: none"> — asistenta își spală mâinile — dezinfectează locul injecției — se întinde pielea între indexul și policele mâinii stângi și se înțeapă perpendicular pielea cu rapiditate și siguranță, cu acul montat la seringă — se verifică poziția acului prin aspirare — se injectează lent soluția — se retrage brusc acul cu seringă și se dezinfectează locul — se masează ușor locul injecției pentru a activa circulația, favorizând resorbția
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> — se așază în poziție comodă, rămânând în repaos fizic 5-10 minute
Incidente și accidente	Intervenții
<ul style="list-style-type: none"> — durere vie, prin atingerea nervului sciatic sau a unor ramuri ale sale — paralizia prin lezarea nervului sciatic 	<ul style="list-style-type: none"> — retragerea acului, efectuarea injecției în altă zonă — se evită prin respectarea zonelor de elecție a injecției

Incidente și accidente	Intervenții
<ul style="list-style-type: none"> — hematom prin lezarea unui vas — rupea acului — supurație aseptică — embolie, prin injectarea accidentală într-un vas a soluțiilor uleioase 	<ul style="list-style-type: none"> — extragerea manuală sau chirurgicală — se previne prin folosirea unor ace suficient de lungi pentru a pătrunde în masa musculară — se previne prin verificarea poziției acului

DE STIUT:

— injecția se poate executa și cu acul detașat de seringă, respectându-se măsurile de asepsie

— poziția acului se controlează, în cazul soluțiilor colorate, prin detașarea seringii de la ac, după introducerea acului în masa musculară

— infiltrația dureroasă a mușchilor se previne prin alternarea locurilor injecțiilor

INIECȚIA INTRAVENOSĂ

Execuția injecției	<ul style="list-style-type: none"> — asistenta își spală mâinile — se alege locul puncției — se dezinfectează locul puncției — se execută puncția venoasă (vezi puncția venoasă) — se controlează dacă acul este în venă — se îndepărtează staza venoasă prin desfacerea garoului — se injectează lent, ținând seringă în mână stângă, iar cu policele mâinii drepte se apasă pe piston — se verifică, periodic, dacă acul este în venă — se retrage brusc acul, când injectarea s-a terminat; la locii puncției se aplică tamponul imbibat în alcool, compresiv
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> — se menține compresunea la locul injecției câteva minute — se supraveghează în continuare starea generală
Incidente și accidente	Intervenții
<ul style="list-style-type: none"> — injectarea soluției în țesutul perivinos, manifestată prin tumefierea țesuturilor, durere — flebalgia produsă prin injectarea rapidă a soluției sau a unor substanțe iritante 	<ul style="list-style-type: none"> — se încearcă pătrunderea acului în lumenul vasului, continuându-se injecția sau se încearcă în alt loc — injectare lentă

Incidente și accidente	Intervenții
<ul style="list-style-type: none"> — valuri de căldură, senzația de uscăciune în faținge — hematom prin străpungere a venei — amețeli, lipotimie, colaps 	<ul style="list-style-type: none"> — injectare lentă — se întrerupe injectia — se anunță medicul

■ **DE STIUT:**

- în timpul injectării se va supraveghea locul puncției și starea generală (respirația, culoarea feței)
- vena are nevoie pentru refacere de un repaos de cel puțin 24 de ore, de aceea nu se vor repeta injecțiile în aceeași venă la intervale scurte
- dacă pacientul are o singură venă accesibilă și injecțiile trebuie să se repete, puncțiile se vor face totdeauna mai central față de cele anterioare
- dacă s-au revărsat, în țesutul periveneos, soluțiile hipertone (calciu clorat, calciu bromat) va fi înștitat medicul pentru a interveni, spre a se evita necrozarea țesuturilor

■ **DE EVITAT:**

- încercările de a pătrunde în venă după formarea hematomului, pentru că acesta, prin volumul său, deplasează traiectul obișnuit al venei

PARTICULARITĂȚI DE ADMINISTRARE A UNOR GRUPE DE MEDICAMENTE

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
<p>1. ADMINISTRAREA ANTIBIOTICELOR ȘI CHIMIOTERAPICELOR</p> <p>Antibioticele — substanțe organice, provenite din metabolismul celulelor vii (mucegaiuri, bacterii) sau obținute pe cale sintetică, care au proprietăți bacteriostatice, bactericide sau antimicotice.</p> <p>Chimioterapicele — substanțe chimice cu acțiune bacteriostatică sau bactericidă.</p> <p>Spectrul de activitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>îngust</i> (ex. penicilină, streptomycină); ● <i>larg</i> (ex. tetraciclina, cloramfenicol) <p>Acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bactericidă ex. penicilină, cefalosporine, aminoglicozide, rifampicină ■ Bacteriostatică ex. tetracilină, cloramfenicol, eritromicină, sulfamide 	<p>tablete (ex. penicilina V)</p> <p>capsule operculate (ex. ampicilină, oxacilină 250 mg, doxicilină)</p> <p>pulberi în flacoane (ex. oxacilină 250 mg, penicilina G 400.000 u, kanamicină 1 g)</p> <p>fiole (ex. gentamicină)</p> <p>unguente (ex. neomicină)</p>	<p>orală</p> <p>parenterală (injecții i.v., i.m., intrarahidiene, perfuzii intravenoase)</p> <p>tegumente și mucoase</p>	<ul style="list-style-type: none"> — recoltează produsele biologice sau patologice pentru examenul bacteriologic în vederea identificării agentului patogen și a determinării sensibilității lui la antibiotice — antibiograma. — verifică termenul de valabilitate al produsului. — administrează antibioticul prescris, respectând: <ul style="list-style-type: none"> ■ prevenirea reacțiilor alergice prin anamneza corectă pentru depistarea persoanelor cu teren alergic și prin testarea sensibilității organismului (testul intradermic sau prin scarificare cu diluții 100 u/ml sau 1000 u/ml pentru antibioticele măsurate în unități sau 0,001 g/ml, pentru antibioticele măsurate în grame; ■ doza pe 24 de ore și doza unică; se exprimă în unități (ex. penicilina) sau în grame (ex. ampicilina, oxacilina, tetraciclina); ■ dizolvarea corectă a pulberilor de antibiotice în ser fiziologic, injectarea făcându-se imediat. Când nu sunt la dispoziție flacoane monodoză, dizolvarea se face pentru mai multe prize; ■ concentrația soluției obținută pentru penicilină poate fi de 50.000–200.000 u/ml; ■ evitarea asocierii în aceeași seringă a mai multor antibiotice sau a antibioticelor cu alte medicamente;

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
<p>■ Antimicotică ex. griseofulvină</p> <p>Efecte adverse: Alergice: erupții, șoc anafilactic Toxice: hepato-, nefro-, neuro-, ototoxice Biologice: dismicrobism, apariția rezistenței microbiene la antibiotice.</p> <p>2. ADMINISTRAREA CORTIZONULUI</p> <p>Cortizonul – este hormonul glandelor suprarenale secretat de stratul cortical sau analogi de sinteză.</p> <p>Acțiune: – antiinflamatorie (inhibă procesele inflamatorii exsudative, necrotice, proliferative);</p>	<p>tablete (ex. prednison)</p> <p>soluții în fiole (ex. hemisuccinat de hidrocortizon)</p>	<p>orală</p> <p>parenterală (injecții i.m., i.v., intraarticulare, intrarahidiene)</p>	<p>■ ritmul de administrare se respectă pentru a menține concentrația eficientă în sânge antibioticului – poate fi de 3-4-6 – 12-24 de ore</p> <p>■ calea de administrare se respectă, ea putând fi orală, intramusculară, intravenoasă, intrarahidiană, perfuzie intravenoasă. Penicilina V se administrează pe cale orală, cu 30 de minute înaintea meselor.</p> <p>– administrează sulfamidele cu o cantitate suficientă de apă pentru a asigura o diureză de 1.500 ml/24 de ore, evitând precipitarea renală.</p> <p>– evită sensibilizarea sa față de antibiotice, prin folosirea mănușilor de cauciuc în timpul dizolvării și manipulării antibioticelor.</p> <p>– respectă doza și ritmul de administrare;</p> <p>– respectă orarul de administrare pe cale orală, prednisonul administrându-se dimineața între orele 6 și 8, când secreția corticosuprarenalei este maximă;</p> <p>– învață pacientul să-și administreze pe cale respiratorie doza, fiind reprezentată de numărul de „puf-uri”;</p>

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
<p>– anti alergică.</p> <p>Se administrează în diferite afecțiuni: RAA, astm bronșic, șoc anafilactic, edem glotic, sau în hipofuncție corticosuprarenală.</p> <p>Cortizonul nu vindecă, ci modifică reacțiile la agentul cauzal. Eficacitatea are un caracter simptomatic, paliativ.</p> <p>Reacții secundare: – scăderea rezistenței organismului la infecții; – creșterea secreției gastrice de HCl; – perturbarea metabolismului sodiului, apei, glucidelor, proteinelor.</p> <p>3. ADMINISTRAREA ANTICOAGULANTELOR</p> <p>Anticoagulantele sunt medicamente care împiedică coagularea sângelui, acționând asupra factorilor plasmatici ai coagulării.</p>	<p>flacoane (ex. hidrocortizon acetat, volon)</p> <p>unguente (ex. fluometazonă pivalat)</p> <p>flacon presurizat (ex. beclomet)</p> <p>heparina – soluție în flacoane de 5.000 u/ml – fiole 5.000 u/ml</p>	<p>locală (pe tegumente și mucoase)</p> <p>respiratorie aerosoli</p> <p>parenterală injecții subcutanate, intravenoase, perfuzie intravenoasă</p>	<p>– respectă măsurile de igienă a tegumentelor mucoaselor și lenjeriei pacientului, pentru a preveni infecțiile locale;</p> <p>– asigură regimul alimentar al pacientului, care este desodat, hipoglucidic, hiperproteic, cu suplimentare de calciu, potasiu și fosfor;</p> <p>– supraveghează și notează zilnic în foaia de temperatură tensiunea arterială, greutatea corporală, raportul ingestie/excreție;</p> <p>– recoltează sângele pentru dozarea glicemiei la recomandarea medicului;</p> <p>– sesizează efectele secundare prezentate de pacient și informează medicul (insomnie, stare de euforie, anxietate, dureri epigastrice, HTA, creșterea în greutate).</p> <p>Atenție: este obligatorie agitarea fiolelor, flacoanelor cu suspensie (hidrocortizon acetat) în vederea administrării.</p> <p>– respectă indicațiile medicului privind doza, calea și ritmul de administrare</p> <p>– verifică calitatea produselor: termen de valabilitate, aspect, culoare, integritate;</p>

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
<p>Tratamentul se face sub control clinic și de laborator (timpul Howell, Quick, I.N.R. – International Normalized Ratio) pentru a preveni accidentele hemoragice.</p> <p>Heparina are acțiune imediată, de scurtă durată (cca 4–8 ore). Reacții adverse: alergie, febră, frison, erupții cutanate, șoc anafilactic.</p> <p>Anticoagulante cumarinice – trombostop – efectul lor se instalează după un timp de latență. Se folosește în tratamentul ambulatoriu sub controlul săptămânal al timpului Quick, Howell, care este de două ori și jumătate mai mare decât normal.</p>	<p>calciparina – seringi preumplute 0,2 ml – 5.000 u – fiole de 1 ml – 25.000 u</p> <p>fraxiparine – soluție 9.500 u/ml – seringi preumplute negradate 0,3–0,4 ml gradate 0,6–0,8 ml</p> <p>trombostop</p> <p>hepathrombină gel, unguent</p>	<p>injecții subcutanate</p> <p>injecții subcutanate</p> <p>orală</p> <p>aplicații locale pe tegumente și mucoase</p>	<p>– pregătește instrumentele și materialele necesare tehnicii de administrare în funcție de calea prescrisă de medic, respectând măsurile de asepsie. Astfel:</p> <p>a) Heparina – prin injecție subcutanată, intravenoasă sau în perfuzie cloruro-sodică izotonă; injecțiile se fac în zonele de elecție cunoscute și după tehnicile învățate;</p> <p>b) Calciparina și fraxiparine, prin injecție subcutanată. Locul de elecție este regiunea abdominală, anterolateral și posterolateral, stânga-dreapta. Tehnica de administrare: se inspectează regiunea, se dezinfectează tegumentele și se formează pliul cutanat între policele și indexul mâinii stângi, seringă preumplută cu acul atașat, se introduce perpendicular pe pliul cutanat, cu mâna dreaptă. Se verifică poziția acului și apoi se injectează. În timpul injectării se menține pliul cutanat; el se eliberează după scoaterea acului și dezinfectia locului injectiei. Accidente: durerea în timpul injectării impune tragerea imediată a acului și injectarea în altă zonă.</p> <p>c) Trombostop – se administrează pe cale orală. Se ține seamă de medicamentele care influențează efectul produsului. <i>Cresc efectul: aspi-</i></p>



Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
			<p>rina, paracetamol, fenilbutazonă; scad efectul; pansamentele gastrice, cărbunele medicinal.</p> <p>d) Hepathrombina – aplică gelul sau unguentul de mai multe ori pe zi pe zone cu contuzii, hematoame, entorse, făcând masaje în sensul circulației venoase. Aplică unguentul pe o compresă fină din tifon și apoi pe zonele cu acțiuni venoase inflamatorii.</p> <p>– supraveghează pacientul și sesizează apariția unor complicații, hemoragii (epistaxis, gingivoragii, metroragii, hematoame) și raportează medicului.</p> <p>– recoltează periodic sânge pentru monitorizarea timpului Quick, Howell.</p> <p>Atenție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ bula din seringile preumplute nu se elimină înainte de injectare. ■ nu se asociază heparina în soluție perfuzabilă salină izotonă cu alte medicamente. ■ în timpul tratamentului cu anticoagulante se evită injecțiile intramusculare, intravenoase, alte traumatisme. ■ tratamentul cu anticoagulante începe cu heparina și se continuă cu trombostop. ■ nu se fac masaje cu hepathrombină în caz de tromboze sau tromboflebite. ■ nu se aplică unguentul sau gelul pe mucoase sau răni deschise.

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
4. ADMINISTRAREA ANTIDIABETICELOR Insulina – este secretată de celulele beta, ale insulelor Langerhans ale pancreasului. Este singurul hormon hipoglicemiant cunoscut. După modalitatea de obținere: <ul style="list-style-type: none"> ■ insuline provenite de la porcine și bovine; ■ insuline înalt purificate, de tip Monocomponent MC; ■ insuline de tip uman HM (biosintetice sau semisintetice). După dinamica acțiunii: <ul style="list-style-type: none"> ■ insuline rapide (ex.: insulina cristalină, Actrapid MC, HM). Se utilizează în urgențe. ■ insuline intermediare (ex.: Semilentă MC, Monotard MC și HM, Humulin HM). Acțiunea începe la 45–120 de minute, durata 12–24 de ore. 	flacoane 5 ml/40u ex: insulina cristalină, Actrapid MC, HM flacoane Semilentă MC, Monotard MC, HM, Humulin HM flacoane insulină lentă Ultralent MC Huminsulin Long HM Pen-uri cartuș de 1,5 ml (100u/ml); 3 ml (100u/ml)	parenterală injecții subcutanate, intramusculare, intravenoase parenterală subcutanat parenterală subcutanat parenterală subcutanat	a) Pentru administrarea insulinei: <ul style="list-style-type: none"> – respectă prescripțiile medicului privind doza, calea și ritmul de administrare; – verifică valabilitatea preparatelor și aspectul lor (insulinele rapide sunt limpezi, cele intermediare au aspect lactescenț, dar fără flocoane); – păstrează flacoanele cu insulină la frigider (2–8°C); flacoanele din care se administrează se pot păstra și în cameră răcoasă la întuneric, la o temperatură sub 25°C; – pregătește pacientul în vederea administrării (insulinele rapide se administrează cu 15–30 de minute înaintea mesei); – pregătește instrumentele și materialele necesare pentru administrarea prin injecție subcutanată, intramusculară sau intravenoasă (în urgențe). Se utilizează seringi de unică folosință, gradate în unități de insulină. Flacoanele cu insulină intermediară sau lentă se omogenizează prin culcarea flaconului între palme și rularea lui blândă și repetată. Aspirarea dozei recomandate din flacon în seringă se face aplicând măsurile de asepsie și evitând pătrunderea bulelor de aer în seringă.

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
<ul style="list-style-type: none"> ■ insuline lente (ex.: Ultralent MC, Lente MC, Huminsulin Long HM). Preparate de insulină pentru „stilouri” (pen-uri) de tip HM cartușe. Efecte adverse: alergii, tahicardie, cefalee, dureri abdominale, diaree, balonări. Sulfamidele antidiabetice: <ul style="list-style-type: none"> ■ sulfonamide (ex: Tolbutamid, Glibenclamid). Se administrează pacienților cu obezitate. ■ biguanide (ex: Meguan, Silubin). Efecte adverse: dureri abdominale, balonări. 	pompă externă de infuzie a insulinei tablete ex: Tolbutamid, Meguan	prin cateter subcutanat, intraperitoneal orată	<ul style="list-style-type: none"> – injecția insulinei se face după tehnicile cunoscute ale injecțiilor subcutanate, intramusculare sau intravenoase, respectând locul de elecție și regulile de asepsie; – supraveghează pacientul și sesizează apariția unor complicații generale sau locale (hipoglicemia, alergii la insulină, hipodistrofia atrofică sau hipertrofică); – recoltează sânge, urină, à jeune și postprandial, pentru monitorizarea glicemiei și glicozuriei. Atenție: <ul style="list-style-type: none"> ■ fiecare tip de insulină se administrează cu seringă separată. ■ fiecare amestec insulenic se administrează cu seringă separată. ■ după dezinfecția dopului de cauciuc cu alcool, al flaconului de insulină, se așteaptă evaporarea alcoolului. ■ rotația locurilor de elecție ale injectiei subcutanate este obligatorie pentru a preveni lipodistrofia. ■ la pacienții normoponderali, pentru injectarea subcutanată a insulinei la nivel abdominal, nu este necesară formarea pliului cutanat.

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
			<ul style="list-style-type: none"> ■ la pacienții supraponderali, indiferent de locul de elecție al injecției subcutanate cu insulină, se va forma pliul și se vor utiliza ace de 12,5–19,5 mm. – învață pacientul cu diabet zaharat, insulinodependent, să-și administreze singur insulina prin injecție subcutanată, respectând zonele de elecție, doza și măsurile de asepsie. b) Pentru administrarea antidiabeticelor orale: <ul style="list-style-type: none"> – administrează antidiabeticelor sulfonamide (tolbutamid, glibenclamid) cu 30 de minute înaintea meselor; – supraveghează pacientul și sesizează apariția unor efecte secundare; – recoltează sânge și urină pentru monitorizarea glicemiei și glicozuriei.

ADMINISTRAREA INSULINEI

Omogenizarea preparatului
cu acțiune prelungităDezinfectia dopului
flaconului

Aspirarea dozei unice în seringă specială

Zonele de elecție
pentru injecția cu
insulină

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
5. ADMINISTRAREA CITOSTATICELOR Citostaticele (chimioterapice sau anticanceroase) au efecte citotoxice asupra celulelor cu proliferare intensă. Ele inhibă și celulele normale care se multiplică activ. Citostaticele favorizează dezvoltarea infecțiilor prin deprimarea mecanismelor de apărare a organismului. Efecte adverse: Grețuri, vărsături, anorexie, stomatită, diaree, alopecie reversibilă, pigmentarea pielii, fenomene neuro- și ototoxice.	flacoane cu pulbere liofilizată ex: Ciclofosfamidă (Endoxan) Vincristin Vinblastin Metrotexat tablete ex: Metrotexat	parenterală injecții intravenoase, perfuzii intravenoase și intraarteriale, intratumorale, intrapleurale, intraperitoneale orală	<ul style="list-style-type: none"> – respectă indicațiile medicului privind doza, calea și ritmul de administrare; – verifică termenul de valabilitate a produsului; – pregătește instrumentele și materialele necesare tehnicilor de administrare; – informează pacientul privind efectele secundare ale tratamentului (gastrointestinale, alopecie reversibilă) etc. – prepară soluția în funcție de produsul administrat (ex: Vincristin – un flacon de 200 mg, se dizolvă în 10 ml apă distilată sau glucoză 5%, sau ser fiziologic; dizolvarea se face fără încălzire, prin agitare puternică la temperatura camerei. Se utilizează soluția obținută la maximum două ore de la preparare. – administrează soluția prin injecție strict intravenoasă (pentru Vincristin, 1 ml într-un minut) sau în perfuzia lentă aflată în curs, în tubul perfuzorului. Atenție: <ul style="list-style-type: none"> ■ substanța este iritantă și impune verificarea poziției acului în venă, înainte și în timpul injectării. ■ dacă soluția pătrunde accidental în țesutul perivenos, se întrerupe injectarea și se continuă în altă venă; local, se injectează hialuronidază, pentru a reduce disconfortul.

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
<p>6. ADMINISTRAREA INTERFERONULUI</p> <p>Interferonul – substanță a organismului dotată cu proprietăți antivirale, anticanceroase și modulate ale funcției imunitare.</p>	<p>Intron A soluție injectabilă</p>	<p>injecții subcutanate</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ nu se administrează chimioterapie intravenos, în venele brațului, de partea sânilor pentru care s-a practicat mastectomie urmată sau nu de roentgenoterapie. – sesizează fenomenele neuro- și ototoxice, digestive apărute și informează medicul; – monitorizează funcțiile vitale și recoltează sânge și urină pentru evaluarea funcțiilor renale, hepatice și medulare; – hidratează suficient pacientul pentru a avea o bună diureză (ex: la administrarea cisplatinului, hidratarea se face cu 6–8 ore înainte, prin administrarea de 1–2 litri de lichid, și provocarea diurezei cu manitol. – respectă prescripțiile medicului privind doza, calea și ritmul de administrare; – verifică valabilitatea produsului; – pregătește instrumentele și materialele necesare în condiții de asepsie pentru administrarea produsului. <p>ex.: pentru Betaferon</p> <ul style="list-style-type: none"> – flacon cu solvent (NaCl 0,54%) 2 ml, cu căpăcel alb

Definiție. Acțiunea medicamentelor	Forme de prezentare	Căi de administrare	Intervențiile asistentei medicale. Reguli de respectat.
<p>Există trei tipuri de interferoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alfa – produs de monocite; – Beta – produs de către fibroblaști; – Gama – produs de către limfocitele T. <p>Interferonii obținuți prin inginerie genetică sunt utilizați în tratamentul sarcomului Kaposi (din cadrul SIDA), în hepatitele cronice și al unor cancere. Interferonul beta – în tratamentul sclerozei multiple; interferon alfa – în tratamentul hepatitelor cronice cu virus C.</p> <p>Efecte adverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sindrom pseudogripal ■ tulburări digestive (anorexie, greață, diaree) ■ tulburări neurologice ■ tulburări cardiovasculare ■ tulburări renale (proteinurie și hematurie) 	<p>Betaferon flacoane cu pulbere (căpăcel albastru)</p>	<p>injecții subcutanate</p>	<ul style="list-style-type: none"> – flacon cu Betaferon pulbere, cu căpăcel albastru – celelalte materiale pentru injecția subcutanată – prepararea soluției se face cu o seringă de 2 ml în care se aspiră 1,2 ml solvent ce se introduce în sticlă cu pulbere – se agită ansamblul flacon – seringă. Se obține o soluție limpede care se aspiră în seringă și apoi se injectează. – injectarea subcutanată se face după tehnica obișnuită; – supraveghează pacientul pentru a sesiza efectele adverse, informând medicul; – monitorizează TA, menține o bună hidratare a pacientului pentru a preveni hipovolemia; – recoltează produsele biologice pentru examenele de laborator, pentru monitorizare GOT, GPT, leucogramă; – învață pacientul tratat ambulatoriu cu Betaferon să-și prepare soluția și să-și administreze singur doza prescrisă. <p>Atenție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Betaferonul se păstrează la frigider, se transportă în containere termoizolante (T 0,8°C). ■ nu se îngheață. ■ soluția preparată se injectează imediat. ■ dacă la prepararea soluției apar grunji, soluția nu se va utiliza.

Determinarea grupelor sanguine

„În determinarea grupelor sanguine, trebuie să ne comportăm cu deosebită prudență, pentru că, spre deosebire de alte tehnici de laborator, o greșeală poate provoca moartea pacientului”

(J. D. James, 1953)

Imunoserologia sanguină – care s-a dezvoltat în prima jumătate a secolului al XX-lea după epocala descoperire a grupelor sanguine OAB, în anul 1901, de către Karl Landsteiner – este o disciplină de graniță, între medicină și biologie, cu largi implicații practice și teoretice în transfuzia de sânge, medicina legală, antropologie și genetică.

Ea reprezintă un caz particular al imunologiei generale și se bazează pe doi factori esențiali ai oricărui proces imun: antigenul și anticorpu.

Antigenele grupale se găsesc în special pe eritrocite și pot fi puse în evidență prin reacții de aglutinare, fapt pentru care se numesc aglutinogene.

Hematiia umană are un număr foarte mare de antigene de suprafață.

Anticorpii respectivi poartă numele de aglutinine, pentru faptul că provoacă reacții de aglutinare.

Între anii 1937 și 1940, Landsteiner și Wiener au efectuat cercetări asupra factorilor eritrocitari la om și la animale superioare, îndeosebi la primat. Printre altele încercări de imunizare, ei au injectat la iepuri eritrocite de la maimuța *Macacuscus rhesus*. Au obținut un ser de tip imun, care aglutina eritrocitele tuturor maimuțelor speciei *Macacuscus rhesus* (deci, 100%) și eritrocitele a 85% persoane de rasă albă a populației din New York. Aceasta înseamnă că 85% persoane de rasă albă aveau un antigen comun cu maimuțele *Macacuscus rhesus*, care a fost denumit factorul Rhesus (Rh). Anticorpii au fost denumiți anti-Rhesus, ori anti-Rh. Descoperirea a deschis, în serologia grupelor sanguine, un capitol de mare importanță în transfuzia și patologia nou-născutului. Astăzi, factorul Rh ρ (D) este răspunzător de o serie de afecțiuni ale acestuia, denumite, generic, boala hemolitică a nou-născutului.

După cum se vede, sângele uman conține o serie de aglutinogene și aglutinine. Transfuzia de sânge se poate efectua numai dacă există o identitate aglutinogenică între sângele donatorului și al primitorului. Aglutinogenul este un antigen natural, care se află fixat pe globulul roșu (eritrocit).

Aglutininele sunt anticorpi naturali și se găsesc în serul sanguin. De o importanță deosebită sunt aglutinogenele A și B, precum și aglutinogenul Rh.

Fată de aglutinogenele A și B, în sângele altor persoane există anticorpi naturali = aglutinine (alfa α (ANTI – A) și (beta) β (ANTI – B). Coexistența unui aglutinogen cu aglutinina corespunzătoare (A α ; B β) la aceeași persoană nu este compatibilă

cu viața, deoarece prezența aglutinogenului și aglutininei omoloage produce aglutinarea globulelor roșii.

Nu există aglutinine naturale specifice aglutinogenului Rh.

Studierea tenomenuiui de hemaglutinare a făcut posibilă descoperirea grupelor sanguine de bază – sistemul O.A.B. (zero, A, B)

Sistemul sanguin O.A.B. cuprinde patru grupe de sânge. Grupele se notează după numele aglutinogenului, deosebindu-se astfel: grupa: 0 (zero) A, B și AB. Un alt cercetător clasifică grupele sanguine notându-le cu cifre romane: I, II, III, IV.

Astăzi, pentru a înălțura posibilitatea unei interpretări greșite a grupelor sanguine de bază, ambele clasificări au fost unificate, sistemul sanguin OAB fiind reprezentat astfel:

grupa	aglutinogen (antigen)	aglutinine (anticorp)
0 (zero unu)	–	α și β
A II (A-doi)	A	β
B III (B-trei)	B	α
AB IV (AB-patru)	A B	–

După cum se vede, grupa 0 (I) nu are nici un aglutinogen (zero aglutinogen), celelalte au aglutinogen A sau B, sau amândouă – AB.

Determinarea grupelor sanguine se face prin două metode:

1) metoda directă – Beth-Vincent (aglutinine cunoscute și aglutinogen necunoscut);

2) metoda inversă – Simonin (aglutinogen cunoscut și aglutinine necunoscute)

Transfuzia de sânge nu se poate efectua fără determinarea grupei sanguine prin metodele amintite mai sus.

Recoltarea sângelui pentru determinarea grupelor sanguine	Pentru determinarea grupei sanguine se folosește fie sânge venos (din venă), fie sânge capilar (din pulpa degetului).
	• <i>Recoltarea sângelui venos:</i> – se recoltează 3-4 ml sânge din venă, într-o sticlă perfect uscată și, în prealabil, grilizată prin căldură uscată; – se lasă să coaguleze; astfel, se va separa serul și cheagul.
	• <i>Recoltarea sângelui</i> se poate face și pe <i>substanță anticoagulantă</i> (citrat de sodiu sau heparină); în acest caz, după sedimentare sau centrifugare, rezultă plasmă și masă eritocitară.
	– Atât serul, cât și plasma se utilizează pentru determinarea aglutinineor prin metoda Simonin și pentru proba de compatibilitate directă majoră Jeanbreau.
	– Hematiile se utilizează pentru determinarea aglutinogenului prin metoda Beth-Vincent.
	• <i>Recoltarea sângelui din pulpa degetului</i> este o metodă mai expeditivă, utilizată mai ales când se fac determinări cu scop informativ, în serie, în colectivități.

<p>Metoda directă Beth-Vincent folosind ser-test OI, AII, BIII</p>	<p>Determinarea aglutinogenului = metoda Beth-Vincent se face prin amestecarea eritrocitelor printr-unul cu serul standard O, A, B – deci, cu aglutinine cunoscute.</p> <p>• <i>Material necesar:</i></p> <p>– seruri – test OI, AII și BIII;</p> <p>Serurile test (denumite mai corect seruri hemotest) se livrează în fiole de la Institutul Cantacuzino, ambalate, etichetate, cu termenul de valabilitate trecut pe ambalaj; viabilitatea serurilor este de maximum 4 luni.</p> <p>– serul - test OI - conține aglutinine alfa (α) și beta (β);</p> <p>– serul - test AII - conține aglutinine beta (β);</p> <p>– serul - test BIII - conține aglutinine alfa (α);</p> <p>– lamă cu trei godeuri;</p> <p>– lame de sticlă curate și uscate;</p> <p>– pipete (pentru fiecare ser hemotest în parte);</p> <p>– pipete pentru sângele de cercetat.</p> <p>Dacă sângele se recoltează prin înțepare, se pregătesc ace sterile, alcool pentru dezinfecția pulpei degetului, vată, țâvă renală.</p> <p>• <i>Tehnică:</i></p> <p>pe lama cu godeuri, asistenta picură câte o picătură de ser hemotest în fiecare godeu, astfel:</p> <p>– picătura de ser test OI – în partea stângă a lamei;</p> <p>– picătura de ser test AII – la mijlocul lamei;</p> <p>– picătura de ser test BIII – în partea dreaptă a lamei.</p> <p>Picăturile vor fi așezate totdeauna în aceeași ordine de la stânga la dreapta.</p>
<p>Efectuarea tehnicii cu sânge recoltat din venă</p>	<p>– lângă fiecare picătură de ser-test se pune (cu ajutorul unei pipete sau baghetă de sticlă) câte o picătură din sângele pe care-l cercetăm;</p> <p>– picătura de sânge trebuie să fie aproximativ de 10 ori mai mică, decât picătura de ser test;</p> <p>– picăturile de ser se omogenizează cu picăturile de sânge, prin mișcări circulare; de fiecare dată, însă, se schimbă pipeta/baghetă sau se clătește într-un vas cu ser fiziologic și se șterge cu vată sau tifon.</p>
<p>Efectuarea tehnicii cu sânge recoltat prin înțepare</p>	<p><i>Când sângele se recoltează din pulpa degetului, se procedează în felul următor:</i></p> <p>– cu indexul și policele mâinii stângi, asistenta prinde degetul inelar al mâinii pacientului, strângându-l pentru a produce o ușoară hemostază;</p> <p>– cu mâna dreaptă, asistenta dezinfectează locul punctiei cu un tampon de vată, înbibată în alcool; șterge excesul de alcool;</p> <p>– apoi, efectuează înțeparea pulpei degetului pacientului cu un ac de seringă (la aproximativ 0,5 cm de vârful degetului, pe linia mediană);</p>

<p>Interpretarea rezultatelor</p>	<p>– cu vată uscată îndătură prima picătură de sânge care apare imediat după extragerea acului;</p> <p>– după aceea, cu câte un colț al lamei ștergite, asistenta ia pe rând câte o picătură de sânge, care se amestecă, prin mișcări circulare, cu serul-test.</p> <p>Se va avea în vedere – așa cum mai am spus – să nu se utilizeze de două ori același colț de lamă.</p> <p>După ce s-a pus sânge în cele trei godeuri cu ser-test se așteaptă 2-3 minute – timp în care lama se agită prin mișcări de basculare; în acest timp, se produce aglutinarea.</p>
<p>Metoda Beth-Vincent folosind ser ANTI-A și ANTI-B</p>	<p>• <i>Observație</i></p> <p>Pentru a interpreta rezultatele, ne uităm în primul rând la serul test OI. Dacă în acest ser s-a produs aglutinarea, ea mai trebuie să apară <i>neapărat</i> în serul grupei AII, fie în serul grupei BIII, fie în amândouă. În caz contrar, s-a comis o greșeală și analiza trebuie repetată.</p> <p>(Vezi tabloul: determinarea grupelor sanguine)</p> <p>Există patru posibilități:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aglutinarea nu se produce în nici unul din serurile-test; aceasta înseamnă că aglutininele prezente în serurile test n-au întâlnit nici un aglutinogen. 2. Aglutinarea se produce în picăturile marginale de ser-test OI și BIII; înseamnă că aglutininele α din serul test OI și BIII au întâlnit aglutinogene A și au produs aglutinarea hematiilor. 3. Aglutinarea se produce în serul test OI și serul-test AII din mijloc; înseamnă că aglutininele β din serul-test OI și AII au întâlnit aglutinogenul B și au produs aglutinarea hematiilor. 4. Aglutinarea se produce în toate godeurile; înseamnă că aglutininele α și β din serurile-test au întâlnit cele două aglutinogene A și B din sângele de cercetat și au produs aglutinarea hematiilor. <p><i>Sângele face parte din grupa AII.</i></p> <p><i>Sângele face parte din grupa AIII.</i></p> <p><i>Sângele face parte din grupa AIII.</i></p> <p>Anticorpii monoclonali ANTI A și ANTI B sunt de tip IGM și produc aglutinarea directă, pe lamă, la temperatura camerei, a antigenelor omoloage A, respectiv B. Reactivii au fost testați prin mai multe metode, sunt specifici, au o aviditate mult mai mare decât cele de sursă umană.</p> <p>• <i>Metoda de lucru:</i></p> <p>Se folosește sânge venos 3-4 ml.</p> <p>Pe o lamă cu godeuri, se picură câte o picătură de ser ANTI A respectiv ANTI B; alături, în dreptul fiecărei picături de ser, se adaugă câte o picătură de eritrocite de determinat (picătura de 10 ori mai mică decât picătura de ser); picăturile de ser se omogenizează cu cele de eritrocite, cu colțul unei lame sau cu baghetă de sticlă; după 3-4 secunde, apar primele semne de aglutinare, iar reacția este completă după un minut.</p>

Interpretarea rezultatelor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dacă aglutinarea nu se produce, înseamnă că sângele cercetat nu are aglutinogenul. <i>Apartine grupei OI.</i> 2. Dacă aglutinarea se produce în serul ANTI A, înseamnă că sângele cercetat are aglutinogen A. <i>Sângele aparține grupei AI.</i> 3. Dacă aglutinarea se produce în serul ANTI B, înseamnă că sângele de cercetat are aglutinogen B. <i>Sângele aparține grupei B III.</i> 4. Dacă aglutinarea se produce în ambele seruri-test, înseamnă că sângele conține atât aglutinogen A, cât și aglutinogen B. <i>Face parte, deci, din grupa AB IV.</i> <p>■ Important: simultan cu determinarea antigenelor A și B, prin metoda de mai sus, este obligatorie și determinarea anticorpiilor, prin metoda Simonin.</p>
Metoda Simonin	<p>● Metoda de determinare a aglutininelor</p> <p>Pentru metoda Simonin se folosesc hematii test, care se obțin de la fiecare punct de transfuzie; valabilitatea hematiilor este de maximum 3 zile.</p> <p>Avert, deci, aglutinogen cunoscut și aglutinine necunoscute.</p> <p>● Materialele necesare sunt aceleași ca și la proba directă, dar, în loc de seruri-test, se folosesc eritrocite-test. Este nevoie, de asemenea, de ser sau plasmă, deci nu este suficientă recoltarea numai prin înțeparea pubei degetului, ci trebuie să se recolteze sânge prin puncție venoasă.</p> <p>● Technica</p> <p>asistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cu o pipetă Pasteur, pune câte o picătură din serul sau plasma de cercetat în două godeuri; — deasupra fiecărei picături de ser de cercetat, aflat pe lamă, se pune o picătură din hematiile test — cu aglutinogenul cunoscut, respectiv hematii — test AI și BIII; <p>■ Atenție! Și prin această metodă, cantitatea de ser este de 10 ori mai mare decât cea de hematii.</p> <ul style="list-style-type: none"> — se efectuează omogenizarea.
Interpretarea rezultatelor	<ul style="list-style-type: none"> — Dacă aglutinarea s-a produs în ambele picături omogenizate înseamnă că în serul de cercetat se află ambele aglutinine (α și β). Serul de cercetat face, deci, parte din grupa OI. — Dacă aglutinarea se produce numai în picătura de ser în care am pus eritrocite — test BIII — înseamnă că aglutinogenul B s-a întâlnit cu aglutinina omoloagă β. Deci serul aparține grupei AI. — Dacă aglutinarea se produce numai în picătura de ser în care am pus eritrocite — test A II — înseamnă că s-a întâlnit cu aglutinina α, care a aglutinat hematiile-test. Serul aparține grupei B III. <p>— Dacă aglutinarea nu s-a produs în nici una din picăturile serului de cercetat înseamnă că serul nu are aglutinine, deci face parte din grupa AB IV.</p>




Fig. 37 – Determinarea grupelor sanguine

● DETERMINAREA FACTORULUI Rho (D)

Definiție	Factorul Rh este un aglutinogen (antigen) legal de eritrocit, independent de aglutinogenele din sistemul OAB. Fiind un antigen puternic, el se impune în cadrul mecanismului aglutinogen-anticorpi anti-Rh formându-se prin transfuzie sau sarcină la persoane care nu au acest aglutinogen (sunt Rh-negative).
Scop	determinarea compatibilității față de factorul Rh, importantă în transfuzie și sarcină, deoarece incompatibilitatea produce accidente
Pregătire	<ul style="list-style-type: none"> • <i>material:</i> <ul style="list-style-type: none"> - lavă medicală - lame de sticlă curate, degresate, uscate - ser anti-Rh și pipetă - casoleță cu tamponare de vată - eter, alcool medicinal - cameră umedă (cutie Petri cu o baghetă de sticlă în potcoavă și o hartă de filtru umezită) - ser fiziologic, termostaț • <i>pacient</i> <ul style="list-style-type: none"> - psihic și fizic – ca la determinarea grupelor
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> • <i>determinarea factorului Rh pe lamă:</i> <ul style="list-style-type: none"> - spălarea atenă a mâinilor; - se verifică valabilitatea serului anti-Rh, aspectul, culoarea - se pun, pe lama de sticlă, în ordine, cu pipeta din fiola de ser anti-Rh, 3 picături de ser-test, fiecare cu un diametru de 5-6 mm - picăturile din stânga și dreapta lamei se folosesc ca martori, iar picătura din mijloc - pentru determinarea donității - se degresează cu eter pulpa degetului mijlociu sau inelar și se efectuează înteparea - se șterge prima picătură de sânge cu vată uscată - se ia cu un coț al lamei o picătură de sânge, care se pune peste a doua picătură de ser-test anti-Rh - picătura din sânge se amestecă cu eritrocite Rh- pozitive, iar cea din dreapta - cu eritrocite Rh-negative - se omogenizează cele trei picături prin mișcări circulare - se aplică un tampon cu alcool pe regiunea întepată - se așază lama în camera umedă, apoi la termostaț, la 37°C - se citește rezultatul după 30-60 de minute.
Interpretare	<ul style="list-style-type: none"> - dacă aglutinarea s-a produs în primele două picături de ser, Rh-ul este pozitiv, dacă nu se produce aglutinarea (picătura este mobilă) Rh-ul este negativ (se citește prin comparație cu hematiile martor)

Determinarea factorului Rh în eprubetă	<ul style="list-style-type: none"> - se folosește, de preferință, sânge necitrat - hematiile sunt spălate de două-trei ori cu ser fiziologic și se face o suspensie 2%, operativ pe care o suferă și hematiile martor Rh pozitive și Rh-negative, ce se pun în eprubetele martor - în eprubeta de hemoliză se pune o picătură din suspensia de hematii 2%, peste 2 picături de ser anti-Rh - se omogenizează eprubetele și se așază pe stativ - se introduce la termostaț la 37°C - se citește rezultatul după 30 de minute - formă nereglată a sedimentului și prezența grunțiilor de aglutinare arată reacție pozitivă (Rh pozitiv).
Reorganizare	
Notare în foaia de observație	

<p>■ DE ȘTIUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deseori, determinarea factorului Rho(D) prin metoda obișnuită nu este posibilă, întrucât acest factor este „acoperit” - pentru a-l „descoperi”, trebuie să utilizăm fermenți proteolitici - papaină 1%, o picătură adăugată la picătura de ser anti-Rh și sânge - pentru fiecare determinare OAB și Rh se fac două examene (ambele metode), de către doi tehnicieni, cu două serii de seruri-test - rezultatele OAB și Rh sunt considerate definitive numai după a doua determinare de grup, efectuată la distanță de prece- dență 	<p>■ DE EVITĂȚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raportul încorect între sânge și ser (picătura de sânge gătă fie mai mică de 10-20 de ori decât cea de ser anti-Rh) - omogenizarea, cu același coț al lamei, a tuturor picăturilor (rezultate false) - atmosfera prea caldă (usucă mar- ginile picăturilor) - folosirea serului-test anti-Rh cu litru slab, prost conservat sau cu valabilitate depășită - transmiterea rezultatelor prin telefon
--	---

COMPATIBILITATEA TRANSFUZIONALĂ

Scop	<ul style="list-style-type: none"> - reducerea la minimum a riscurilor accidentelor imunologice - evitarea înfînării, în circulația primitorului, între anticorp și anti- genul său specific - evitarea hemolizei intravasculare acute - asigurarea că pacientul beneficiază de transfuzia pe care o primește
Măsuri de prevenire	<ul style="list-style-type: none"> - determinarea grupei în sistemul OAB și Rh la primitor - alegerea unui sânge de donator izogrup OAB și Rh

Metode	- executarea probei de compatibilitate directă între serul primitorului și eritrocitele donatorului - proba de compatibilitate majoră - directă (Jeanbreaux) - proba de compatibilitate biologică (Oelecker)
---------------	---

**PROBA DE COMPATIBILITATE
DIRECTĂ MAJORĂ – IN VITRO (JEANBREAU)**

Scop	- decelează anticorpii din serul bolnavului, care ar putea distruge eritrocitele donatorului - pune în evidență incompatibilitatea în sistemul OAB, prezența anticorpi imuni din sistemul Rh (dacă primitorul este Rh ^o (D) negativ și are anticorpi anti-Rh ^o (D), iar donatorul Rh-pozitiv a fost greșit determinat ca Rh-negativ).
Pregătire	• materiale: - lame de sticlă curate, degresate, uscate - flaconul sau punga cu sângele de cercetat - seringi și ace sterilizate - pipete, mănuși de protecție - termostat, vată, alcool • pacient - psihic și fizic ca la punctia venoasă
Execuție	- asistenta se spală pe mâini - îmbracă mănușile sterile - recoltează sânge prin punctie venoasă - introduce sângele la centrifugă - pune o picătură din plasma primitorului pe o lamă peste care adaugă eritrocite de la donator - respectă proporția de 1/10 între globule și ser - citește rezultatul după 5 minute, la rece - adaugă o picătură de papaină și introduce la termostat timp de 30 minute
Interpretare	- dacă în picătură se produce aglutinarea, sângele primitorului nu este compatibil cu sângele donatorului - dacă nu se produce aglutinarea, sângele este compatibil și poate fi transfuzat

**PROBA DE COMPATIBILITATE
BIOLOGICĂ OELECKER – IN VIVO**

Scop	- verificarea, în plus, dar obligatorie, a felului în care primitorul reacționează față de sângele ce i se introduce intravenos, prin transfuzie
-------------	--

Pregătire	• materiale: - instrumentele și materialele necesare efectuării unei transfuzii (vezi transfuzia) - medicamentele necesare pentru eventuale accidente posttransfuzionale • pacient - psihic și fizic, ca pentru punctia venoasă
Execuție	- asistenta se spală pe mâini - îmbracă mănuși sterile - instalează aparatul de transfuzie - lasă să se scurgă prin picurător primii 20 ml de sânge - reglează ritmul de scurgere la 10-15 picături/minut, timp de 5 minute - supraveghează foarte atent pacientul timp de 5 minute - dacă apar semnele incompatibilității de grup (senzație de frig, trison, cetaieș, dureri lombare, tahicardie, urticarie, congestia feței), întrerupe transfuzia și anunță medicul - dacă nu apar semnele incompatibilității de grup, introduce din nou 20 ml sânge în ritm mai rapid, după care reglează ritmul la 10-15 picături/minut - supraveghează pacientul timp de 5 minute - dacă nu apar semnele incompatibilității de grup, continuă transfuzia în ritmul prescris.

■ DE ȘTIUT: - în stabilirea incompatibilității de grup se vor observa simptomele obiective și senzațiile spontane ale pacientului	■ DE EVITAT: - a se pune întrebări frecvente pacientului de ar sugera anumite simptome, îngreunând orientarea în fața cazului
---	---

Transfuzia de sânge

Definiție	Administrarea sângelui de la donator la primitor, atât direct, cât și după o fază intermediară de conservare într-un flacon de sticlă sau pungă de plastic – se numește transfuzie.
Scop	<ul style="list-style-type: none"> – restabilirea masei sanguine și asigurarea numărului de globule roșii necesare pentru transportul oxigenului în caz de hemoragii, anemii, stări de șoc – îmbunătățirea circulației periferice, reducerea anoxemiei și mobilizarea sângelui de rezervă al organismului – stimularea hematopozei – mărirea capacității de coagulabilitate a sângelui în vederea hemostazei, prin introducerea în sângele primitorului a unor noi cantități de elemente necesare procesului de coagulare, în caz de hemofilie, trombocitopenie – aport de substanțe nutritive, proteice – stimularea reacțiilor metabolice ale organismului, intensificarea schimburilor celulare – stimularea reacțiilor antitoxice și antiinfecțioase prin acțiunea sângelui transfuzat asupra sistemului reliculo-endoletal, în special când se administrează sânge de la convalescenți, după boala respectivă – corectarea imunodeficiențelor – corectarea unor deficiențe plasmatice congenitale – depurarea organismului prin înlocuirea, parțială sau totală, cu sânge proaspăt, a sângelui încărcat cu substanțe toxice (autogene sau exogene)
Transfuzia directă	<ul style="list-style-type: none"> – constă în trecerea nemijlocită a sângelui din aparatul vascular al donatorului în sistemul vascular al primitorului – se utilizează numai în condiții excepționale, cu caracter de urgență, în lipsa sângelui conservat – se alege un donator cu sânge izo-grup, izo-Rh și numai excepțional un donator universal (grup O(1)) – se determină grupul în sistemul OAB și Rhesus, comparându-l cu cel al primitorului – pacientul și donatorul vor fi plasați în paturi paralele, apropiate, cu membrele superioare ce vor fi folosite pentru puncte așezate unul lângă altul pe o măsură acoperită cu câmp steril, la o distanță de aproximativ 30-40 de cm – se puncționează întâi vena primitorului, se ridică garoul și se introduce pe ac un mandrin

Transfuzia indirectă	<ul style="list-style-type: none"> – se puncționează vena donatorului, se aspiră sângele care fiind amestecat cu aerul din tubul aparatului „Marin Popescu”, se eliminează într-un pahar – când sângele nu mai conține bule de aer, se introduce la primitor – cantitatea de sânge transfuzat nu va depăși 500-600 ml (ipotimia donatorului) – se supraveghează atent pacientul câteva ore.
Pregătire	<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiale:</i> <ul style="list-style-type: none"> – toate materialele necesare perfuziei i.v. – trusă pentru perfuzat sânge cu filtru în picurător – sânge izo-grup, izo-Rh – materiale necesare controlului grupei sanguine – medicamente pentru eventuale accidente – învelitoare de flanelă – cas. letă cu câmpuri sterile – aparat de oxigen • <i>sânge:</i> <ul style="list-style-type: none"> – se verifică integritatea flaconului sau pungii, valabilitatea, aspectul macroscopic al sângelui Sângele, păstrat câteva ore la frigider, se sedimentează în <i>trei straturi</i>: <ul style="list-style-type: none"> – stratul inferior cuprinde masa eritrocitară, este vâscos, siropos, de culoare roșie închis – stratul al doilea – o peliculă fină, albicioasă format din leucocite și trombocite – stratul al treilea – limpede, omogen, de culoare galben verzui, constituind plasma – se încălzește sângele la temperatura corpului • <i>pacient:</i> <ul style="list-style-type: none"> – psihic <ul style="list-style-type: none"> – i se explică necesitatea și <i>riscul</i> transfuziei – dacă este posibil, pacientul își exprimă consimțământul în scris – dacă pacientul refuză, fiind conștient și cunoscând consecințele refuzului, transfuzia nu se va efectua – aparținătorii nu au drept de hotărâre – fizic <ul style="list-style-type: none"> – pacientul nu va mânca – se așază în decubit dorsal, comod, cu brațul în extensie și supinație

	<ul style="list-style-type: none"> – i se administrează romergan (dacă este alergic) – se acoperă cu învelitoarea
Execuție	<ul style="list-style-type: none"> • montarea flaconului: <ul style="list-style-type: none"> – spălarea mâinilor cu apă și săpun – asistenta îmbracă mănuși sterile pentru protecție – se efectuează proba de compatibilitate directă Jeanbreau pentru fiecare flacon – se îndepărtează dopul de parafină (când este cazul) – se dezinfectează dopul cu tinctură de iod – se montează aparatul de perfuzat (cu filtru în picurător) • evacuarea aerului din tubul aparatului: <ul style="list-style-type: none"> – se face la fel ca la perfuzia de seruri (vezi perfuzia) – se fixează flaconul (punga) în stativ • efectuarea puncției venoase: <ul style="list-style-type: none"> – se alege o venă și se puncționează – se îndepărtează jaroul și se atașează amboul aparatului de transfuzat la ac • efectuarea probei biologice Oelecker: <ul style="list-style-type: none"> – se fixează acul, amboul și extremitatea tubului la piele – se lasă 20-30 ml de sânge să curgă prin picurător și se reglează ritmul la 10-15 picături/minut timp de 5 minute – se supraveghează pacientul și dacă nu apar semne de incompatibilitate se repetă operația • efectuarea transfuziei: <ul style="list-style-type: none"> – dacă nu au apărut semne de incompatibilitate, se continuă transfuzia în ritmul stabilit de medic – se supraveghează, în continuare, pacientul și ritmul de scurgere la nivelul picurătorului – se pregătește flaconul următor (dacă este cazul) • închiderea transfuziei: <ul style="list-style-type: none"> – se rețin din fiecare flacon 5-6 ml de sânge pentru verificări ulterioare, în caz de accidente posttransfuzionale tardive – se închide prestubul, se aplică o pensă între ambou și tubul de control – se retrage acul și se comprimă vena cu un tampon steril – se aplică pansament steril la locul puncției și se fixează
Îngrijirea ulterioară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – se așază comod, se acoperă – se asigură temperatura camerei cu 1-2°C mai ridicată – se oferă pacientului lichide calde (dacă este permis) – se alimentează după 2 ore de la terminarea transfuziei (dacă este permis)
Reorganizare	

Notarea în foaia de observație	<ul style="list-style-type: none"> – se notează numărul flaconului și cantitatea de sânge transfuzat; eventualele reacții ale pacientului
Accidente	<ul style="list-style-type: none"> – incompatibilitatea de grup în sistemul OAB, manifestată sub forma socului hemolitic <ul style="list-style-type: none"> – se întrerupe transfuzia la apariția semnelor precoce (frison, tahicardie, dispnee, cianoză, stare generală alterată, dureri lombare, retrosternale) – transfuzarea unui sânge alterat <ul style="list-style-type: none"> – infectat cu germeni virulenți care provoacă frisoane puternice la 1-2 ore după transfuzie; se încălzește pacientul cu pături, buiole și se administrează băuturi calde, se începe antibioticoterapie masivă, după antibiograma sângelui infectat – infectat cu virusul hepatitei epidemice, cu plasmă din malariei, spirochete sau brucele – manifestările apar după trecerea perioadei respective de incubație – prezența substanțelor pirogene provoacă frison, cefalee, febră <ul style="list-style-type: none"> – embolie pulmonară • cu cheaguri, manifestată prin agitație, cianoză, dureri toracice, tuse chinătoare, hemoptizie, febră • cu aer, manifestată prin alterarea bruscă a stării generale, cianoză, dispnee, tensiunea arterială scăzută, puls filiform; se iau măsuri antishoc de către medicul anestezist-reatimator – transfuzia sângelui neîncălzit poate provoca hemoliză intravasculară cu blocaj renal, soc posttransfuzional, acidoză metabolică, stop cardiac prin hipotermie
Incidente	<ul style="list-style-type: none"> – înfundarea aparatului cu cheag – se schimbă aparatul – sângele poate conține cheaguri sau pelicule de fibrină ce se depun pe filtru – se schimbă flaconul și perfuzorul – ieșirea acului din venă – perforarea venei – coagularea sângelui venos reținut în ac – se schimbă acul
Pericole potențiale ale transfuziei masive	<ul style="list-style-type: none"> – hipotermia – intoxicație cu citrat – scade calcemia – hiperpotasemie până la 7-8 mEq/l – modificări ale pH-ului în sens de acidoză – modificări ale coagulării și fibrinolizei – accidente serologice – accidente de izoinimizare
Derivatele sanguine	<ul style="list-style-type: none"> – plasmă – concentrate eritrocitare sau eritrocite deplasmate – suspensie de leucocitizată de eritrocite – plasmă în formă uscată sau liofilizată – concentrate trombocitare – albumină umană – plasmă antihemofilică – gamaglobuline și imunoglobuline umane specifice

■ DE EVITAT:

- permeabilizarea acului infundat cu cheag prin presiune sau cu mandrină
- încălzirea sângelui în apă fierbinte;
- încălzirea sângelui peste temperatura corpului; încălzirea sângelui deasupra surselor de căldură
- agitare sau scuturarea flaconului
- pierderea unei cantități importante de sânge la eliminarea aerului din aparat
- umplerea picurătorului cu sânge (nu se mai poate urmări ritmul)

■ DE ȘTIUT:

- la apariția reacțiilor posttransfuzionale se returnează flaconul cu preparatul transfuzat la laboratorul imunohematologic și se recoltează posttransfuzional 10 ml de sânge simplu și 5 ml de EDTA pentru determinări serologice
- operațiile de montare a transfuziei se vor face în condiții de perfectă asepsie
- evidențierea hemolizei intravasculare se face prin depistarea Hb libere în ser

Pregătirea preoperatorie

PREGĂTIREA PREOPERATORIE

1. Pregătirea fizică și psihică a pacientului
2. Pregătire generală: A. Bilant clinic
B. Bilant paraclinic
3. Pregătirea pentru operație (sau îngrijiri preoperatorii)

Scop

- Pregătirea pacientului înaintea intervenției chirurgicale este un element major de prevenire a infecțiilor postoperatorii. De ea depinde reușita operației și evoluția postoperatorie.
- Neutralizarea surselor de suprainfecție, care au originea: la nivelul pielii (incizie); la distanță (naso-faringian și vezică urinară)
- Reducerea posibilităților de contaminare a pielii, prin utilizarea de antiseptice
- Depistarea și semnalarea unor leziuni cutanate, infecții ORL sau urinare recente ori vindecate, paraziți externi, posibilități de alergii

PREGĂTIREA FIZICĂ ȘI PSIHICĂ A PACIENTULUI

Ajunși în secția de chirurgie, pacienților trebuie să li se asigure confort fizic și psihic.

Pacienții internați sunt agitați, speriați, inhibați de teama intervenției chirurgicale, de diagnosticul imprevizibil, de anestezie, de durere, de moarte.

Asistența medicală are obligația, ca prin comportamentul și atitudinea ei să înlăture starea de anxietate în care se găsește pacientul înainte de operație:

- să-l ajute pe bolnav să-și exprime (gândurile, grijele, teama)
- să-i însușe încredere în echipa operatorie
- să-i explice ce se va întâmpla cu el în timpul transportului și în sala de pre-anestezie; cum va fi așezat pe masa de operație; când va părăsi patul; când va primi vizite etc.
- să-l asigure că va fi însoțit și ajutat.

Asistența medicală și toată echipa de îngrijire trebuie să fie pregătită pentru un răspuns sigur și încurajator la întrebarea inevitabilă „ce credeți, mai mă fac bine?” Uneori, de acest răspuns va depinde starea lui de îniste ulterioară.

Stările de tensiune din cadrul echipei de îngrijire trebuie să fie disimulate față de pacient.

Asistența medicală trebuie să răspundă cu amabilitate, profesionalism, siguranță și promptitudine la solicitările tuturor pacienților, încât aceștia să capete încredere în serviciul în care a fost internat.

Prin atitudinea ei, nici *distanță*, dar nici *familiară*, nici dură, dar nici cu slăbiciune, binevoitoare, dar și autoritară, va reuși, cu siguranță, să inspire pacienților încredere.

Dacă:

- ea nu va dovedi răbdare, pricepere, în conducerea unei discuții de început, menită să încurajeze bolnavul
- obișnuința și rutina manifestate prin scepticism și insensibilitate nu sunt combătute
- aspectul exterior nu va arăta sobrietate și demnitate
- limbajul folosit nu va fi adecvat, pe înțelesul celui cu care stă de vorbă, încrederea pacientului va scădea și starea lui psihică va fi defavorabilă.

PREGĂTIRE GENERALĂ

A. BILANT CLINIC: 1. Bilant clinic general	Asistența medicală, printr-o observație clinică justă și susținută asupra pacientului, are obligația: - să observe și să consemneze aspectul general al pacientului, înălțimea și greutatea sa (obezitatea și cașexia), vârsta aparentă și reală, aspectul pielii (ne ajută să cunoaștem starea de hidratare sau deshidratare a organismului), ținuta, fațesul, mersul, starea psihică - să urmărească, atent și sistematic, necesitățile pacientului și manifestările de dependență generate de nesatisfacerea nevoilor, ca să poată stabili obiective evaluabile pentru o îngrijire pertinentă și de calitate - să ia cunoștință de situația globală în care se află pacientul și, într-o manieră selectivă, să remarce detaliile importante, schimburile care apar în evoluția lui și utile pentru explorarea preoperatorie - să culegă date din diverse surse: foaia de observație, foaia de temperatură, familia pacientului, ceilalți membri ai echipei de îngrijire, însă principala sursă rămâne <i>pacientul</i> . Culegerea datelor să se facă cu mare atenție și minuțiozitate, pentru a nu scăpa problemele importante și pentru a se face o evaluare corectă a lor - toate datele privind starea generală a pacientului și evoluția bolii acestuia se notează permanent în F.O. și planul de îngrijire, pentru a obține un tablou clinic exact, care va fi valorificat de echipa de îngrijire și va fi baza unui nursing de calitate
	● a. <i>familiale</i> : - dacă în familie au fost bolnavi cu: - neoplazme - diabet

3. Urmărirea și măsurarea funcțiilor vitale și vegetative	- H. T. A. - cardiopatii - tuberculoză etc. ● b. <i>chirurgicale</i> : - dacă a mai suferit alte intervenții - dacă au avut evoluție bună - dacă au fost complicații ● c. <i>patologice</i> : - se vor nota bolile care au influență asupra anesteziei și intervenției - dacă a avut afecțiuni pulmonare și dacă este fumător - afecțiuni cardiace - tare cronice: diabet, etilism etc - epilepsie
4. Examenul clinic pe aparate	Este făcut de medic prin: - inspecție - palpare - percucie - auscultatie Este foarte importantă și utilă cunoașterea examenului clinic pe aparate, pentru completarea bilanțului clinic preoperator
B. BILANT PARACLINIC	- completează examenul clinic - permite o apreciere exactă a stării viitorului operat - rezultatele examenelor paraclinice depind de profesionalismul și corectitudinea cu care asistentele medicale au făcut recoltarea produselor biologice și patologice sau au pregătit bolnavul pentru investigație Pentru o mai bună înțelegere a pregătirii preoperatorii, putem clasa examenele paraclinice în:
1. Examine de rutină	- sunt examene de laborator, obligatorii înaintea tuturor intervențiilor chirurgicale, indiferent de timpul avut la dispoziție pentru pregătire și indiferent de starea generală a pacientului: - timp de sângereare și de coagulare - hematoocrit - glicemie - uree sanguină

2. Examenne complete

– hecografie, urografia completă
– V.S.I.P.

- ionogramă
- E.A.B. (echilibrul acido-bazic)
- coagulograma completă
- probe de disproteinemie
- proteinoemie
- transaminaze
- examen de urină
- electrocardiogramă
- radiografie sau radioscopie pulmonară

3. Examenne speciale

Sunt în funcție de aparatul sau organul pe care se întreprind:

• a. Explorarea aparatului respirator

- radioscopia sau radiografia pulmonară
- bronhografia
- bronhoscopia
- tomografia
- explorarea funcției pulmonare: – spirometrie
- examenul sputei

• b. Explorarea aparatului cardiovascular

- probe de efort
- oscilometrie, oscilografie
- electrocardiograma, fonocardiograma
- examenul fundului de ochi (la hipertensiv)
- examenne radiologice:
 - arteriografie
 - angiocardiografie
 - flebografie
- explorări izotopice
- cateterism cardiac
- recolare de sânge pentru:
 - colesteroi
 - lipemie

• c. Explorarea tubului digestiv

- examenul radiologic:
 - cu substanțe de contrast:
 - esofag bariat
 - tranzit bariat
 - irigografie
 - fără substanță de contrast:
 - esofagoscopie
 - gastroscopie
 - duodenoscopie
 - colonoscopie
 - rectoscopie
 - anuscopie
- chimismul gastric
- tubajul duodenal
- examenul materiilor fecale

- examenul cu izotopi radioactivi
- tomografie

• d. Explorarea funcției hepatice

- explorarea funcției excretorie bilare:
 - tubaj duodenal
 - recoltări de sânge pentru: bilirubină, colesteroi
- explorarea funcției de coagulare:
 - urologiogramă completă
 - litinogramă
- explorarea funcției metabolice:
 - electroforeză, dozare de proteine
 - probe de disproteinemie
 - lipide, colesteroi
 - glicemie

– explorarea pancreasului

- scintigrafie
- arteriografie selectivă, pancreatică
- duodenoscopie
- tubaj duodenal (testul secreției)
- pancreatografie

• e. Explorarea funcției renale

- examenul de urină complet, urocultură, ADDIS
- examenul de sânge: urme, acid uric, creatinina, fonogramă, echilibrul acido-bazic (EAB)
- examenne endoscopice:
 - cistoscopie
 - cromo-cistoscopie
- examenne radiologice:
 - urografie I.V.
 - cistografie
 - pielografie
- examenne izotopice:
 - scintigramă renală
 - renogramă izotopică

PREGĂTIREA PENTRU OPERAȚIE

Se face în funcție de tipul avut la dispoziție și de starea generală a pacientului

A. TIMP SUPRĂVIEȚUȚ PĂCIENT INDEPENDENT

în ziua precedentă

• 1. repaus

• 2. regim alimentar

- ușor digerabil
- consum de lichide pentru:
 - menținerea T.A.
 - dezinfectarea și mărirea diurezei
- întreruperea serei postoperatorii
- eliminarea acidului postoperatorii

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>c. Alte pregătiri pentru intervenții speciale:</i> <ul style="list-style-type: none"> – antibioterapie când se anticipează apariția unei infecții postoperatorii – spălaturi vaginale repetate cu antiseptice, pentru intervenții ginecologice – spăltură gastrică în intervenții laborioase pe stomac
În seara zilei precedente	<ul style="list-style-type: none"> • <i>a. Pregătirea pielii:</i> <ul style="list-style-type: none"> – băta generală, la dus, inclusiv spațiul părului (după clisma evacuatoră) – se limpezește abundent – se șterge foarte bine – se verifică regiunea inghinală, ombilicul, axilele, unghiile (scurte, fără lac de unghii), picioarele, spațiile interdigitale – toaleta bucodentară – toaleta nasului – ras: – cât mai aproape posibil de momentul intervenției, pentru a evita proliferarea germenilor la nivelul escoriațiilor cutanate – cât mai larg, în funcție de zonă – cu aparat de ras propriu – folosirea de creme deplatoare (în unele cazuri) – badijonal cu alcool sau alte soluții antiseptice colorate – pansament antiseptic uscat • <i>b. Pregătirea tubului digestiv:</i> <ul style="list-style-type: none"> – clismă evacuatoră (cu excepția intervențiilor pe rectocolon); – nu se dau purgative - se face dus după clismă – alimentație lejeră: – supă de legume – băuturi dulci sau alcaline
În ziua intervenției	<ul style="list-style-type: none"> – pacientul nu mai bea <i>a. În cameră (salon):</i> <ul style="list-style-type: none"> – se mai face, eventual, o clismă cu patru ore înaintea intervenției – se îndepărtează bijuteriile – se îndepărtează proteza dentară mobilă (se păstrează în cană cu apă) – se rebadijonează, cu un antiseptic colorat, regiunea rasă – se îmbracă pacientul cu lenjerie curată, în funcție de intervenție – se pregătesc documentele: F.O., analize, radiografii, care vor însoți pacientul • <i>b. Transportul pacientului în sala de operație:</i> <ul style="list-style-type: none"> – se face numai însoțit de asistenta medicală, care are obligația să predea pacientul asistentei de anestezie, împreună cu toată documentația și alte observații survenite ulterior și foarte importante pentru intervenția chirurgicală

	<ul style="list-style-type: none"> – se face cu brancard, pat rulant, cânușor, în funcție de boală și bolnav – pacientul trebuie să fie așezat confortabil și acoperit • <i>c. În sala de preanestezie:</i> <ul style="list-style-type: none"> – se verifică regiunea rasă și se notează eventualele escoriații (eczeme, intertrigo etc.) – se verifică starea de curățenie: regiunea inghinală, ombilicul, axilele, spațiile interdigitale, unghiile – se verifică dacă s-a îndepărtat proteza dentară – se pregătesc zonele pentru perfuzie, prin badijonare cu antiseptice colorate – instalarea sondei urinare (sau, după caz, se golește vezica urinară) de către asistenta de sală, după spălatul chirurgical al mâinilor, îmbrăcatul cu echipament steril, câmp steril în zona genito-urinară • <i>d. În sala de operație:</i> <ul style="list-style-type: none"> – se execută ultima parte a pregătirii pacientului – se instalează și fixează pacientul pe masa de operație – montarea funcțiilor vitale – obținerea unui abord venos (ac simplu, branulă, cateter) în funcție de intervenție și de pacient(**) – pregătirea câmpului operator – badijonarea cu alcool pentru degresarea și curățirea pielii de antisepticul anterior – badijonarea cu tinctură de iod (sau alt antiseptic colorat), se face începând cu linia de incizie, de la centru către periferie și se termină cu zonele septică – ajută la instalarea câmpului steril textil (** acesta este rolul medicului, dar poate fi și rol delegat pentru asistenta medicală)
--	---

B. TIMP SUFICIENT, PACIENT DEPENDENT

- este obligatorie efectuarea a două toalete generale la pat, în 24 de ore (dacă este posibil, cu săpun antiseptic)
- în rest, pregătirea este aceeași ca pentru pacientul independent

C. PREGĂTIREA PACIENTULUI ÎN URGENTE CHIRURGICALE

- del fiind timpul foarte scurt avut la dispoziție, pregătirea pacientului se face în același timp cu pregătirea sălii și a chirurgilor
- pregătirea constă în:
 - spălarea cu apă caldă și săpun, numai a zonelor cu risc
 - raderarea, cu atenție, pentru a nu provoca escoriații
 - badijonarea zonei cu un antiseptic colorat
 - eventualele plăgi prezente se vor pansa și se vor proteja foarte atent
 - golirea conținutului gastric, prin spăltură gastrică (dacă este cazul)
 - în rest, pregătirea preoperatorie este aceeași ca pentru pacientul independent.

În general, pentru pacient nu există intervenție chirurgicală „minoră”, o operație fiind o experiență nouă, pe care o trăiește bolnavul.

Teamă îi face pe unii pacienți să refuze operația, sub pretextul că ar dori să mai încerce cu tratament medicamentos, sau că doresc o amânare pentru rezolvarea unei probleme personale.

În acest sens, rolul asistentei este de a-l liniști pe pacient și de a-i da încredere. Aceasta se realizează prin:

- modul de a vorbi cu pacientul
- asigurarea că anestezia și intervenția sunt benigne
- exemple de reușită a unui operat cu aceeași intervenție
- menținerea calmului, antrenând și vecinii de salon

■ SE VA EVITA:

- contactul cu pacienții operați, care sunt obosiți, le este rău, au complicații, pentru a nu-i permite să aibă termen de comparație
- să vorbești urât cu pacientul și cu familia acestuia
- să faci aprecieri personale asupra chirurgului, anestezistului, intervenției și diagnosticului. La întrebări dificile, se va răspunde: „va trebui să întrebăm medicul”
- să se pună în același salon, împreună, doi pacienți operați, în aceeași zi, cu aceeași intervenție.

■ CONCLUZII:

Rolul pregătirii preoperatorii a pacientului deține un loc important în prevenirea infecțiilor nosocomiale.

Este necesară punerea în practică a unui protocol precis și detaliat al diferitelor etape din această pregătire și întărirea legăturilor dintre asistentele medicale din secția de chirurgie, terapie intensivă și cele care lucrează în sălile de operație și anestezie.

Fiecare secție este responsabilă de numărul și frecvența eventualelor infecții, precum și de urmărirea, alături de asistentul de igienă, a executării corecte a modului de pregătire preoperatorie a pacientului.

Supravegherea postoperatorie și îngrijirile acordate pacienților operați

Supravegherea postoperatorie a pacientului începe din momentul terminării intervenției chirurgicale, deci înainte ca el să fie transportat în cameră. Din acest moment, operatul devine obiectul unei atenții constante, până la părăsirea spitalului.

1. REÎNTOARCEREA ÎN CAMERĂ

În general, pacientul este adus în cameră însoțit de medicul anestezist și de asistenta de anestezie, care va urmări respirația, ca și modul în care este transportat și așezat în pat.

Transportul pacientului operat	<ul style="list-style-type: none">– Este indicat a se face cu patul rulant sau căruciorul– Pacientul va fi acoperit, pentru a fi ferit de curenți de aer sau de schimbări de temperatură. Asistenta medicală care îl însoțește se va asigura că pacientul stă comod, că este în siguranță și că eventuala tubulatură (dren, sonde, perfuzii) nu este comprimată.– Patul sau căruciorul va fi manevrat cu atenție, ferit de smucituri și opriri sau porniri bruște– Poziția pe cărucior este decubit dorsal, cu capul într-o parte, pentru a nu-și înghiți eventualele vomismente– În timpul transportului, asistenta medicală va urmări: aspectul feței (cianoza), respirația, pulsul, perfuzia
Instalarea operatului	<ul style="list-style-type: none">– Se va face într-o cameră cu mobilier redus și ușor lavabil, care va fi curată, bine aerisită, liniștită, în semiobscuritate, având temperatura cuprinsă între 18 și 20°C (căldura excesivă deshidratează și favorizează hipotermia), prevăzută cu instalații de oxigen montate în perete, cu prize în stare de funcționare și cu aparatură pentru aspirație.– Patul va fi accesibil din toate părțile - aparatele de încălzit nu vor fi lăsate niciodată în contact cu un operat adormit, pentru a se evita riscul unor arsuri grave. Căldura excesivă a patului produce transpirație, ceea ce duce la pierderi de apă, iar senzația de frig duce la apariția frisoanelor.– Patul va fi prevăzută cu mușama și aleză bine întinsă, fără pernă și, dacă este cazul, salteaua va fi antiescară.

pozițiile
pacientului
în pat

- Transferul de pe cântecor pe pat va fi efectuat de către trei persoane, ale căror mișcări trebuie să fie sincronizate, pentru a evita bruscarile operatorului.
- Poziția pacientului în pat este variabilă, în funcție de tipul intervenției chirurgicale.
- Cea mai frecventă poziție este *decubiți dorsal*, cu capul într-o parte, până când își recapătă cunoștința. Pentru a favoriza irrigarea centrilor cerebrali, câteodată, patul va fi ușor înclinat.
- În toate multe cazuri, poziția este *decubiți lateral* drept sau stâng, care se va schimba din 30 în 30 de minute, pentru a ușura drenajul căilor respiratorii. Această poziție împiedică lichidul de vărsătură să pătrundă în căile aeriene.
- În cazuri particulare (obezitate, cardiace, operații pe sân, pe torace etc.) operatorul va fi așezat în poziție semișezând - poziția FOWLER - cu genunchii flexați cu un sul sub ei.
- Aceste poziții diferite se pot menține ușor într-un pat de reanimare, prevăzut cu mecanisme care permit manevrarea cu blândete a pacientului și instalarea sa comodă.

II. SUPRAVEGHEREA OPERATULUI

Este sarcina fundamentală a asistentei medicale. Supravegherea este permanentă, în vederea depistării precoce a incidentelor și complicațiilor postoperatorii.

Prezența permanentă lângă pacient permite asistentei medicale ca, pe lângă elementele de supraveghere indicate de chirurg și anestezist, să sesizeze orice alte mici modificări și acuze subiective (durerea) și să administreze, la timp, tratamentul prescris, evitând inițiativa personală, fără a fi necontențiat responsabilă celorlalți membri ai echipei.

1. Elemente de supravegheat	Supravegherea operatorului se bazează pe date clinice și pe rezultatele examenelor complementare.
a) Date clinice:	<p>1. <i>Aspectul general al operatorului</i></p> <ul style="list-style-type: none">- colorația pielii (normală roz), sesizând paloarea și cianoza- colorația unghiilor, urmărind apariția cianozei- starea extremităților, paloarea sau răcirăa nasului, urechilor, mâinilor și picioarelor- starea mucoaselor - limba uscată sau umedă, saburală sau curată - indică starea de hidratare a operatorului- starea de calm sau agitație, știind că toropeala sau agitația extremă exprimă o complicație chirurgicală (hemoragie internă, peritonită postoperatorie etc.)

2. Diferențe patologice fiziologice

- tensiunea arterială (T.A.) se măsoară ori de câte ori este nevoie în primele două ore după operație, din 15 în 15 minute, din 30 în 30 de minute în următoarele șase ore și din oră în oră pentru următoarele 16 ore, notând datele în foaia de reanimare
- pulsul se măsoară la 10-15 minute, urmărind frecvența, ritmicitatea, amplitudinea, care se notează. În cazul în care apar modificări ale pulsului (frecvență sau tahicardie) se va sesiza medicul reanimator
- respirația - se notează frecvența, amplitudinea, ritmicitatea și se sesizează, de asemenea, medicul în caz de tuse sau expectorație. Așăzi, datorită pipei Mayo, lăsați până la apariția reflexelor și pe care operatorul o elimină când se trezește, înghințea limbii este imposibilă (asistența medicală nu trebuie să fie tentată să o repună pentru că deranjează bolnavul). Cea mai mică modificare a respirației va fi semnalată anestezistului, care, în funcție de caz, va indica o aspirație pentru a îndepărta mucozitățile din laringe sau va recomanda administrarea de oxigen
- temperatura se măsoară dimineața și seara, și se notează

3. Pierderile lichidiene sau sanguine

urina:

- reluarea emisei de urină în prima parte a zilei este un semn bun; la început, cantitatea de urină nu este abundentă, dar în două zile revine la normal. Se măsoară cantitatea și se observă aspectul; dacă emisia de urină lipsește, se practică sondați medical, nu înainte însă de a folosi și acțiuni specifice asistentei medicale și anume: lăsarea robinetului de la chiuvetă să curgă, fluieratul unei melodii, căldură suprasimfizar etc.

scaunul:

- se reia în următoarele 2-3 zile și este precedat de eliminare de gaze; în cazul în care nu apar gazele, se folosește tubul de gaze, iar în cazul în care scaunul nu este spontan, se face o clismă evacuatoare

transpirația:

- se notează dacă apare, deoarece, în cazul când este abundentă, poate antrena pierderi de apă importante

vomismentele:

- se va nota cantitatea, aspectul și caracterul (bilioasă, alimentară, sanguinolentă)

pierderile prin drenaj:

- se notează aspectul și cantitatea pentru fiecare dren în parte
- 4. *Alte semne clinice*
 - sunt urmările de chirurg și anestezist, nefăcând parte din atribuțiile asistentei medicale, ele fiind semne importante în evoluția postoperatorie: starea abdominalului (balonare, contractare, accelerare a peristaltismului intestinal), starea aparatului respirator

— Completează datele clinice și consue un ghid precis în conduita reanimării. Se vor efectua în funcție de evoluția postoperatorie a pacientului, astfel încât repetarea lor în exces să nu ducă la dificultăți privind starea venelor prin puncții venoase repetate

- radiografi pulmonare, în cazul apariției unor complicații pulmonare postoperatorii
- teste de coagulare, de protrombină, teste de toleranță la heparină — ce permit depistarea complicațiilor ca tromboza venoasă. Sunt absolut necesare la pacienți sub tratament anticoagulant, pentru a permite aprecierea dozelor de medicament
- hemograma și hematocritul, indică exact pierderile sanguine și arată gradul de eventuală anemie, ce poate fi compensată
- examenul de urină, ce relevă concentrația în uree și electroliți
- examenul chimic al lichidului de drenaj și, în special, în caz de fistulă digestivă postoperatorie, compensarea exactă a pierderilor constituind o necesitate vitală

Pot fi solicitate și alte examinări, dar într-o asemenea măsură, încât să se respecte capitalul venos al operatorului. Pentru a se evita nepăcerea puncțiilor venoase repetate, examenele postoperatorii vor fi reduse la strictul necesar.

2. Foaia de temperatură, foaia de reanimare, foile speciale de reanimare și supra-veghere

Datele clinice și biologice vor fi consemnate de asistenta medicală în foaia de temperatură (de supraveghere), sau în foaia de reanimare, fapt ce permite întocmirea unei vederi de ansamblu a evoluției postoperatorii a bolnavului.

În atara rolului său în îngrijirea operatorului, asistenta medicală are obligația de a completa, corect și la timp, aceste foi, oferind echipei chirurgicale, prin simpla lectură sau o „aruncătură de ochi”, informații privind starea de sănătate postoperatorie a pacientului.

1. Foaia de temperatură

Este indispensabilă în toate cazurile chirurgicale, indiferent de amploarea intervenției.

Pe foaia de temperatură, se va nota:

- temperatura, dimineața și seara
- pulsul
- valorile tensiunii arteriale
- diureza
- scaunul
- ziua operației, urmând apoi numărătoarea zilelor (1,2,3,...); ziua operației nu se numărotează, fiind denumită „ziua chirurgului”
- medicamente administrate înainte și după intervenția chirurgicală, precum și dozele
- îngrijiri pre- și postoperatorii (sondaj vezical, clismă etc.)

2. Foaia de reanimare

— Completează datele din foaia de temperatură și dă posibilitatea de a urmări bilanțul lichidian din zilele postoperatorii, până la reluarea tranzitului digestiv și a alimentației normale

— Este completată în serviciul de terapie intensivă, pentru pacienți care, postoperator, au nevoie de perfuzie mai multe zile după operație

Se va nota:

— cantitatea de lichide ieșite sau pierdute, reprezentate prin:

- volumul diurezei
- volumul aspirațiilor gastroduodenale și al vărsăturilor
- alte pierderi: dren, fistule, diaree, transpirații etc.

— cantitatea de lichide intrate prin:

- perfuzii cu seruri glucosate (se notează cantitatea și concentrația), cu seruri clorurate (cantitatea și concentrația), cu hidrolizate de proteină

Este important de știut că perfuziile cu sânge, plasmă, masă eritrocitară nu vor fi încorporate în capitolul intrări în bilanțul lichidian, întrucât au un rol esențial în refacerea masei sanguine diminuate în cursul actului operator și nu reprezintă un aport hidric

— băături

— bilanțul hidric reprezintă raportul dintre ingesta și excreta; acesta poate fi echilibrat (caz ideal), benefic sau deficitar

Când cantitatea de lichide ingerate este mică, se va completa prin soluții administrate parenteral, până la reluarea funcțiilor digestive.

Rezultatele dozărilor de electroliți conduc la determinarea cantității de seruri ce se vor introduce prin perfuzii. Semnele clinice prin care se traduce perturbarea raportului ingesta/excreta sunt: uscăciunea limbii, a pielii, manifestări de deshidratare, balonare etc.

3. Foile speciale de reanimare și supraveghere

— Sunt foi ce aparțin serviciilor de terapie intensivă în care sunt internați pacienți cu intervenții chirurgicale mari, fapt ce impune îngrijiri speciale, controale biologice numeroase (de exemplu, rezecție de anevrism aortic, intervenții pe cord deschis, transplant de rinichi, ficat, inimă etc.)

Pe aceste foi sunt notate date separate de cele trecute pe foile de temperatură și foile de reanimare.

Studiul acestor foi oferă date complete asupra stării operatorului și a evoluției sale postoperatorii.

III. ÎNGRIJIRILE ACORDATE PACIENTILOR OPERAȚII

De calitatea și minuțiozitatea acestor îngrijiri depinde în, mare măsură, evoluția postoperatorie și absența complicațiilor.

În momentul trezirii	<p>În momentul trezirii și până la aceasta, asistența medicală va supraveghea, permanent, operatorul pentru a împiedica eventualele incidente și urmările lor:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Vărsăturile — asistența medicală va așeza operatorul cu capul într-o parte, fără pernă, pentru evitarea trecerii acestora în căile aeriene — Agitația — prezența asistenței medicale este obligatorie lângă pacient; la trezire, în starea de semiconștiență, operatorul tinde să tragă de pansamentul de drenaj sau sânde — Impudențe posibile: să vrea să coboare din pat, să vrea să bea apă (în acest caz, asistența medicală este cea care-i va da să bea 1-2 lingurițe de apă, după trezire, dacă operatorul nu a vomat în ultimele două ore), sau să mențină al familiei alături lângă pacient să-i dea să bea fără discernământ
Imediat după trezire	<p>Asistența:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Va menține pacientul în decubit dorsal primele ore, decubit lateral dreapta sau stânga, apoi semișezând (în special cei peste 50 de ani), exceptând pacienții operați cu rahianesiezie — Va asigura confortul plasându-l bine pe pernă, verificând, de mai multe ori pe zi, ca cearșaful să nu albă cufie, îndreptând bine asternutul seara, înainte de culcare, îi va curăța gura, menținând o umedă în permanență. — Toaleta zilnică este completată cu pieptănatul și periajul părului, neuitând toaleta cavității bucale, de 3-4 ori în 24 de ore — Lenjeria de corp va fi schimbată zilnic, sau imediat după ce a transpirat și de câte ori este nevoie — Bazinetul sau urinarul vor fi puse cu blândoțe, după ce, în prealabil, au fost încălzite la temperatura corpului, iar după folosirea lor se va face, obligatoriu, toaleta perineală — Va urmări ca atmosfera din jurul bolnavului să fie calmă, să fie liniște, fără conversații zgomotoase, fără vizitatori mulți — Va încuraja pacientul să se miște în pat, să se întoarcă singur de pe o parte pe alta, să-și miște picioarele, mâinile, să se ridice în poziție semișezând pentru a pregăti scuturii din pat precoce, în prima zi după operație, exceptând cazurile în care este contraindicat — Va căuta să respecte micile obișnuințe ale fiecărui pacient
Primele zile post-operatorii	<p>Sunt cele mai dificile pentru pacient și datorită faptului că, în aceste zile, îngrijirile sunt foarte numeroase.</p> <p>Aceste îngrijiri sunt de ordin general (ne vom ocupa de ele în acest capitol) și de ordin local — pansamentul (vezi „<i>Urgențe medico-chirurgicale</i>”, de Lucreția Titircă).</p>

a) <i>lupta împotriva durerii</i>	<p>La originea durerilor postoperatorii stau mai mulți factori, care vor fi prezentați înalte de a se prescrie analgezicele de rutină. De menționat că nu se vor administra calmante fără prescripție medicală și fără a se cunoaște exact caracterul durerii.</p> <p>După intervenții chirurgicale asupra organelor interne, durerile pot fi superficiale, de origine parietală sau profunde, de origine viscerală.</p> <p><i>Durerile parietale</i> apar datorită tracțiunii musculare asupra suturelor profunde, atunci când pacientul se mișcă, datorită unui hematom la nivelul plăgii, ceea ce duce la instalarea durerii prin distensie. Pentru calmarea acestor dureri sunt suficiente analgetice banale sau intervenții chirurgicale, în caz de hematom.</p> <p><i>Durerile profunde</i> au mai multe cauze:</p> <ul style="list-style-type: none"> — distensii viscerale ale tubului digestiv — congestie pelvină — colici abdominale — dureri legate de dren, care poate fi prea profund, cufat sau astupat <p>În toate cazurile, medicul chirurg care a efectuat intervenția chirurgicală decide conditia de urnat și prescrie analgezicele.</p> <p>În cazul operațiilor pe membre, durerea este câteodată cauzată de un pansament prea strâns sau îmbibat cu sânge ori secreții. Nu sunt contraindicații în a schimba pansamentul.</p>
b) <i>lupta împotriva insomniei</i>	<p>Există, în zilele noastre, o încrengătură de hipnoze, printre care se găsesc cele ce pot fi administrate fiecărui pacient pentru a obține efectul dorit.</p> <p>În plus, asistența medicală are la îndemână mijloace proprii, cum ar fi: ceafuri calmante, asigurarea unui climat de liniște etc.</p>
c) <i>lupta contra anxietății</i>	<p>Anxietatea preoperatorie, în fața necunoscutului, reprezentat de actul chirurgical continuă și postoperator. Frica de durere, de complicații, de sechele face ca anxietatea operatorii să fie prezentă.</p> <p>Aici intervine rolul moral al asistenței medicale, care va trebui să facă operatorii să aibă încredere în echipa de chirurgi, în echipa de asistențe medicale, să-l facă să înțeleagă evoluția postoperatorie și faptul că vindecarea va fi fără complicații sau sechele.</p>
d) <i>lupta împotriva complicațiilor pulmonare</i>	<p>La persoanele în vârstă, persoanele cu obezitate sau pacienții pulmonari cronici, expuși complicațiilor pulmonare prin staza secretelor bronșice și suprainfecție, este necesară o profilaxie activă prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dezinfecție nazofaringiană

- evitarea frigului, în special noaptea
- exerciții respiratorii de două ori pe zi
- obligarea pacientului să scuipe, provocarea tusei prin "tapping" (bolnavii operați pe abdomen sunt învățați să-și mențină pânsonamentul cu mâna în timpul tusei, pentru a evita durerea)
- asocierea aerosolilor cu antibiotice, cu aerosoli cu produse fluidizante ale secrețiilor bronșice

e) lupta contra distensiei digestive

Toate intervențiile chirurgicale abdominale sunt urmate de pareze intestinale, cu retenție de gaze și lichide intestinale. Acestea sunt, de obicei, de scurtă durată, nedepășind 3 zile.

Această distensie abdominală devine nocivă când se prelungeste și antrenează întârzierea tranzitului intestinal, împiedică o alimentație normală și favorizează eviscerarea postoperatorie.

Până la reluarea tranzitului intestinal, se practică tubul de gaze, cisternă evacuatorie mici și repetate, purgative ușoare care favorizează reluarea funcțiilor intestinale.

De asemenea, se administrează produse care favorizează reluarea peristaltismului intestinal, sau, în anumite cazuri, se instalează o aspirație continuă cu o sondă gastroduodenală

f) lupta împotriva stazei venoase

Cu toate prograselor terapiei anticoagulante, accidentele trombozei venoase rămân complicația majoră în chirurgie.

La bolnavii imobilizați la pat, lupta contra stazei venoase se va efectua prin mișcări active și contracții musculare statice ale membrelor inferioare, alternate cu perioade de repaos (10 contracții succesive - pauză), repetate de mai multe ori pe zi, prin flexia și extensia degetelor de la picioare, flexia și extensia genunchilor, mișcări de pedalarie în pat, antrenând și articulația șoldului.

Scutatul din pat precoc reprezintă metoda cea mai eficace pentru prevenirea complicațiilor venoase.

În atara contraindicațiilor, toți operații se vor ridica din pat în seara zilei intervenției sau a doua zi dimineața. Această manevră simplă este benefică și datorită faptului că favorizează amplitudinea respiratorie, ventilația pulmonară, tusea și expectorația, accelerează reluarea tranzitului intestinal și influențează, în mod pozitiv, psihicul bolnavului.

Înainte de a ridica pacientul din pat, va fi necesar să:

- verificăm dacă nu prezintă edeme ale membrelor inferioare
- măsurăm tensiunea arterială culcat și apoi în ortostatism
- ridicarea se face treptat: întâi la marginea patului, își balsează gambe, face un pic de gimnastică respiratorie, cu brațele ridicate în inspirație și coborâte în expirație

- nu trebuie să meargă singur, ci sprijinit de asistența medicală și să nu exagereze de prima dată

- se va ține cont și de ce spune pacientul, dacă vrea să mai meargă sau să se oprească

- după ce nu mai vrea să meargă, pacientul trebuie să se așeze într-un fotoliu înainte de reîntorcerea în pat

- primul scutal din pat al operatului este considerat prima plimbare precocă. Scutatul din pat precoc este indicat în majoritatea intervențiilor chirurgicale

- vârsta operatului nu constituie o contraindicație, la bătrâni vor fi astfel prevenite și complicațiile pulmonare, și cele de decubit; la copii este indicată plimbarea cât mai repede

- starea generală nu este o piedică, nici starea de slăbiciune, nici deshidratarea, nici obezitatea, nici varicele - stări ce nu trebuie să constituie o scuză, ci, dimpotrivă, la persoanele cu antecedente de flebită, plimbarea va avea loc cât mai precoc posibil

- natura sau complexitatea operației nu împiedică ridicarea din pat precocă, care nu va fi amânată din cauza drenurilor, sondelor sau perfuziilor

- existența complicațiilor postoperatorii nu va interzice plimbarea, acolo unde este posibil

g) lupta contra complicațiilor de decubit

În cazul unor intervenții chirurgicale care necesită imobilizarea la pat de lungă durată (ortopedice și, în special, la bătrâni), survin frecvent complicațiile de decubit - escarele.

Important este ca acestea să fie prevenite, escara fiind „cartea de vizită” a asistenței medicale. Prevenirea escarelor reprezintă acțiunea de bază a asistenței medicale în îngrijirea bolnavilor imobilizați.

Vom puncta acțiunile care previn apariția escarelor:

- lenjerie de pat și de corp permanent curată, uscată și bine întinsă, fără cute, fără frământuri pe pat
- menținerea curată și uscată a pielii, în special în regiunea sacrococcigiană la incontinenți, după baie, pielea se va unge, știind că pielea unsă se macerează mai greu decât pielea uscată
- schimbarea de poziție după orar - la fiecare două ore
- masajul regiunilor expuse escarelor
- folosirea saltelelor antiescară, sau, în lipsa acestora, a blănilor de oaie

h) rehidratarea

După intervenții chirurgicale, în mod special pe tubul digestiv, alimentația normală se reia după o perioadă relativ lungă. Până la reluarea acesteia, este necesar să se administreze o rație hidrică, electrolitică și calorică suficientă acoperirii necesităților cotidiene.

Necesitățile de apă ale organismului sunt, în medie, de 2000-2500 ml/zi. Această cantitate va fi furnizată sub formă de:

- băuturi, cât mai repede posibil, în cantitate moderată la început, 300 ml ceai sau apă, în prima zi administrată la linguriță, 500 ml în a doua zi, 1000 ml în a treia zi ș.a.m.d.
- perfuzii, rehidratarea venoasă completând necesitatea zilnică, se va ține cont de starea cardiacă și renală a operatului, iar ritmul picăturilor nu va fi rapid

Perfuziile venoase aduc organismului necesarul de apă, electroliti și calorii.

Eficacitatea rehidratării va fi controlată prin cantitatea de urină eliminată, prin câmbu diurezei.

1) *alimentația și realimentația*

În cazurile cele mai frecvente, simple, de chirurgie obisnuită, se va ține cont de următoarele principii:

- bolnavul va bea atunci când nu vomită
- va mânca după ce a avut scaun precoce sau după emisia de gaze

- nu va consuma fructe crude sau glucide în exces

În ziua operației, pacientul va bea apă cu linguriță, rehidratarea fiind completată cu perfuzii. După 24 de ore - ceai, citronadă și supă de zarzavat (numai zeamă), iar a doua zi - ceai, citronadă îndulcită, lapte cu ceai și, de asemenea, zeamă de la supă de zarzavat; a treia zi - iaurt, fidea, tălței cu lapte, piure de cartofi, biscuiți.

După reluarea tranzitului: carne de pui, pește alb și se revine, treptat, la alimentația obisnuită.

Nu trebuie uitat că pentru a favoriza realimentația, alimentele trebuie să fie calde, bine preparate, prezentate estetic și în vasele foarte curate, însoțite de amabilitatea și bunăvoința asistenței medicale.

În cazuri speciale, realimentația este dificilă. O anorexie rebelă sau vărsăturile pot împiedica reluarea alimentației. În aceste cazuri, alimentele vor fi mixate, mesele vor fi servite în cantități mici, repartizate în șase-sapte reprize și se vor alege alimente cu valoare calorică mare, cum ar fi: crema de lapte, concentrat de lapte, ou întreg, zahăr (1700 de calorii).

În cazul alimentației prin sonda nazală permanentă, se vor folosi soluții nutritive ce ajung până la 3000 de calorii. De exemplu: ou crud, lapte, zeamă de carne, carne mixată (în cantități mici), cacao, zahăr, sare - totul administrat pe sondă. Câteva precauții pentru alimentația prin sondă:

- ritmul scurgerii lichidului trebuie să fie același ca la perfuzie
- se testează, treptat, toleranța la alimentele introduse
- alimentele trebuie menținute la temperatura corpului
- la slăbire, se va introduce apă, atât pentru curățirea sondei, cât și pentru a se administra necesarul de apă.

Acestea au fost, în rezumat, îngrijirile generale acordate operatului de către asistența medicală. În intervențiile chirurgicale de gravitate medie, rolul asistenței este relativ simplu, el devine complex și de o importanță fundamentală în intervenții de gravitate mare.

IV. ROLUL ASISTENȚEI MEDICALE ÎN PERIOADA POSTOPERATORIE

Rolul moral al asistenței medicale

- Pentru pacient, rolul asistenței medicale este important și de lungă durată atât în pregătirea preoperatorie, cât și după intervenția chirurgicală
- Dacă preoperator rolul său a fost de a pregăti fizic și psihic pacientul, postoperator, rolul important constă în ușurarea restabilirii complete, până la starea anterioară intervenției chirurgicale
- La întoarcerea din sala de operație, pacientul va trebui să găsească o asistență medicală binevoitoare, indulgentă, dar și eficientă, care îl va face să înțeleagă că este acolo pentru a-l ajuta și pentru a-i determina să se ajute singur, făcându-i, astfel, mai simplă vindecarea
- Asistența medicală va lucra cu capul, sufletul și mâinile, și propria conștiință, nelăsând nimic la voia întâmplării și neglijând să transmită cel mai mic detaliu colegelor ce-i urmează în tură
- Operatul este o persoană dezechilibrată temporar, exclusă de la viața fizică normală și foarte vulnerabilă
- Pentru aceasta, asistența medicală va da dovadă de inteligență și abilitate, în momentul în care pacientul se reîntoarce în salon
- Ea va trebui să-i asigure confortul, calmul din jurul său, să „educe” familia, să calmeze anxietatea contagioasă a rudelor și prietenilor, să limtizeze, cu tact, timpul vizitelor
- Alinarea tuturor suferințelor psihice și fizice va fi obiectivul principal în îngrijirea postoperatorie
- Cu blândețe și fermitate, de fiecare dată, gesturile și comportamentul ei vor oferi operatului un grad crescut de confort, încredere în echipa de îngrijire, precum și un climat favorabil refacerii
- Acest climat de încredere și siguranță creat în perioada preoperatorie va fi exploatat la maximum în perioada postoperatorie
- Anxietatea operatului antrenează, de cele mai multe ori, neîncrederea și judecarea greșită a evoluției postoperatorii

<p>– Devotamentul, amabilitatea, discreția, abilitatea, sunt atuuri majore care nu trebuie să lipsească unei asistente medicale și care vor completa, în mod fericit, conștiinciozitatea profesională,</p> <p>– Pacientul bine precizat – reîntoarcerea pacientului la viața normală</p> <p>– Pacientul poate avea nevoie, de asemenea, de asistență religioasă, să dorească să-și continue rugăciunile sau obiceiurile și singura care îi poate ajuta, fără ostentație este tot asistenta medicală</p> <p>– Neuitând niciodată că hipertrofia tehnică transformă bolnavul în mașină și asistenta medicală în mecanic, aceasta își va duce la îndeplinire rolul ei moral, fără de care o revenire este posibilă, dar foarte greu</p>	<p>Relatiile asistentei medicale cu membrii echipei și cu medicul chirurg</p> <p>• <i>a. Relatiile în echipa de îngrijire</i></p> <p>• Asistentele medicale asigură îngrijire 24 de ore din 24. Ele lucrează în ture de zi și de noapte, iar bolnavul trebuie îngrijit permanent, cu aceeași conștiinciozitate</p> <p>– Înțelegerea, toleranța, comunicarea și indulgența sunt indispensabile între toate asistentele medicale, din toate turele, pentru bunul mers al serviciului</p> <p>• <i>Asistentele medicale din tura de dimineață</i></p> <p>– Au avantajul de a cunoaște mai bine pacientul și echipa chirurgicală și de a executa cele mai importante îngrijiri din timpul zilei (pansamente, perfuzii, procedee de reanimare etc.)</p> <p>– Lor le revine sarcina de a informa și colegile din tura de după amiază și de noapte, comunicându-le hotărârile și observațiile medicului chirurg, stabilite de acesta la vizită sau în timpul zilei.</p> <p>– Ele vor fi acelea care vor stabili un dialog pozitiv cu colegile din tura de după amiază și cea de noapte și, totodată, vor avea grijă să nu lase în seama colegelor din celelalte ture îngrijiri care pot fi efectuate dimineața.</p> <p>– Lipsa unui dialog, mentalitatea de genul „lăsă asta pentru după-amiază” și absența înțelegerii și comunicării între colege sunt resimțite de către pacient, ceea ce poate duce la imposibilitatea participării active a acestuia la vindecare.</p> <p>– Asistenta medicală din tura de zi va avea grijă să lase echipei următoare materialele necesare pentru îngrijiri prevăzute și neprevăzute. Asistați nu ar trebui să existe „dulapuri încuiate”.</p> <p>– Asistenta medicală de zi va transmite planul de îngrijire atât în scris, detaliat, în caietul de rapoarte, cât și comunicat verbal.</p> <p>• <i>Asistenta medicală din tura de după-amiază și noapte</i></p> <p>– Amabilitatea și omenia vor trebui să le caracterizeze pentru a nu se transforma în cerberi sau în persoane, care, la intrarea în</p>
--	--

<p>tură administrează sedative fără motiv, pentru a avea „liniște și pace”. Ele vor trebui să discearnă dacă suferința bolnavului este reală sau simulată.</p> <p>– Munca lor este ingrată și obositoare, în primul rând datorită faptului că numărul de asistente medicale este mai mic în gardă, lucru știut și de pacient, care nu va trebui să se simtă în nesiguranță, iar în al doilea rând, pentru că noaptea operații devin agitate, anxiși și insomnia este frecvent prezentă.</p>	<p>• <i>b. Relatiile cu echipa chirurgicală</i></p> <p>– Chirurgii și asistentele medicale formează o echipă – situație cert pe o scară verticală, dar care, în mod normal și civilizat, ar trebui să fie și pe orizontală</p> <p>– Asistenta medicală va fi foarte atentă în executarea, cu strictețe și punctualitate, a tuturor indicațiilor chirurgului, ea fiind cea care se află, permanent, printre pacienți, observând imediat orice modificare în evoluția stării de sănătate a acestuia</p> <p>– Înainte de vizita chirurgului, asistenta medicală va nota bilanțul zilei precedente, pentru fiecare bolnav, iar în timpul vizitei, va avea asupra ei:</p> <p>– caietul de rapoarte din ziua precedentă</p> <p>– rezultatele examinărilor din ziua precedentă și din respectiva</p> <p>– Asistenta medicală va răspunde clar la întrebările medicului chirurg, fără a face divagații și va pune întrebări judicioase, la obiect, iar dacă este nevoie - și în absența pacientului</p> <p>– Dacă are vreo nemulțumire referitoare la comportamentul chirurgului, va păstra pentru ea, nu va discuta cu colegile și, în nici un caz, cu pacientul, încercând să rezolve totul print-o discuție civilizată și de bun simț cu medicul</p> <p>– Complexitatea evoluției postoperatorii (în cazul anumitor intervenții chirurgicale), multitudinea complicațiilor ce se pot ivi impun asistentei medicale o comportare și o conștiință profesională ireproșabilă, pentru a se integra direct în echipa chirurgicală, în angrenajul căreia trebuie să reprezinte o roțiță mică, dar esențială.</p>
---	---

Pregătirea pacientului pentru explorări radiologice

Razele roentgen: oscilații electromagnetice cu lungime de undă cuprinsă între 10⁻⁸ și 10⁻¹² m, produse în tuburi speciale; având mare putere de pătrundere, străbat corpurile solide, inclusiv corpul omenes, fiind absorbite parțial și diferit de țesuturi și organe, în funcție de compoziția lor chimică; de exemplu, sistemul osos, având mult calciu și fosfor, are un coeficient de absorbție mai mare, mușchii și organele parenchimatoase au un coeficient de absorbție mai mic decât cel al vaselor, dar mai mare decât al plămânilor care, fiind plini de aer, le permit traversarea aproape integral.

Imaginea radioscopică: imagine formată pe un ecran fluorescent de razele roentgen, care au proprietatea de a produce zone diferite de fluorescență, în funcție de intensitatea incidență pe ecran, după gradul de absorbție al organelor traversate; prin înlocuirea ecranului fluorescent cu o placă fotografică (film radiologic), razele roentgen proiectate impresionează diferit emulsiia fotosensibilă de pe aceeași și se obține o imagine fotografică a regiunii examinate = **radiografia**.

Examenul radiologic permite studiul morfologiei și al funcționării organelor interne, completând alte metode de investigație. În unele situații -- tracturi, luxații, calcule etc. --, examenul radiologic este mijlocul de diagnostic diferențial și de confirmare a unor modificări anatomo-funcționale ale organelor explorate.

Metodele radiologice de examinare sunt: **radioscopia** = examinarea organelor sub ecran dă o imagine dinamică, **radiografia** = fotografierea imaginii radiologice pe film radiologic; deși este o metodă statică de examinare, permite controlul comparativ cu imagini anterioare ale aceluiași organ, aparat etc.; **radiokimografia** = fixarea pe film radiologic a mișcărilor unor organe (inima și vasele mari); **tomografia** = fixarea imaginii radiografice a unui singur strat dintr-o parte a organismului (se evită posibilitatea erorilor de interpretare ca urmare a suprapunerii imaginilor datele diferite straturi ale regiunii examinate); **radiotografia** = fotografierea imaginii radiologice pe filme de dimensiuni reduse (7 x 7 sau 10 x 10 cm); este folosită în examinările profilactice ale colectivităților pentru depistarea activă și precoce a tuberculozei pulmonare etc.; **roentgenocinetografia** = filmarea imaginilor pe ecranul radioscopic sau direct, fără intermediul ecranului radiologic (se obține o imagine radiologică dinamică, care evidențiază mișcările normale sau patologice ale organelor examinate); **roentgentelevizuirea** = televizarea imaginii radiologice, ca imagine statică sau cinematografică (imaginea poate fi urmărită simultan de mai multe persoane).

Măsurile generale de pregătire pentru explorări radiologice vizează:

- pregătirea psihică a pacientului (se va explica pacientului necesitatea examenului și condițiile în care se realizează);

- pregătirea fizică a pacientului, corespunzător aparatului, sistemului sau organului care urmează să fie explorat;
- îndepărtarea obiectelor de îmbrăcăminte radioopace, care pot cauza greșeli de interpretare a imaginii radiologice (nasuri, măști, medalioane etc.);
- însoțirea pacientului la serviciul de radiologie, unde va fi ajutat la dezbrăcare, îmbrăcare, susținere etc.
- completarea bilețului de trimitere pentru examenul radiologic cu datele personale și de spitalizare, din arhivă, rezultatele mai importante de laborator și examenul cerut (se poate duce toată de observație)
- protejarea proprie față de sursa de raze roentgen și de pacient (devine sursă când este sub influența razelor roentgen) cu sorți și mănuși speciale;
- asigurarea unei temperaturi optime (20°) în camera de examen radiologic;
- folosirea de ochelari fumuri cu 10-15 minute înainte, pentru realizarea unei acomodări imediate la semibuscunătatea din serviciul de radiologie, acolo unde condiția de dotare o cere.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A SISTEMULUI OSTEO-ARTICULAR

Explorarea radiologică a sistemului osteo-articular se efectuează de către medic prin radiografi. Citirea (interpretarea) radiografiilor se face la negatoscop (fig. 32).

Scop: studierea morfologiei osului și funcționalității unor articulații osoase din sistemul osteo-articular pentru stabilirea diagnosticului de luxație, fractură sau alte afecțiuni care modifică structura osului (ex. tumoră sau distrofie osoasă).




Fig. 32 - Negatoscop

Pregătirea psihică a pacientului	- se anunță pacientul și i se explică necesitatea tehnicii, precum și condițiile în care se efectuează (examinarea în obscuritate și cu ajutorul unor aparate speciale)
Pregătirea fizică a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - se dezbracă regiunea ce urmează a fi examinată - la femei, părul lung se leagă pe creștetul capului - se îndepărtează măgelele și lanțușoarele de la gât, precum și obiectele radioopace din buzunar - se ridică pansamentul (dacă există) de pe regiunea ce urmează a fi explorată - unguentele sau alte forme medicamentoase se îndepărtează prin spălare cu alcool sau benzină - dacă membrul examinat nu poate fi menținut fără atele în poziția necesară, se vor folosi atele transparente pentru raze X

Îngrijirea după tehnică	<ul style="list-style-type: none"> – se administrează pacientului un medicament analgezic, în cazul în care mișcările îi provoacă durere: fracturi, luxații, artrite acute) – se efectuează o climă evacuatore, în cazul radiografiilor oaselor bazinului, nu se execută în traumatisme recente – se administrează substanțe de contrast după ce în prealabil s-a făcut testarea pacientului, sau se umple cavitatea articulară cu aer sau oxigen, pentru evidențierea articulațiilor articulare – dacă medicul solicită – se ajută pacientul să se așeze și să păstreze poziția indicată de medic în funcție de regiunea ce se examinează
	<ul style="list-style-type: none"> – se ajută pacientul să se ridice de pe masa de radiografie și să se îmbrace – pacientul este condus la pat – examenul radiologic efectuat se notează în foaia de observație (și data)

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLOAREA RADIOLOGICĂ A ORGANELOR TORACICE

Organele toracice (inimă, plămâni) sunt explorate radiologic prin radioscopie, radiografie, bronhografie, tomografie, kintografie etc.

Scop: studierea morfologiei și funcționalității plămânilor, a modificărilor de volum și de formă ale inimii pentru stabilirea diagnosticului (tumori pulmonare, atelectazii, modificări topografice și de calibru ale bronhiilor etc.)

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU RADIOSCOPIE, RADIOGRAFIE

Pregătirea psihică a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – se anunță pacientul, explicându-i-se condițiile în care se va face examinarea (cameră în semiobscuritate) – pacientul va fi condus la serviciul de radiologie – se explică pacientului cum trebuie să se comporte în timpul examinării (va efectua câteva mișcări de respirație, iar radiografia se face în apnee, după o inspirație profundă)
	<ul style="list-style-type: none"> – se dezbracă complet regiunea toracică (părul lung al femeilor se leagă pe creștetul capului); se îndepărtează obiectele radioopace – se așază pacientul în poziție ortostatică cu mâinile pe solduri și coatele aduse înainte (fără să ridice umerii) în spatele ecranului, cu pieptul apropiat de ecran sau de caseta care poartă filmul – când poziția verticală este contraindicată, se așază pacientul în poziție șezând sau în decubit

Îngrijirea pacientului după examen	<ul style="list-style-type: none"> – în timpul examenului radiologic se ajută pacientul să ia poziție ortostatică de medie. Sugarii și copiii mici se fixează prin înfășurare pe un suport de scănduri sau se suspendă în hamuri (pentru a nu se iradia persoana care l-ar susține) – pacientul va fi ajutat să se îmbrace, după terminarea examenului radiologic, va fi condus la pat – se notează în foaia de observație examenul radiologic efectuat, data
------------------------------------	--

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU BRONHOGRAFIE

Pregătirea materialelor necesare	<ul style="list-style-type: none"> – medicamentele sedative (fenobarbital, atropină), anestezice, sondă Meiras sterilă (Fig. 33), substanțe de contrast (lipiodol sau iodipin – liposolubile și Ioduron B sau diiodonul – hidrosolubile), expectorante și calmante ale tusei, scupătoare
Pregătirea psihică a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – se anunță pacientul și i se explică necesitatea tehnicii – se anunță pacientul să nu mănânce în dimineața examenului
Pregătirea fizică a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – cu 1-3 zile înainte, se administrează pacientului medicamente expectorante – în ajunul examinării se administrează o tabletă de fenobarbital sau alte medicamente similare – cu o jumătate de oră înainte examenului, se administrează atropină (pentru a reduce secreția salivă și a mucusului din căile respiratorii) și medicamente calmante pentru tuse – pacientul va fi ajutat să se dezbrace și va fi așezat în decubit dorsal, puțin înclinat spre partea care trebuie injectată – medicul efectuează anestezia căilor respiratorii (teu-șita examinării depinde de calitatea anesteziei), intro-




Fig. 33 – Sonde pentru bronhografie – model Meiras (a); b – mandrină; sondei; c – sondă cu balon de compresie;

	<p>duce sonda Meiras în arborele bronșic și apoi substanța de contrast ușor încălzită, încet, cu o presiune moderată</p> <p>— în timpul injectării substanței de contrast, pacientul va fi ajutat să-și schimbe poziția (decubit ventral, dorsal, lateral drept și stâng)</p> <p>— în timpul examinării radiologice, se așază pacientul în poziția Trendelenburg (pentru a se evidenția și arborele bronșic din părțile superioare ale plămânilor) apoi se așază pacientul din toracele moderat ridicat, pentru a se evidenția bronhiile mijlocii și inferioare</p>
Îngrijirea pacientului după tehnică	<p>— după examen, se ajută pacientul să se îmbrace și va fi condus la pat</p> <p>— va fi avertizat să nu mănânce și să nu bea timp de 2 ore, până când încetează efectul anestezicului</p> <p>— va fi atenționat să colecteze în sculpătoare substanța de contrast care se elimină prin tuse; nu se îngrije, deoarece produce intoxicație cu iod</p>

■ **ATENȚIE:**

— reținerea substanței de contrast și pătrunderea ei în stomac trebuie evitate, deoarece poate fi resorbită, producând intoxicații.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ GASTRO-INTESTINALĂ

Examinarea radiologică a tubului digestiv se efectuează după administrarea unei substanțe de contrast pe cale orală sau rectală.

Scop: studierea morfologiei și funcționalității organelor tubului digestiv pentru stabilirea diagnosticului (gastrite cronice, ulcer gastro-duodenal, tumori ale tubului digestiv). Examinarea radiologică este contraindicată la pacienții cacecici, în stare gravă, adinamici, care suferă de tromboze, ileus, în perforația tubului digestiv cu hemoragie gastro-intestinală acută, în peritonită acută, precum și la femeile gravide în prima jumătate a sarcinii.

Pregătirea instrumentelor și materialelor necesare	<p>— sulfat de bariu 150 g sau un pachet original (sulfat de bariu pentru roentgen); cană sau pahar, apă, lingură de lemn, purgativ (ulei de parafină)</p> <p>— se pregătește suspensia de bariu: cele 150 g sulfat de bariu se amestecă cu o cantitate mică de apă caldă până se obține o</p>
--	--

pregătirea psihică a pacientului	<p>pasă omogenă, la care se adaugă apă rece până la 200-300 g, amestecându-se cu lingura de lemn</p> <p>— se anunță pacientul cu două zile înainte, explicându-i necesitatea tehnicii și importanța ei pentru diagnosticul bolii</p> <p>— se explică pacientului tehnica de investigație</p> <p>— se anunță pacientul că în dimineața zilei de examinare nu trebuie să mănânce</p> <p>— se atenționează pacientul că nu trebuie să fumeze, pentru că fumatul mărește secreția gastrică</p> <p>— se informează pacientul privind regimul alimentar pe care trebuie să-l respecte</p>
----------------------------------	---

pregătirea fizică a pacientului	<p>— se administrează pacientului, cu 1-2 zile înaintea examinării, un regim alimentar nefatulent și ușor de digerat, format din supe, ouă, pâine prăjită, unt, făinoase, produse lactate</p> <p>— seara — în ajunul examinării — se efectuează bolnavului o clismă evacuatorie</p> <p>— în ziua examenului, dimineața, pacientul este condus la serviciul de radiologie</p>
---------------------------------	--

Participarea la examen	<p>— pacientul (după ce și-a dezbrăcat toracele) este condus sub ecran, unde i se oferă cana cu sulfatul de bariu (pregătit înaintea examenului)</p> <p>— la comanda medicului, pacientul va înghiți sulfatul de bariu dizolvat și amestecat cu o lingură de lemn</p> <p>— după terminarea examinării, pacientul este ajutat să se îmbrace și este condus la pat</p> <p>— pacientul este readus la serviciul de radiologie (conform indicațiilor medicului), după 2, 8, 24 ore, pentru a se urmări sub ecran evacuarea stomacului, umplerea intestinului subțire și a colonului</p> <p>— la 2 ore de la începutul examinării, pacientul poate să mănânce</p>
Îngrijirea pacientului după tehnică	<p>— se administrează un purgativ (o lingură de ulei de parafină) după terminarea examinării</p> <p>— pacientul va fi informat că va avea scaunul colorat în alb</p>

■ **REȚINEȚI:**

— reușita unui examen radiologic al organelor abdominale depinde de pregătirea fizică, prin regim alimentar, a pacientului.

■ **ATENȚIE:**

- la copii mici, gustul bariului se corectează cu cacao sau lămâie; se administrează cu lingura; la sugari, bariul se prepară cu ceai sau cu lapte și se administrează cu biberonul
- cantitatea de suspensie bariu/apă în diluție 1:2 este: 100 g pentru sugari; 100-150 g pentru copii mici; 150-200 g pentru copii mari
- cu 2-3 zile înainte de examenul radiologic gastro-intestinal se va evita administrarea de purgative și se va suspenda administrarea medicamentelor cu conținut de bismut, iod, fier, calciu sau bariu pe cale bucală (acestea împiedică vizibilitatea organelor de examinat)
- nu se execută sondej gastro-duodenal înainte de examenului radiologic (irită mucoasa și produce o hipersecreție nedorită)

Substanța de contrast poate fi introdusă în tubul digestiv și prin alte metode:

- direct în jejun prin sondă duodenală* (Einhorn); înaintea sondei se controlează sub ecran radiologic, când diviziunea 75-80 ajunge în dreptul arcadei dentare, substanța de contrast se introduce cu ajutorul unei seringi prin sondă direct în jejun;
- fracționat*, pacientul luând din 10 în 10 minute câte o înghițitură din substanța opacă;
- metoda contrastului gazos pentru examinarea stomacului* se realizează prin insuflarea de aer în stomac cu ajutorul unei sonde sau prin administrarea unui amestec gazos (acid tartaric și bicarbonat de sodiu).

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXAMENUL RADIOLOGIC AL COLONULUI

Examenul radiologic al colonului se poate face: *pe cale bucală* (după examenul radiologic al stomacului și intestinului) sau *pe cale rectală* (ingoscopie).

Dacă nu se examinează decât colonul, la indicația medicului se administrează o doză de suspensie baritată cu 8-10 ore înainte.

Ingoscopia: examinarea radiologică a colonului prin umplerea pe cale rectală cu substanța de contrast.

Scop: observarea modificărilor anatomice ale colonului; această examinare necesită o pregătire foarte bună a pacientului în sensul evacuării complete a colonului de materii fecale și umplerea lui cu substanța de contrast.

Pregătirea materialelor și instrumentelor necesare	<ul style="list-style-type: none"> – instrumentar necesar efectuării clismei (vezi „clismele”), purgative, sondă Strauss, substanță de contrast, sulfat de bariu în suspensie (300-500 g în 1000-1500 ml apă ușor încălzită) sau sulfat de bariu (200 g) amestecat cu <i>bolus alba</i> (300 g) în 1000 ml apă încălzită, ulei de ricin, soțuri de protecție pentru a nu fi expuși iradierii. – se pregătește clisma baritată
Pregătirea pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – se anunță pacientul cu 2-3 zile înainte, explicându-i-se necesitatea tehnicii, și i se administrează un regim alimentar de

- crutare neîntârzi, neexcitant, nefermentescibil, nefatulent format din: brânză de vaci, smântână, ouă fierte, carne slabă fiată, orez fiert, pâine uscată
- cu o zi înaintea examinării, se administrează un regim hidric cu pături
 - se efectuează, după masă, o clismă evacuatorie și apoi, se administrează mai târziu două linguri de ulei de ricin (clisma singură elimină numai resturile de materii fecale din rect și sigmoid)
 - se conduce pacientul la serviciul de radiologie; va fi ajutat să se dezbrace și va fi așezat pe masa de examinare
 - i se efectuează clisma baritată, după metoda obișnuită a clismelor, și se întrerupe de câte ori bolnavul are senzația de defecare
 - se întrerupe introducerea substanței de contrast când bariul a ajuns în cecum
 - se închide rectul cu sonda Strauss, după insuflare cu pompă de aer și după introducerea substanței opace
 - medicul examinează radiologic modificările anatomice ale colonului

Îngrijirea după tehnică

- se solicită pacientul să elimine substanța de contrast (după termi, area examinării), iar dacă nu reușește, i se efectuează o clismă evacuatorie
- se efectuează toaleta regiunii perianale, apoi, pacientul va fi ajutat să se îmbrace și să se instaleze comod în pat
- se notează examenul efectuat în foaia de observație (inclusiv data)

■ **ATENȚIE:**

- substanța de contrast introdusă prea rapid sau sub presiune provoacă dureri, spasme ale colonului
- substanța de contrast introdusă la început în cantitate prea mare poate să deranjeze explorarea porțiunii recto-sigmoidiene (după ce suspensia de bariu a trecut prin sigmoid, se poate mări ușor presiunea)
- în ziua examenului, pacientul nu va consuma lichide, nu va mânca, nu va fuma (înainte de examen)

– Colonul mai poate fi explorat radiologic și prin *metoda examenului cu dublu contrast Fischer*. Când colonul se umple prin clismă baritată (după terminarea acesteia) pacientul va fi solicitat de a evacua parțial substanța de contrast sau închizând rectul cu sonda Strauss, al cărei balon introdus în rect va fi umplut cu aer; se introduc apoi în colon 100 ml aer, cu presiune moderată, sub control la ecran. Metoda necesită precauții, deoarece aerul introdus sub presiune poate perfora colonul.

PREGĂTIREA COPIL OR PENTRU EXAMENUL RADIOLOGIC AL COLONULUI:

- se instituie o pauză de alimentație de 12 ore, fără a efectua clismă sau administrare de purgative;
- se introduce sonda la o adâncime de 5-10 cm;
- se administrează 400-500 g substanță de contrast, conținând 100-150 g sulfat de bariu;
- la sugari, 50-100 g substanță bariată se administrează sub formă de clismă cu ajutorul unei seringi.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A COLECISTULUI ȘI CĂILOR BILIARE

Deoarece vezicula biliară poate fi vizibilă radiologic numai când conține calculi radioopaci sau se impregnează cu substanțe de contrast, pentru a obține imaginea ei radiologică se administrează substanțe iodate, pe cale orală sau intravenoasă.

Colecistografia: radiografierea veziculei biliare (colecistului) umplută cu substanță de contrast, administrată de obicei pe cale orală.

Colangiografia: radiografierea căilor biliare (inclusiv colecistul) pline cu substanța de contrast administrată pe cale intravenoasă.

Scop: examinarea formei, poziției, conținutului, precum și contractilității (dinamici) veziculei biliare, inclusiv descoperirea prezenței de calculi radioopaci.

Contraindicații: afecțiuni hepatobiliare acute, insuficiență renală, reacții alergice la iod, stări febrile. Astăzi, examinarea este înlocuită în mare parte cu ecografia.

OPACIFIEREA VEZICULEI BILIARE PE CALE ORALĂ (COLECISTOGRAFIE)

Pregătirea materialelor	<ul style="list-style-type: none">- prânz compus din ouă, smântână și unt cu pâine sau 50 g ciocolată; cărbune animal; trierment, substanță opacă (Fazebil sau acid iopanoic); antihistaminice- materialele pregătite se transportă lângă pacient
Pregătirea psihică și fizică a pacientului	<ul style="list-style-type: none">- se anunță pacientul și i se explică necesitatea efectuării tehnicii- se administrează pacientului cu 2-3 zile înaintea examinării, cărbune animal de 3 ori pe zi, câte două tablete și regim hipproctidic- cu 1-2 zile înaintea efectuării colecistografiei se administrează pacientului un regim dietetic ușor digerabil, evitând alimentele cu conținut bogat în celuloză și hidrocarbonați concentrați- în ziua precedentă examenului, la orele 12, se administrează pacientului un prânz compus din ouă, smântână și unt cu pâine (provoacă contracții puternice și golirea vezicii biliare); dacă acest prânz provoacă dureroase, el poate fi înlocuit cu 50 g ciocolată sau cu un sondaj evacuator

Ingrijirea pacientului după efectuarea tehnicii	<ul style="list-style-type: none">- după masă se efectuează pacientului o clismă evacuatoră cu ser fiziologic sau ceai de mușetel cald, pentru evacuarea gazelor din colon- se testează toleranța la Fazebil: după masă, la orele 16, se administrează pacientului o tabletă care se dizolvă pe limbă, se supraveghează pacientul pentru a se observa dacă nu are hipersensibilitate la ioda. dacă apar roșeață, senzație de arsură, furnicătură, tahicardie, grețuri, urticarie, amețeli, stare de rău general, pacientul are hipersensibilitate la iod și se întrerupe administrareab. dacă pacientul suportă bine iodul (nu apar simptome de intoleranță), la 20-30 minute se administrează celelalte trei tablete Fazebil, în decurs de 5 minute- se așază pacientul în decubit lateral drept, timp de 30-60 de minute- înainte de a se efectua radiografia se efectuează pacientului încă o clismă evacuatoră- pacientul este condus la serviciul de radiologie (după 14-16 ore și respectiv 10-14 ore, când vezicula biliară se umple cu substanța de contrast)- pacientul va fi ajutat să se dezbrace și să se așeze pe masa de examinare. În cazul în care vezicula biliară nu s-a umplut cu substanță opacă, se mai administrează 4 tablete de Fazebil (sau 6 tablete de acid iopanoic), iar examinarea se repetă a 3-a zi- se administrează prânzul Boyden (două gălbenușuri de ou frecate cu 30 g zahăr sau 50 g ciocolată)- se efectuează radiografiile în serie, la intervale de 30-60-90 de minute
	<ul style="list-style-type: none">- pacientul va fi ajutat să se îmbrace și va fi condus la pat- se notează examenul în foaia de observație

ATENȚIE:

Dacă se folosește acid iopanoic, între orele 18-20 se administrează 4-6 tablete acid iopanoic, câte una din 10 în 10 minute, cu puțină apă, fără a le sfărâma, după care bolnavul va fi așezat în decubit lateral drept, timp de 30-60 minute. De la administrarea substanței de contrast până la terminarea examinării, pacientul nu va primi mâncare, băutură, medicamente sau purgative și nu va fuma.

OPACIFIEREA VEZICULEI BILIARE PE CALE INTRAVENOSĂ
(COLANGIOGRAFIA)

Pregătirea materialelor necesare	<ul style="list-style-type: none"> - Pobilan, antihistaminice, hemisuccinat de hidroclorizon, medicamente de urgență (glucoză pentru perfuzii, Romergan, Noratrinol), aparat de perfuzie, aparat de oxigenoterapie, seringă de 20 ml și ace sterile pentru injecții intravenoase; materiale pentru clismă
Pregătirea psihică și fizică a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - se anunță pacientul și i se explică necesitatea tehnicii - în dimineața examinării, se efectuează o clismă evacuatoare - pacientul nu necesită o pregătire dietetică
Testarea toleranței pacientului la iod (substanța de contrast)	<ul style="list-style-type: none"> - se instilează în sacul conjunctival al unui ochi o picătură din fiole Pobilan (fiole de probă); în caz de reacție hipergigică în decurs de 5 minute apare o hiperemie conjunctivală a ochiului respectiv sau prurit intens - se injectează intravenos foarte lent 1 ml de substanță și se supraveghează bolnavul pentru a observa dacă apare reacție hipergigică (roșeață și edem al feței, cefalee, dispnee, grețuri și vărsături) - dacă apar semnele reacției, se întrerupe administrarea Pobilanului - reacția hipergigică se combate urgent cu antihistaminice, perfuzie intravenoasă de glucoză cu Noratrinol, se administrează oxigen și se anunță medicul reanimator
Administtrarea substanței de contrast	<ul style="list-style-type: none"> - dacă toleranța organismului este bună, pacientul este așezat pe masa radiologică - se administrează substanța opacă (încălzită la temperatura corpului) foarte lent (în decurs de 10 minute): la adulți, o fiole de 20 ml Pobilan 30-50%; la copii, 1 ml sau 0,45 g substanță activă pe kilocorp - după terminarea injectiei se execută radiografiile. Căile intrahepatice și extrahepatice se opacifiază în 15-30 minute; dacă pe filmele executate nu apar vizibile căile biliare, la 40 de minute după terminarea injectiei, se administrează 2-3 linguri sirop de codeină 2‰ (fîr-o singură doză)
Îngrijirea pacientului după tehnică	<ul style="list-style-type: none"> - pacientul va fi ajutat să se îmbrace, va fi condus în salon și instalat comod în pat - se notează examenul în foaia de observație

■ ATENȚIE:

- se administrează sirop de codeină imediat după injectarea Pobilanului la bolnavii cu colecistectomie sau la care colangiografia se repetă, prima fiind nereușită; în acest caz, radiografia se execută după 30 de minute;
- prânzul Boyden (două găbenusuri crude amestecate cu zahăr) se administrează după executarea radiografiei (indiferent de calea folosită pentru substanța de contrast), având scopul provocării contracției veziculei biliare, efectuându-se radiografii ulterioare în serie, la intervale de timp de 30-60-90 minute;
- nu se administrează prânzul Boyden la pacienții cu colecistectomie, cu calculoză biliară, boala Basedow, insuficiență renală acută, icter.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A APARATULUI RENAL

Explorarea radiologică a rinichilor și căilor urinare se efectuează prin radiografie renală simplă, pielografie, urografie, cistografie, arteriografie, retroperitoneoneu și altele. Această explorare este deosebit de importantă pentru stabilirea, la aparat, a diagnosticului îmbolnăvirilor; de asemenea, ea este un mijloc de evaluare a metodelor de tratament utilizate, medicale sau chirurgicale, ajutând ameliorarea rezultatelor obținute.

Scop: evidențierea conturului rinichilor, cavițăților pielocaliceale ale acestora, precum și a căilor urinare; prezența calculilor radioopaci și radiotransparenți sau a tumorilor.

PREGĂTIREA BOLNAVALULUI PENTRU RADIOGRAFIA RENALĂ SIMPLĂ

Radiografia renală simplă: explorare radiologică fără substanțe de contrast care poate evidenția conturul și poziția rinichilor, calculii renali, ureterali sau vezicali radioopaci (care conțin săruri de calciu)

Pregătirea materialelor necesare	<ul style="list-style-type: none"> - cărbune animal; ulei de ricin; materiale necesare efectuării unei clisme evacuatorii
Pregătirea psihică a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - se anunță pacientul și i se explică importanța tehnicii pentru stabilirea diagnosticului - se explică pacientului tehnica investigației și regimul alimentar necesar pentru reușita acesteia
Pregătirea alimentară a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - cu 2-3 zile înaintea examinării, pacientul va consuma un regim fără alimente care conțin celuloză și dau reziduuri multe (fructe, legume și zarzavaturi, paste făinoase, pâine) și ape gazoase - în ziua precedentă examenului, pacientul va consuma un regim hidric (supe, limonade, ceai, apă negazoasă)

	<ul style="list-style-type: none"> – în seara precedentă, pacientul va consuma o cană ou ceai și pâine prăjită – înaintea examenului pacientul nu mănâncă și nu consumă lichide. După examen, bolnavul poate consuma regimul său obișnuit
Pregătirea medicamentoasă a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – cu două zile înaintea examinării, se administrează carbune activat și trifenolul câte două tablete de 3 ori pe zi – în seara precedentă zilei de radiografie, se administrează două linguri de ulei de ricin
Atenție!	<ul style="list-style-type: none"> – în dimineața zilei examinării, se efectuează o clismă cu apă caldă. Aerul din tubul irigatorului trebuie complet evacuat pentru a nu fi introdus în colon. Înaintea executării radiografiei pacientul își va golii vezica urinară (sau i se efectuează un sondaj) și se controlează radioscopic dacă mai există aer în intestin
Participarea la examen	<ul style="list-style-type: none"> – pacientul este condus la serviciul de radiologie – va fi ajutat să se dezbrace și să se așeze în decubit dorsal pe masa radiologică
Îngrijirea pacientului după tehnică	<ul style="list-style-type: none"> – după efectuarea radiografiei, este ajutat să se îmbrace, să se întarcă în salon, unde va fi instalat comod în pat – se notează examenul în foaia de observație

NOTĂ:

- în caz de urgență, radiografia se poate executa fără pregătire prealabilă a pacientului, dar reușita este îndoielnică.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU PIELOGRAFIE

Pielografie: radiografia aparatului renal executată cu substanță de contrast administrată prin cateterism ureteral, sub controlul cistoscopic.

Pregătirea materialelor necesare	<ul style="list-style-type: none"> – materiale necesare pentru o radiografie renală simplă; substanță de contrast = Odiston 30% sau iodură de sodiu 10%; medicamente antihistaminice; medicamente pentru urgență (trusa de urgență)
Pregătirea pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – se efectuează pregătirea bolnavului ca și pentru radiografia renală simplă (pregătire psihică, alimentară și medicamentasă)
Testarea sensibilității față de substanța de contrast	<ul style="list-style-type: none"> – se efectuează testarea sensibilității bolnavului la iod cu Odiston 80% sau iodură de sodiu 10% – dacă bolnavul prezintă o reacție hipergică, se întrerupe introducerea substanței de contrast și se administrează antihistaminice, anunțându-se imediat medicul

Administrarea substanței de contrast	<ul style="list-style-type: none"> – dacă toleranța organismului este bună, pacientul va fi condus în sala de cistoscopie, unde va fi ajutat să se dezbrace și să se așeze pe masa de examinare – spălare pe mâini cu apă curentă și săpun – sub controlul cistoscopului se introduce sonda în ureter – se introduce substanța de contrast ușor încălzită, 5-10 ml în fiecare parte cu presiune mică – bolnavul se transportă pe targă pe masa de radiografie
Îngrijirea bolnavului după tehnică	<ul style="list-style-type: none"> – după terminarea radiografiei se încearcă să se extragă -- cu o seringă -- substanța de contrast – pacientul va fi ajutat să se îmbrace; va fi condus în salon și instalat comod în pat – se notează examenul efectuat în foaia de observație

ATENȚIE:

- Pielografia se execută în condiții de asepsie perfectă.
- Substanța de contrast trebuie ușor încălzită pentru a nu produce contracții spastice reflexe ale bazinului.
- Injectarea substanței de contrast se face cu presiune moderată (altfel, produce rupturi ale bazinului sau reflux pielorenal).

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU UROGRAFIE

Urografie: metodă curentă de examinare morfofuncțională a rinichilor și căilor urinare, utilizându-se substanțe iodate hidrosolubile administrate intravenos.

Pregătirea materialelor necesare	<ul style="list-style-type: none"> – toate materialele prevăzute pentru o radiografie renală simplă; substanță de contrast Odiston de 30, 60 sau 75%; medicamente antihistaminice; medicamente de urgență; seringi Record de 10 ml sterile și ace pentru injecții intravenoase; materialele necesare pentru clismă
Pregătirea pacientului	<ul style="list-style-type: none"> – se efectuează pregătirea psihică, alimentară și medicamentasă descrisă la „Radiografia renală simplă”. – se reduce cantitatea de lichide din regimul cunoscut, iar în ziua examinării bolnavul nu mai mănâncă și nu mai bea (pentru reducerea volumului urinei) – se efectuează clismă evacuatoare înaintea injectării substanței de contrast
Testarea sensibilității față de substanța de contrast	<ul style="list-style-type: none"> – se efectuează proba de toleranță față de iod – se comunică pacientului (ca să nu se sperie) unele simptome ce pot să apară (amețeli, grețuri sau dureri abdominale) și care dispar repede fără consecințe

Participarea la examen	<ul style="list-style-type: none"> - dacă pacientul prezintă reacție hipergică, se interzice administrarea și se anunță medicul - pacientul va fi condus la serviciul de radiologie; va fi ajutat să se dezbrace și să se așeze pe masa radiologică - dacă toleranța organismului este bună, se administrează intravenos substanța de contrast, astfel: 20 ml Odiston 75% la adulți (sau 25 ml soluție 60%), iar la copii, în funcție de vârstă, se administrează 5-15 ml soluție 75% - la 8-10 minute de la efectuarea injecției, medicul execută radiografia renală (urografia)
Îngrijirea pacientului după tehnică	<ul style="list-style-type: none"> - va fi ajutat să se îmbrace, va fi condus în salon și instalat comod în pat - se notează examenul în foaia de observație

■ ATENȚIE:

- Injectarea substanței de contrast se face pe masa radiologică foarte încet, cu multă precauție, amestecându-se cu sângele pacientului.
- Urografia este contraindicată în: insuficiență renală și hepatică, boala Basedow, stări alergice, anemii hemolitice, tuberculoză pulmonară evolutivă.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU CISTOGRAFIE

Cistografie: metodă de explorare radiologică a vezicii urinare care se poate executa prin: a - radiografie simplă vezică (după evacuatrea vezicii urinare); b - radiografie după umplerea vezicii urinare cu o substanță de contrast sterilă (iodură de sodiu, 10-20%, 200-250 ml, cu ajutorul seringii Guyon), eventual amestecată cu aer.

Radiografia simplă a vezicii urinare poate pune în evidență calculii intravezicali; metoda nu necesită o pregătire prealabilă a pacientului

Cistografia cu substanță de contrast necesită următoarele:

Pregătirea materialelor necesare	<ul style="list-style-type: none"> - materiale pentru efectuarea unei clisme; sonda Nélaton sterilă; soluție sterilă de acid boric; seringă Guyon sterilă; substanță de contrast: iodură de sodiu 10% sterilă sau soluție Odiston; pensă hemostatică; mănuși de cauciuc sterile; tăviță renală
Pregătirea pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - se anunță pacientul și i se explică necesitatea tehnicii - se efectuează o clismă evacuatore cu apă caldă - pacientul este condus la serviciul radiologic, ajutat să se dezbrace și să se așeze în decubit dorsal pe masa radiologică
Participarea la cistografie	<ul style="list-style-type: none"> - spălare pe mâini cu apă curentă și săpun; se îmbracă mănușile sterile - se introduce sonda Nélaton sterilă în vezica urinară

- se captează urina prin sondă în tăvița renală și se spală vezica cu soluție sterilă de acid boric
- în seringă Guyon se aspiră 100-200 ml iodură de sodiu 10% sterilă sau Odiston și se introduc în vezică
- se închide sonda cu o pensă hemostatică
- pacientul este atenționat să nu urineze decât după terminarea examenului cistografie
- medicul execută imediat radiografia

■ RETINETI:

- Vezica urinară poate fi evidențiată cu ocazia urografiei: la 1-2 ore după injectarea substanței de contrast, ea se colectează în vezică, dând posibilitatea să fie radiografiată.
- Vezica urinară mai poate fi evidențiată prin *pneumocistografie*; vezica se umple cu aer și apoi se injectează substanța opacă prin sondă. Pacientul este pregătit ca și pentru o radiografie simplă: cu 10-12 ore înaintea examinării i se restrânge consumul de lichide și înaintea examinării vezica va fi golită, se va spăla și apoi cu ajutorul seringii Guyon se introduc 100-150 ml aer; se închide sonda cu o pensă hemostatică și apoi se injectează substanța de contrast în vezică prin punționarea sondei cu un ac.

ARTERIOGRAFIA RENALĂ

Arteriografie renală: metodă de explorare a aparatului renal prin administrarea substanței de contrast pe cale arterială (renală sau femurală), calea femurală, fiind mai ușor de abordat, este curent folosită.

Pregătirea bolnavului și administrarea substanței de contrast se realizează în condiții identice cu cele menționate la celelalte tehnici de examinare a aparatului renal.

Prima radiografie se execută la 2-3 secunde de la începerea administrării substanței de contrast, a doua radiografie la 6 secunde și a treia la 8 secunde.

■ ATENȚIE:

- Tehnica defectuoasă de administrare a substanței radioopace poate genera hematome, spasme sau tromboze arteriale, fistule arteriovenoase, întreruperea temporară a activității rinichilor.
- Substanța de contrast se injectează intravenos într-un ritm lent, durerea provocată pe durata injecției fiind suportabilă (administrarea rapidă provoacă durere intensă de-a lungul venei). Se avertizează pacientul.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXAMENUL RADIOLOGIC AL RINICHILOR PRIN RETROPNEUMOPERITONEU

Retropneumoperitoneu: introducerea de aer sau oxigen în spațiul retroperitoneal pentru evidențierea contururilor rinichilor.

Materiale necesare	<ul style="list-style-type: none"> – materiale necesare efectuării unei clișme, instrumente și materiale necesare efectuării unei puncții; aparat de pneumotorax – în perfectă stare de sterilitate
Efectuarea tehnicii	<ul style="list-style-type: none"> – se anunță pacientul, explicându-i necesitatea tehnicii și intensitatea ei – se anunță pacientul că nu trebuie să mănânce nimic în dimineața zilei de examen – în seara precedentă intervenției se efectuează o clișmă evacuatoare – va fi condus în sala de radiografie, ajutat să se dezbrace și să se așeze pe masa radiografică – spălate pe mâini cu apă curentă și săpun; se îmbracă mănuși sterile – se servește medicului instrumentarul cerut pentru a efectua puncția în loja perirenală – cu aparatul de pneumotorax medicul introduce 1000-1200 ml gaz și execută apoi radiografia – la locul puncției, se efectuează un pansament; se ajută pacientul să se îmbrace și este condus la pat

■ RETINETI:

Gazul introdus se resorbe în decurs de maximum două zile.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A APARATULUI CARDIOVASCULAR

Aparatul cardiovascular poate fi explorat radiologic prin *angiocardiografie, aortografie, arteriografie și flebografie.*

A. Angiocardiografie: introducerea unei substanțe de contrast, pe cale intravenoasă, substanță care se urmește în interiorul vaselor și al cavităților inimii.

Materiale necesare: soluție concentrată de iod; sedative (fenobarbital), romergan sau altă substanță antialergică.

Pregătirea pacientului:

– în ziua precedentă examenului, se administrează sedative, care se repetă în dimineața examenului împreună cu un medicament antialergic

– se efectuează testarea sensibilității față de iod

– dacă nu apar simptome de intoleranță la iod, se injectează intravenos substanța de contrast, rapid, în decurs de câteva secunde (cantitatea de substanță de injectat este calculată de medic, în funcție de greutatea corporală a bolnavului).

■ ATENȚIE:

- Injectarea rapidă poate provoca valuri de căldură, cefalee, congestia feței, tuse, dispnee (se injectează adrenalină).
- Angiocardiografia prin cateterism cardiac este de competența medicilor (fig. 34).

B. Aortografie: introducerea substanței de contrast prin cateter sau prin puncție, intraortic, pentru evidențierea aortei.

Pregătirea pacientului se face ca mai sus.

C. Arteriografie periferică: introducerea substanței de contrast prin injecție intraarterială pentru evidențierea arterei periferice.

Pregătirea și testarea pacientului la iod se fac la fel cu celelalte situații.

D. Flebografie: introducerea, intravenos, cu seringă automată de presiune, a 20-30 ml de substanță de contrast, de concentrație redusă (pentru a nu se leza pereții vasului). Radiografiile se execută cu viteză de 24 imagini pe secundă (radiocinematografie).



Fig. 34 – Sondă (cateter):
a – pentru cateterism cardiac;
b – model Dotter-Lukas

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL

Folosirea tehnicilor moderne, bazate pe raze roentgen, radioizotopi, ultrasunete, culegerea și amplificarea biocurenților cerebrali și musculari au o largă aplicatie la investigarea sistemului nervos central.

A. Explorarea radiologică care se adresează cutiei craniene și encefalului se realizează prin radiografie craniană simplă, pneumoencefalografie (aerografie) și arteriografie cerebrală.

a. Pentru radiografia craniană simplă, nu se efectuează o pregătire prealabilă ci se execută din față și profil, uneori cu incidente care urmăresc vizualizarea bazei craniului, șei tucești, a găurilor optice și stâncilor temporale. Uneori, pacienții agitați și copiii sunt sedati medicamentos (barbiturice, clorhidrat etc.), pentru a se asigura păstrarea poziției necesare.

b. Pentru pneumoencefalografie (introducerea unui volum de aer prin puncție suboccipitală sau lombară) sau **ventriculografie** (introducerea aerului prin trepanație direct în ventriculii cerebrali) bolnavul este pregătit astfel:

nu mănâncă în dimineața zilei de examinare, în vederea aerului; poate produce vărsătură).

- se administrează un sedativ (stabilizat de medic);
- pacientul este transportat în sala de operație (pentru trepanație și ventriculografie) sau în sala de tratament (pentru puncția suboccipitală sau lombară în encefalografie);

... pentru a se putea introduce aerul, se scoate fracțional cantitatea de lichid cefalorahidian ce corespunde celei de aer (10 ml pentru a se repara ventriculii cerebrali, 20-40 ml pentru umplerea completă a acestora); sora va acționa ca și în puncția rahidiană;

- pacientul este transportat pe cărucior la serviciul de radiologie, pentru efectuarea radiografiilor;

- după efectuarea tehnicii, pacientul va fi transportat pe cărucior în salon, instalat în pat; va păstra poziția de decubit dorsal 2-3 zile; se administrează soluție hipertonică de glucoză (dacă acuză cefalee).

C. Angiografie cerebrală: introducerea unei substanțe radioopace în arterele vasculare cerebrale; ea permite aprecierea pereților și lumenului vascular, vizualizarea unor modificări directe (anevrism, tumorare vascularizată etc.) sau indirecte (deplasări sau deformări ale vaselor prin procese patologice vecine).

B. Explorarea radiologică a coloanei vertebrale se efectuează prin *radiografie simplă* (tată, profil și incidența 3/4) și prin *radiografie cu substanță de contrast* (lipiodol, pantopac sau aer). *Mielografia* gazoasă (cu aer) este mai avantajoasă, deoarece vizualizează o suprafață mai mare din coloană și aerul se absoarbe mai repede, putându-se repeta examenul după necesitate.

Substanța de contrast – lipiodolul – se injectează în spațiul subarahnoidian prin puncția rahidiană suboccipitală, în cantitate de 2-3 ml, după ce s-a extras aceeași cantitate de lichid cefalorahidian.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA CU IZOTOPII RADIOACTIVI

Izotopii radioactivi sunt utilizați în clinică pentru diagnostic și tratament. Izotopii radioactivi, introdusi în organism, emit radiații α , β , γ la locul lor de trecere sau de depozitare, care pot fi evidențiate calitativ și cantitativ prin procedeele obișnuite de detectare (contoarele Geiger-Müller, contoare cu scintilație, fotodozimetre și detectare cu cristale semiconductoare).

Tehnici de investigație cu radioizotopi sunt relativ simple, iar aplicarea lor în doze mici nu constituie un pericol (dacă se respectă normele de securitate).

Izotopii utilizați cel mai frecvent sunt: radiosodiul, radiocuprul, radioiodul și radiofostorul. Izotopii radioactivi se utilizează cu succes în explorarea hepatobiliară, renală, a sângelui și organelor hematopoietice, a aparatului cardiovascular, a glandelor endocrine.

În diagnosticul proceselor parenchimatose joacă rol important **metoda scintigrafiei**: folosirea izotopilor radioactivi care se fixează în organul examinat, determinând o hartă a organului. Scintigrama organelor detectate (tiroidă, ficat),

rinichiul, creierul etc.) arată zonele hiper-, normo- sau hipofuncționale, evidențiind modificările de formă sau structură.

Acțiunea nocivă a izotopilor radioactivi asupra organismului necesită respectarea unor **măsuri de protecție** împotriva radiațiilor:

- măsuri și halatul obișnuiți protejează individul tată de radiațiile α (au forță de pătrundere mică);

- stocul de izotopi radioactivi se păstrează în rezervoare de plumb speciale, în încăperi situate departe de saloanele bolnavilor și laboratoare;

- se lucrează numai sub protecție de paravane de plumb, în nișe speciale cu telecomandă;

- aspirarea soluțiilor radioactive se face numai cu pipete automate; mișcarea trebuie evitată; dacă unele manopere determină formarea de praf, se utilizează măști cu filtre speciale;

- poluarea pielii se evită prin folosirea mănușilor de cauciuc îmbrăcate și dezbrăcate corect;

- nu se lucrează cu izotopi radioactivi dacă există răni, zgârieturi etc.
- hainele de protecție vor fi purtate obligatoriu;

- nu se consumă alimente și nu se turnează la locul de muncă;
- este strict interzisă pătrunderea în saloanele de bolnavi sau alte încăperi cu în-

- bănciminta de protecție din laboratorului cu izotopi radioactivi;
- pacientul investigat cu izotopi radioactivi va fi izolat de restul pacienților, fiind sursă de radiații;

- produsele biologice și patologice ale pacientului vor fi manipulate cu aceeași măsură de protecție ca și izotopii;

- personalul care lucrează cu izotopi radioactivi va purta dozimetru cu filtre de metal, care, periodic, se controlează pentru stabilirea gradului de iradiere a persoanei.

Pregătirea pacientului pentru explorări endoscopice

Endoscopie: metoda de examinare prin vizualizarea directă a unei cavități a corpului uman cu ajutorul unui endoscop (endoscopia permite nu numai diagnosticul unor leziuni, ci și unele tratamente ca extragerea unor corpi străini, distrugerea unor tumori prin coagulare sau rezecție și dilatarea unor conducte).

Endoscop: aparat optic, prevăzut cu un dispozitiv de iluminare menit introducerea în cavitatea de examinat, un sistem de transmitere al imaginilor și instrumente anexe: pense de biopsie, perii de broșaj etc. Endoscoapele moderne permit fotografierea unor imagini endocavitare, înregistrarea lor cinematografică sau video. Reușita unei endoscopii – condiționată de colaborarea pacientului – poate fi obținută numai prin buna lui pregătire psihică, inclusiv privind unele atitudini sau poziții ce le va adopta în timpul manevrelor.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU BRONHOSCOPIE

Bronhoscopia: explorarea arborelui traheo-bronșic se face cu ajutorul bronhoscopului rigid sau flexibil (fibrobronhoscopul).

Bronhoscopul rigid se compune dintr-o serie de tuburi metalice de 30–40 cm, lungime și 4-9 cm diametru (fig. 35), prevăzute cu un canal central „de observare și lucru” și laterale de iluminare, administrare de oxigen etc. Bronhoscoapele rigide sunt prevăzute cu orificii laterale, au extremitatea distală tăiată oblic și fin polizată, pentru a nu provoca leziuni; lumina este condusă prin fibra optică, tubul fiind conectat, ca și opticele de examinare, la o sursă de lumină, printr-un sistem special de cabluri (fig. 36) Opticele – tuburi rigide ce se introduc prin tubul metalic deschis – sunt conectate la aceeași sursă de lumină și permit vizualzări cu ajutorul unor prisme




Fig. 35 – Bronhoscop universal cu lumină atât distală, cât și proximală




Fig. 36 – Bronhoscop rigid cu iluminare prin fibre optice




Fig. 37 – Fibrobronhoscop

„domeniul de examinare se extinde și la bronșii segmentare și subsegmentare

astfel încât se poate examina, și conducte aerifere de gradul IV sau V (bronșii segmentare și subsegmentare (fig. 38). Un fin canal permite introducerea unei fine și flexibile pense de biopsie sau a periei de broșaj, cu ajutorul căreia se recoltează material pentru examen citologic. Un alt canal, tot atât de fin, este conectat prin intermediul unui recoltor de sticlă sau plastic (de unică folosință) la un aspirator puternic.

Ambele sisteme au avantaje și dezavantaje. Astfel, sistemul rigid permite o mai largă gamă de manevre terapeutice, dar nu vizualizează un câmp de ramificații de amploare sistemului flexibil.



Fig. 38 – Bronșii segmentare și subsegmentare

speciale, la 130°, 45° și 90°. Ca anexe, bronhoscopul rigid are tuburi de aspirație, pense de biopsie de diferite modele, portampoane etc.

Fibrobronhoscopul (fig. 37) e mai ușor acceptat de pacient. Imaginea este transmisă printr-un sistem de fibre optice. Extremitatea lui este flexibilă și examinatorul îi poate imprima diferite unghiuri de examinare, pense de biopsie, perii de broșaj etc.

Pregătirea instrumentelor și materialelor necesare

- se face inventarul tuturor instrumentelor necesare;
- măști de unică folosință sau casolete cu măști sterile, mănuși sterile, casolete cuampoane și comprese de tifon sterile; pense; porttampo; oglindă frontală; seringă laringiană; tăviță renală; aparatele (bronhoscop sau fibroscop) cu toate anexele sterilizate.
- important

- sterilizarea componentelor aparatelor principale și a anexelor se face ținând cont de instrucțiuni (fiecare component are alt mod de sterilizare, prevăzut în instrucțiuni de ex. ultraviolete, Glutaraldehide)
- se verifică sursa de lumină și corecta cuplare a cablurilor
- se verifică aspiratorul și etanșeitatea legăturilor
- vor fi la îndemână: flaconul cu anestezie (Xilina 2%, flaconul cu ser fiziologic, flaconul cu soluție de adrenalină 1%, seringi de 10 ml de unică folosință,ampoane, comprese de tifon).
- supralata mesei pe care se află instrumentarul e încălzită la 40° – 45°, pentru a preveni aburirea instrumentarului optic.

- pacientul trebuie convins de necesitatea exămenului, asupra riscului pe care și-l asumă refuzându-l, lipsind medicul de o informare diagnostică esențială

	<p>— pacientul trebuie convins că, deși neplăcut, examenul nu e dureros în sine, iar incidentele sau accidentele survin foarte rar</p> <p>— se creează pacientului un climat de siguranță, pentru a asigura cooperarea lui în toate momentele examinării, punându-l în legătură cu alți pacienți cărora li s-a efectuat o bronhoscopie sau fibroscopie</p> <p>— în ziua premergătoare examinării, se execută o testare la xilină 2%, pentru a depista o alergie la acest anesthetic; la indicația medicului, pacientul va fi sedat atât în seara premergătoare explorării, cât și în dimineața zilei respective</p> <p>— pacientul trebuie anunțat că nu trebuie să mănânce dimineața</p> <p>— pentru anestezie, e așezat pe un scaun, în mână dreaptă va ține o tăviță renală sau o scupătoare, iar cu mâna stângă, după ce își deschide larg gura, își scoate limba, și-o imobilizează cu două degete deasupra și policele dedesupt</p> <p>— într-un prim timp, medicul, cu ajutorul unui spray cu xilină 2%, îi anesteziază limba, orofaringele și hipofaringele, urmând să anestezieze arborale traheobronșic, înstiland, picătură cu picătură, anestezicul ușor încălzit, cu ajutorul unei seringi laringiene</p> <p>— pacientul este condus în camera de bronhoscopie</p>
<p>Participarea la efectuarea tehnicii (sunt necesare două asistente medicale)</p>	<p>• Bronhoscopia</p> <p>— asistenta I așază pacientul pe masa de examinare în decubit dorsal, cu extremitatea cefalică în extensie (fig. 39)</p> <p>— sub umerii lui, se plasează o pernă tare, care, ridicând capul la 12-15 cm, ajută la extensia acestuia</p> <p>— orientează capul în direcția indicată de medic, pentru a permite acestuia o orientare cât mai completă</p> <p>— asistenta II servește medicul cu instrumentele și materialele solicitate (Dacă masa de examinare este prevăzută cu o tetteră, este nevoie doar de o singură asistentă)</p>



Fig. 39 - Bronhoscopie
— poziția pacientului pe masa de examinare

■ **ATENȚIE:**
ambele asistente, înainte de examinare, se vor spăla pe mâini și vor purta mască sau cagulă

<p>Supravegherea pacientului după bronhoscopie</p>	<p>După examinarea bronhoscopică, pacientul nu va mânca o oră. Asistenta va supraveghea, în acest timp, parametrii vitali (puls, TA etc.), anunțând imediat pe medic dacă survin modificări ale acestora.</p> <p>Asistenta va avea la îndemână hemostatice, pe care le va administra în cazul unei hemostizii, chiar înainte de a anunța medicul (Adrenostazin, Diclonone, E.A.C., Venostat etc.)</p>
<p>Participarea la efectuarea tehnicii (fig. 40) (sunt necesare două asistente)</p>	<p>• Fibroscopia</p> <p>— pacientul este așezat pe un scaun; asistenta I conectează pacientul la sursa de oxigen, asigurându-se că acesta primește debitul recomandat de medic</p>
<p>Supravegherea pacientului după fibroscopie</p>	<p>Reguliile sunt aceleași ca și pentru bronhoscopie</p>
<p>Incidente și accidente (de bronhoscopie și/sau ale fibroscopului)</p>	<p>— hemoragii, diseminări tuberculoase sau suprainfecții cu diferiți germeni, dureri în gură, disfație sau orofagie, dureri retrosternale, cefalee, insomnie, tuse, expectorație, stare subfebrilă.</p>



Fig. 40 - Fibroscopie: participare la efectuarea tehnicii



Fig. 41 - Fibroscopie: imobilizarea piesei bucale cu indexul și degetul mijlociu

— asistenta I se plasează în spatele pacientului, îi fixează piesa bucală aflată în trusa fibroscopului, pe care o va avea sub control tot timpul examinării, imobilizând-o din lateral cu indexul și degetul mijlociu, de la ambele mâini (fig. 41)

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU ESOFAGOSCOPIE

Esofagoscopia: examinarea lumenului esofagian cu un aparat numit esofagoscop, în scop diagnostic sau terapeutic (extragerea corpiilor străini, cauterizarea și badionarea unor ulceratii, incizarea unor abcese, polipectomii, sclerozarea varicelor esofagiene).

În serviciile de O.R.L., se utilizează încă, în anumite situații, *esofagoscopul rigid*: tub de metal polizat, cu lungime de 45 cm și grosime de 7-12 mm, cu extremitatea distală rotunjită (fig. 42 a), prevăzut cu un mandrin obturator și cu mecanism propriu de iluminare (fig. 42 b), montat proximal sau distal, un sistem optic și anexe: – pentru sa pentru prelevat biopsii, porttampoane, pense pentru corpi străini etc. (fig. 42 c).





Fig. 42 – Esofagoscop Brunings.

a. *sistemul de iluminare*: 1 – locul de fixare a tubului; 2 – locul de fixare a sistemului de iluminare; 3 – lentila condensatorului; 4 – corpul oglinzii; 5 – viza de reglare; 6 – întrerupător; b. *tubul*: 1 – tub exterior; 2 – tub interior; 3 – resortul tubului interior; 4 – armătura de fixare a sistemului de iluminare; c. *anexă* – piesă pentru extragerea corpiilor străini: 1 – tub; 2 – inel mobil; 3 – canală; 4 – bandă conductoare; 5 – viza de fixare a conductorului.



În serviciile de endoscopie, medicul endoscopist gastroenterolog utilizează: *eso-gastroscoful flexibil* – tub flexibil, lung de 100 cm, confecționat din fibre de sticlă de diverse tipuri, prevăzut cu o sursă de lumină, un canal pentru aspirație, un canal pentru introducerea unei pense de biopsie și un canal pentru spălarea lentilei din interior (fig. 42).

Material necesar

– măști de unică folosință sau casolete cu măști sterile; două sorturi de cauciuc (pentru medic și pentru asistentă); pipe Guedel; tăviță renală; casoleta cu comprese sterile; porttampoane; substanța anestezică: Xilocaina spray, Stomacaina spray sau Novocaina 1% și xilina (pentru badionare locală); ochelari de protecție; mănuși sterile; esofagoscopul (cu

Pregătirea psihică și fizică a pacientului

bate anexe sterile); substanțe dezinfectante: Glutaraldehidă, CIDEX, alcool 90°; un recipient cu soluție de Glutaraldehidă, pentru dezinfecția pipelor folosite; un alt recipient cu soluție de Glutaraldehidă, pentru aspirare; apă distilată pentru spălarea lentilei din interior; medicamente: – sedative, cardiotonice, trusa antișoc, substanța medicamentoasă pentru sclerozarea varicelor esofagiene.

În serviciile O.R.L., la nevoie, se mai pregătesc: depărtător de gură, oglindă frontală cu sursă de lumină corespunzătoare, aspirator de salivă cu sondele corespunzătoare.

* Asistența:

- identifică cunoștințele pe care le are pacientul, legat de procedură și cunoștințele despre eventualele afecțiuni pentru care se efectuează examinarea
- identifică intensitatea fricii și clarifică unele percepții eronate legate de obiectul acesteia
- informează și explică procedura și îi spune pacientului ce va simți în timpul examinării
- îl convinge de necesitatea și importanța investigației
- îi spune că va fi tot timpul alături de el, asigurându-l că-l înțelege temerile
- îl solicită să coopereze

■ Precizare:

- asistența trebuie să fie capabilă ca, printr-un dialog cu pacientul, să stabilească o relație de interacțiune și să-l încurajeze; o comunicare eficientă, făcută cu abilitate și competență de către asistentă, îl face pe pacient să se deschidă, să aibă încredere în ea, îl determină să-și descarce sentimentele, exprimându-și frica, anxietatea; în felul acesta el se ușurează și își diminuează neliniștea

1. • Pregătirea fizică: este

ca și pentru bronhoscopie, cu mențiunea că anestezia locală se limitează la limbă, orofaringe, hipofaringe și esofag (fără anestezierea arborelui traheobronsic).

Pentru esofagoscopie, se poate administra pacientului o fiolă de atropină, pentru inhibarea




Fig. 43 – Esofagoscopie

secretei gastrice (dacă pacientul nu prezintă tahicardie sau alte contraindicații)

● **Poziția pacientului:**

Esotagoscopia se poate executa în poziție șezând (fig. 43), în decubit dorsal sau în decubit lateral, stâng, urmărindu-se că gura, faringele și esofagul să fie în linie dreaptă.

■ **ATENȚIE:**

Participarea asistentei la efectuarea tehnicii și îngrijirea pacientului după esotagoscopie se bazează pe aceleași reguli ca și la bronhoscopie. Esotagoscopia este foarte rar urmată de incidente sau accidente, care sunt aceleași ca în bronhoscopie.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU GASTROSCOPIE

Gastroscopia: vizualizarea directă a mucoasei gastrice, cu ajutorul unui instrument optic, numit gastrofibroscop.

Azi se utilizează:

eso – gastro – duodeno – scopul. Este un aparat modern, care are înglobate în construcția sa sistemul optic, cel de insufflație și aspirație. Totodată, există posibilitatea adaptării acestuia la camera video, cu urmărirea imaginii obținute pe un ecran TV. (Videodendoscop) (fig. 44).




Fig. 44 – Sistem complex de endoscopie digestivă superioară și inferioară, format din videoscop, sursă de lumină, unitate de control și monitor (vizualizarea luminii)

Scop	– diagnostic – terapeutic (polipectomie, tratament endoscopic pentru hemoragiile digestive, tratament cu laser).
Pregătirea instrumentelor și a materialelor necesare	Se pregătesc materialele necesare în funcție de scopul instrumentelor investigate: – măști sterile, șofuri de cauciuc, comprese sterile, tăviță renală, pipe Guedel, substanțe anestezice (ca și la esotagoscopie), mănuși sterile, portampoaie, recipiente cu substanțe dezinfectante (aceleași ca și la esotagoscopie); ochelari de protecție

Pregătirea psihică și fizică a pacientului

- medicamente: atropină, scobutii, midazolam, diazepam, adrenalină – fiole (trusa antișoc)
- seringă de 2 ml de unică folosință
- glicerină sterilă sau Silicon, pentru lubrifierea tubului gastroscopului, sondelor
- perute de citologie
- pensă pentru prelevat biopsie și pensă anatomică
- recipient cu formoi, pentru testul ureazei, în vederea determinării prezenței Helicobacterului pylori

Orice pacient ce urmează a fi supus acestei investigații sau altor examinări endoscopice, este îngrijorat în privința procedurii și a diagnosticului, iar în unele cazuri, anxietatea este foarte accentuată.

Se impune, atunci, calmarea pacientului.

Pentru liniștirea pacientului, asistenta trebuie să-l încurajeze, să comunice, să favorizeze „relația de la ființă umană la altă ființă umană”, astfel încât să-l determine să-și exprime sentimentele. În cadrul acestei comunicări (discuție, observație), asistenta încearcă să:

- evalueze gradul anxietății pacientului, cauza anxietății (frica de investigație, frica de diagnostic grav, frica de durere etc.); în funcție de aceste probleme identificabile, aplică intervențiile autonome corespunzătoare (vezi „Ghid de Nursing”).
- asigure un climat calm, de căldură umană
- printr-o comunicare eficientă, verbală și nonverbală, îi demonstrează pacientului că îi înțelege problemele (climat de înțelegere empatică)
- îi explică efectele dezagreabile ale investigației (ca să știe la ce să se aștepte), rugându-l ca, printr-un efort de voință, să le depășească, pentru a putea coopera în timpul examinării.

Prin discuția competentă cu pacientul, asistenta culege date pentru depistarea altor manifestări de dependență, legate de satisfacerea sau nesatisfacerea celor 14 nevoi fundamentale. Problemele identificate (anxietate severă, risc de alergii, tahicardii etc.) asistenta le va comunica medicului, care va indica medicația necesară.

Asistenta:

- va administra medicația recomandată de medic (intervenție cu rol delegat) pentru sedarea pacientului sau pentru prevenirea unor incidente – accidente (vezi participarea la tehnică)
- pentru buna pregătire fizică a pacientului, asistenta îi va explica importanța golirii și curățirii complete a stomacului astfel:
 - îl anunță să nu mănânce și să nu țină în dimineața zilei de examinare și în seara precedentă investigației
 - în seara zilei precedente, se efectuează pacientului la care

	evacuarea stomacului e deficitară o spătură gastrică cu apă caldută
Participarea la tehnică	<ul style="list-style-type: none"> – sedarea pacientului se face prin administrarea a câte o tabletă de diazepam, în seara precedentă examinării și, dacă e nevoie, și dimineața – cu 40-50 minute înainte de probă, i se efectuează o injecție cu atropină, (dacă nu există contraindicații), scobutii sau diazepam – înainte de începerea investigației, asistenta efectuează anestezia locală cu spray (Xilocaină, Stomacaină) sau se face badijonarea locală (baza limbii și faringele) cu soluții de Novocaină 1% sau xilină; aceste soluții pot fi folosite pentru anestezia locală și prin gargară – se așază pacientul pe masa de examinare, în decubit lateral, stâng, pe o pernă tare Gastroscoopia se efectuează cu ajutorul a două asistente: <ul style="list-style-type: none"> Asistenta I vorbește cu pacientul, îl liniștește, îi asigură poziția capului în extensie forțată, ține tăvița renală sau îi șterge gura de secreții cu o compresă Asistenta II ajută medicul la introducerea aparatului, ungând gastroscoful, prezentându-i instrumentele
Îngrijirea pacientului după tehnică	<ul style="list-style-type: none"> – este supravegheat încă o jumătate de oră în camera unde pacientul a fost examinat – este transportat în salon (atenție la cei cu hemoragie digestivă superioară în curs) – este supravegheat atent timp de două ore după terminarea examinării, urmărindu-se să nu manânce, să nu bea – pacientul cărui a i s-a prelevat biopsie, este atenționat să nu consume alimente fierbinți – dacă pacientul nu reușește să elimine mucusul și aerul din stomac și acuză dureri, la indicația medicului, se introduce sonda gastrică și se elimină aerul și mucozitățile – se efectuează pacientului inhalatii cu mentol, pentru evitarea senzațiilor neplăcute din gât
Pregătirea produselor pentru laborator	<ul style="list-style-type: none"> – se pregătesc fragmentele de țesut și mucoasă stomacală; produsele prelevate, în vederea examinărilor histologice, se etichetează și se trimit urgent la laborator La serviciul de endoscopie, asistenta analizează fragmentele biopitice (testul ureazel), în vederea descoperirii prezenței Helicobacterului pylori (testul durează 1 oră)
Reorganizarea locului de muncă	<ul style="list-style-type: none"> – se aspiră soluție de Glutaraldehidă 2% sau CIDEX, până când este curat gastroscoful (prin 4 minute de dezinfecție cu Glutaraldehidă sau CIDEX se distruge virusul SIDA) – se spală bine de secreții exteriorul și interiorul aparatului cu apă și săpun, apoi, se clătește bine

- aparatele prevăzute cu un cerc albastru (care sunt de ultimă generație) se pot curăța și dezinfecta sub imersie totală în mașini de spălat speciale.
- interiorul fibrogastroscofului se spală cu o perie care trebuie introdusă în toate canalele, astfel încât canalele să fie irigate cu produs dezinfectant
- se periază extremitățile endoscopului
- se șterge aparatul cu soluție de Glutaraldehidă sau CIDEX (atenție, este toxică); apoi, se șterge cu alcool de 90° (care se evaporă repede și îndepărtează dezinfectantul)
- se usucă bine (pentru a preveni o eventuală infestație micotică)
- fibrogastroscoful și pensele biopitice se ung cu silicon, pentru a le proteja
- se stochează materialul curat într-un dulap, care trebuie dezinfectat zilnic
- fibrogastroscoful trebuie pus într-un câmp steril, iar dimineața, se dezinfectează din nou

● **Incidente și accidente:**

- dureri la deglutiție, subfebrilități, dureri și tumefacția amigdalelor, hemoragie, SIDA.

■ **DE RETINUT:**

Dacă nu se utilizează corect echipamentul de protecție (mănuși, mască, ochelari, etc) când se lucrează cu soluții dezinfectante, personalul medical este supus riscului următoarelor îmbolnăviri: SIDA, astm, conjunctivite, dermatoză, eczeme.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU ENDOSCOPIE RECTOSIGMOIDIANĂ

Rectosigmoidoscopie: explorarea endoscopică a segmentului terminal al tubului digestiv, cu ajutorul unui aparat numit rectoscop, pentru evidențierea modificărilor mucoasei până la o adâncime de 30 cm de la orificiul anal (ampula rectală și ultima porțiune a sigmoidului). Aceste examen este necesar pentru stabilirea diagnosticului în suferințe hemoroidale, constipație sau diaree cronică, tenesme rectale, sânge în materiile fecale etc.

Rectoscop: un sistem de tuburi metalice intrarectale: trei mai înguste (16 – 20 mm diametru) pentru explorare, iar unul mai gros (24 mm diametru), pentru tratament, având un orificiu lateral ce poate fi închis etanș în timpul introducerii în rect și prin care se pot executa intervenții intrarectale sub control endoscopic (prelevări biopsice, cauterizări etc.). Fiecare tub este înarmat cu un mandrin cu vârf bont, care se îndepărtează după introducerea aparatului în rect (**fig. 45 a**). Corpul aparatului este prevăzut cu dispozitivul optic ce asigură vizibilitatea (bec electric și




Fig. 45 Rectoscop.

a. tub endorectal cu mandrină; 1 - tub endorectal; 2 - lăa mandrinului; 3 - capul rotund al mandrinului; 4 - manerul; 1 - tub de tratament; 2 - inel de etanșare a orificiului lateral prin care se introduc instrumentele; 3 - corpul aparatului; 4 - lunetă; 5 - dispozitiv de iluminat; 6 - transformator electric; 7 - pompă de cauciuc

ogilindă așezată în unghi de 45°). El se fixează la extremitatea tubului după îndepărtarea mandrinului (fig. 45 b). Dispozitivul poate fi înlocuit cu o lunetă, pentru observarea detaliilor. Aparatul se racordează la sursa de lumină iar cu ajutorul unei pompe de cauciuc, se facilitează pătrunderea tubului în rect, prin însuflarea de aer.

Pregătirea instrumentelor și materialelor necesare	<ul style="list-style-type: none"> - irigator, apă caldă (37°); ulei de vaselină;ampoane de vată; casoleță cu mănăși sterile de cauciuc; un câmp steril, cu orificiul central, pentru tubul rectoscopului; rectoscopul cu tubul și mandrinul sterilizate prin fierbere sau autoclavare (pentru aduși, tubul cu diametrul de 20 mm; pentru copii, cel cu diametru de 16 mm); soluție saturată de sulfat de magneziu; medii de cultură pentru însămânțări bacteriologice (dacă este cazul); pensă pentru biopsie, pensă anatomică, recipient cu formol, pentru fragmentul biopic.
Pregătirea psihică și fizică a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - se informează pacientul în ce constă tehnica, explicându-i-se necesitatea și importanța ei pentru stabilirea diagnosticului - cu două zile înainte de examen, pacientul va ingera doar lichide (supe, ciorbe, lapte, ceai, suc, apă) - în seara precedentă examinării, se efectuează 2 cisme evacuatoare simple/finale, a câte 2 l apă caldă, la interval de 1 oră - în dimineața investigației, cu 2-3 ore înaintea examinării, se efectuează, din nou, 2 cisme evacuatoare (pentru a îndepărta complet resturile de materii fecale sau exsudatele patologice) - se dezbracă regiunea inferioară a trunchiului - se ajută pacientul să se așeze pe masa de examinare, în poziție genupectorală, cu uscată lordoză a regiunii lombare - se acoperă pacientul cu câmpul prevăzut cu orificiu (acesta să coincidă cu regiunea anusului)
Participarea la rectoscopia	<ul style="list-style-type: none"> - se montează corpul aparatului și se racordează la sursa de lumină - se verifică funcționalitatea dispozitivului optic

- se unge în jurul rectoscopului cu ulei de vaselină
- se oferă medicului mănăși sterile (pentru efectuarea tușeului rectal), apoi, asistenta servește medicul cu alte mănăși sterile și îi oferă tubul rectoscopului pentru a fi introdus în rect (fig. 46)




Fig. 46 - Rectoscopie
1. poziția inițială a rectoscopului;
2. poziția rectoscopului în canalul anal și ampula rectală

Îngrijirea pacientului după tehnică

Pregătirea produselor pentru laborator

Reorganizarea locului de muncă

- se extrage mandrinul și se fixează corpul aparatului la tubul intrarectal (medicul urmează să examineze mucoasa recto-sigmoidiană)
- se însuflă aer cu ajutorul pompei (dacă medicul solicită)
- se pregătesc tamponale cu soluție de sulfat de magneziu și se oferă medicului (dacă le solicită în eventualele obstacole create prin contracția spasmodică a părților examinate)
- la nevoie, se folosesc tamponale uscate, pentru îndepărtarea resturilor de materii fecale
- se preia tubul extras de medic, după terminarea examinării
- se efectuează toaleta regiunii anale, imediat după îndepărtarea tubului, îndepărtându-se mucozitățile și resturile substanței lubrifiante
- se transportă pacientul la salon, la patul său
- dacă s-au făcut însămânțări bacteriologice, se pregătesc materialele pentru laborator (se completează buletinul de recoltare cu datele de identitate ale pacientului și examenul cerut) și se transportă imediat la laborator
- se curăță mecanic rectoscopul, se spală bine și se pregătește pentru sterilizare
- deoarece unele piese ale rectoscopului nu pot fi sterilizate la autoclav, în cutia aparatului se păstrează permanent 10-15 tablete de formol
- piesele care nu se pot steriliza, le dezinfectăm cu Glutaraldehidă sau CIDEX și alcool de 90°

ATENȚIE:

- la pacienții debili sau cardiaci, examinarea se face în decubit dorsal, cu genunchii flectați și coatele în abducție
- administrarea de purgative produce o lichefiere a materiilor fecale, care se pot scurge mereu în timpul examinării în ampula rectală, împiedicând vizibilitatea
- explorarea trebuie precedată de tușeu rectal, pentru excluderea unei stenoze, cea care contraindică rectosigmoidoscopia și anoscopia (fig. 47)
- nu se execută în pusee hemoroidale acute.




Fig. 47 - Anoscop
cu volei mobil - model Bensaude

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU COLONOSCOPIE

Colonoscopia: examenul vizual direct al colonului, cu ajutorul unui colonoscop flexibil; se vizualizează colonul sigmoid, descendent, transvers și ascendent până la cec (fig. 48).

Colonoscopul: tub din fibre optice flexibile, lung de 135-185 cm; el se poate adapta și la camera video, cu urmărirea imaginilor obținute pe un ecran TV (vezi fig. 44 de la gastroscopie).



Fig. 48 – Traiectul colonoscopului flexibil pornind de la rect până la colonul sigmoid, descendent, transvers și ascendent până la cec

Pregătirea instrumentelor și a materialelor necesare	<ul style="list-style-type: none">– iușama, așeză, coșoprese mici sterile, casoleță cu câmpuri sterile, mănuși de cauciuc, vensă de biopsie, recipient pentru prelevări histologice, colonoscop cu sursă de lumină și sistem de aspirație, vaselină, silicon pentru lubrifiere, recipient cu apă pentru curățirea colonoscopului după utilizare; recipiente cu substanțe pentru dezinfecția aparatului (aceleași substanțe ca și la gastroscopie)– medicamente pentru sedarea pacientului
Pregătirea psihică și fizică a pacientului	<ul style="list-style-type: none">– se explică pacientului necesitatea investigației– este încurajat și se informează pacientul despre tehnica utilizată, durata investigației, efectele neplăcute (senzația de presiune, durere)– se explică scopul pregătirii fizice, în vederea golirii și curățirii complete a colonului de materii focale și mucus, care ar împiedica examinarea <p>Pregătirea fizică:</p> <ul style="list-style-type: none">– trei zile consecutiv, seara și dimineața, se efectuează c ă t e două clisme evacuatoare simple, înalte, la interval de o oră, cu câte doi litri apă caldă; ultima clismă se face în dimineața examinării, cu 3-4 ore înainte– în prima și în a 2-a seară de pregătire, se administrează un purgativ– în cele trei zile de pregătire, pacientul va ingera doar lichide– la nevoie, i se pot administra lichide prin perfuzie i.v., în scopul combaterii sau prevenirii deshidratării– seara, înaintea examinării, se dă un somnifer– în dimineața examinării, i se administrează 1 fioa diazepam și scobutil, cu 30-60 de minute înaintea începerii colonoscopiei

Participarea la colonoscopie

- sunt necesare *doi asistenți*:
- *asistența* / liniștește pacientul, îl solicită să coopereze și, pe cât posibil, să se relaxeze (informarea anterioară îl face mai cooperant și mai tolerant față de efectele neplăcute ale tehnicii)
- urmărește funcțiile vitale ale pacientului
- îl așază în decubit lateral stâng, cu genunchii flectați, și este acoperit cu un câmp steril, prevăzut cu un orificiu central (în timpul examinării, la solicitarea medicului, poziția pacientului poate fi schimbată dintr-un decubit în altul, pe măsură ce sonda înaintează)
- *asistența* // verifică colonoscopul, asigurându-se că este adaptat corect la sursa de lumină și că are însoțita și aspirația bună
- lubrifică vârful tubului (colonoscopului) cu vaselină și îl introduce, încet, în anus

■ ATENȚIE:

- asistența va avea grijă să nu ajungă vaselina pe lentilă, fapt care ar împiedica vizibilitatea;
- pe măsură ce medicul are vizibilitatea traectului lumenului colonic stâng, asistența, la solicitarea acestuia, avansează tubul încet, în lumenul colonului;
- în acest timp, asistența l se ocupă de pacient, supraveghindu-l și explicându-i cum să coopereze.

■ NOTĂ:

Îngrijirea pacientului după colonoscopie, pregătirea produselor pentru laborator, îngrădirea locului de muncă se fac la fel ca și în cazul recto-sigmoidoscopiei. *Incidente și accidente:* sângerare, dureri abdominale violente, care opresc investigația, perforație, tahicardie, stop cardiac reflex.

■ DE RETINUT:

Contraindicații: în operații abdominale recente, în cursul diverticulitei acute sau al colitelor ulcerative, herniilor ombilicale, în ascite masive sau la persoane confuze necooperante.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU CISTOSCOPIE

Cistoscopia: metoda de evaluare a endovezicii cu ajutorul cistoscopului.

Scop	– identificarea proceselor patologice endovezicale, inflamațiilor specifice sau nespecifice, tumorilor, malformațiilor anatomice, calculilor, corpiilor străini
-------------	---




Fig. 49 - Cistoscop
1. supapă automată; 2. robinet cu dublu curent al lichidului din sistemul de spălare

S-a pornit de la cistoscopul cu lumină caldă (fig. 49), ajungându-se la cistoscopul flexibil. Cistoscopul cel mai des utilizat azi (fig. 50) este alcătuit din următoarele elemente:

- o teacă metalică, cu extremitatea distală cudată în cârjă
- un obturator (mandrin), care este o țijă metalică cu extremitatea rotunjită, care permite introducerea cistoscopului fără lezarea mucoasei uretrale

- un telescop de examinare sau sistemul optic, compus dintr-o prismă amplasată spre vârful instrumentului și un ansamblu de lentile montate în serie; acestea transmit imaginea spre partea terminală a telescopului, numită ocular (are formă pavilionară, cu o lentilă prin care se privește)

- un telescop de cateterism, construit ca cel de mai sus; în plus are unul sau două canale, prin care se introduc instrumente ce vor cateteriza ureterul, și o mică piesă de formă unei scăărițe (Onglet - Alburran), care dirijează extremitatea catetereilor spre orificiile ureterale.




Fig. 51 - Rezectoscoape




Fig. 50 - Elementele componente ale cistoscopului (teacă metalică, obturator metalic, telescop de cateterism, telescop de examinare, sondițe uretrale)

Cistoscopelor li se aduc modificări în funcție de patologia și scopul urmărit. Astfel există: cistoscopi de examinare și cistoscopi de cateterism, descrise anterior. Prin aceste cistoscopae, se pot introduce în vezică instrumentele pentru prelucrarea calculilor vezicali, biopsierea formațiunilor tumorale etc. Din cistoscopae - s-au desprins **REZECTOSCOAPELE**, (fig. 51) instrumente folosite la rezecția adenomului de prostată, ADKP (adeno-carcinomului de prostată), a tumorilor vezicale, a sclerozei de col etc. Mai nou, au intrat în practică instrumentele flexibile puțin traumatizante, formate dintr-un mănunchi de fibre lungi de sticlă, transmițând o lumină puternică, albă. Astfel, se explorează întreaga suprafață a endovazicii, decelându-se orice proces patologic.

Pregătirea instrumentelor și a materialelor	<ul style="list-style-type: none"> - cascadate cu câmpuri sterile și mănuși de cauciuc sterile, costum steril pentru medic (halat, mască), seringă Guyon cu olivă uretrală, sterilizată, soluție de novocaină 0,5% 40-50 ml, seringă de 20 ml sterilizată, pense sterile, tamponane de vată sterile, cistoscop de irigație, de cateterism sau cistoscopul operator (în funcție de scopul urmărit) sterilizate, soluție de acid boric 3%, două sonde ureterale radioopace, lungi de 60-70 cm și groase de 4-8 (scara Charrière), sonde uretrovezicale sterile, soluții dezinfectante, eprubete pentru recoltarea urinei, două tăvițe renale
Pregătirea psihică și fizică a pacientului	<ul style="list-style-type: none"> - se anunță pacientul, explicându-i-se necesitatea tehnicii; la nevoie, cu o jumătate de oră înainte de explorare, i se administrează un sedativ - i se suprimă micul dejun și va ingera 500 ml lichid, cu o oră înainte de examen (pentru a se asigura fluxul urinar necesar) - pacientul își va golii vezica urinară, va fi condus în sala de examinare și ajutat să se dezbrace (în regiunea inferioară a trunchiului) - este ajutat să se urce pe masa specială (de cistoscopie sau ginecologică) și să se așeze în poziție ginecologică - i se fixează picioarele pe suporturile mesei - se efectuează toaleta organelor genitale externe și perineului, cu apă și săpun - se acoperă membrele inferioare cu câmpuri sterile, lăsându-se accesibilă regiunea perineului
Participarea la tehnică	<ul style="list-style-type: none"> - se dezinfectează meatul urinar; apoi, pentru anestezie locală, se introduc în uretră 20 ml soluție novocaină 0,5%, sau 30 ml borat de procaină 2%, sau procaină hidroclorhidrică 4% - anestezia locală se mai poate efectua prin badijonarea meatalui și instilație de Xilocaină sau Lidocaină; mai nou, se recomandă preparatul din import Instilagel • Precizare: <ul style="list-style-type: none"> - la femei, anestezia locală (folosirea substanțelor anestezice amintite mai sus) este suficientă pentru efectuarea cistoscopiei - în scop diagnostic - la bărbați, cistoscopia cu cistoscop rigid e preferabilă să se facă în rahianestezie; se poate utiliza și anestezia intravenoasă sau pe mască; - anestezia locală cu Xilocaină este suficientă pentru investigațiile cu fibroscopul; orice manevră endoscopică (cistolitotriaxie), rezecție de prostată sau tumori, necesită anestezie regională sau generală - se verifică funcționalitatea sistemului de iluminat, starea de curățenie a lentilelor, etanșeitatea asamblărilor - se lubrifiiază instrumentul care urmează să fie introdus cu Instilagel (preparat din import, cu acțiune lubrifiantă și anestezic local) - se oferă aparatul medicului

- se spală vezica cu o soluție de acid boric 3% până când lichidul de spălare devine perfect limpede
- medicul umple vezica cu 150 ml apă sterilizată sau soluție dezinfectantă slabă (la bărbați) sau 250 ml (la femei) și înlocuiește canula de irigație cu sistemul optic
- se racordează sistemul de iluminat la rețeaua electrică (medicul efectuează inspecția pereților vezicii)
- se oferă medicului succesiv - la cerere - cateterele de dimensiuni diferite (dacă examinarea se continuă cu cateterismul ureterelor)
- se oferă eprubetele pentru recoltările urinare, pentru urocultură sau examene biochimice, bioptice
- pacientul cu rahianestezie va fi transferat de pe masa de examinare pe targă și transportat în salon
- aici este așezat comod în pat, unde va sta în decubit dorsal, fără pernă, timp de 12 ore
- se administrează, la nevoie, calmante, antispasice
- la femei, cistoscopia efectuându-se și ambulatoriu - acestea vor fi ajutate să coboare de pe masa de examinare și să se îmbrace
- nu necesită supraveghere specială

Reorga- nizarea lo- cului de muncă

- se aruncă deseurile, iar instrumentele se spală bine, cu o perie moale, cu apă și săpun și se clătesc sub jet, la robinet
- lentilele se șterg cu apă și săpun, depozitele se îndepărtează cu o perie moale; interiorul tubului se curăță minuțios, cu tamponare de vată montate pe porttamponare
- se însuflă aer sub presiune, pentru îndepărtarea unor eventuale reziduuri
- tuburile cistoscopelor se sterilizează prin imersie în soluție dezinfectantă - Clorhexidină 5% (10 ml la 100 ml apă) = 30', sau prin sterilizare cu etilen dioxid (în etuvă)
- sistemul optic se sterilizează prin imersie în soluție dezinfectantă (Glutaraldehidă, CIDEX)
- sau prin păstrare în vapori de formaldehidă cel puțin două ore
- după dezinfecție și sterilizare, toate instrumentele se așază în cutiile în care se păstrează

INCIDENTE ȘI ACCIDENTE:

- accese febrile trecătoare, frisoane, dureri lombare asemănătoare cu colica renală;
- mici hemoragii produse spontan sau în urma spălăturii vezicale cu apă caldă;
- ruptura de uretră, cu uretroragie; perforația vezicii urinare

ATENȚIE:

- cistoscopia se execută în condițiile de asepsie caracteristice intervențiilor chirurgicale
- sistemul optic nu se sterilizează prin fierbere sau autoclavare, fiindcă se deteriorează; se sterilizează numai în soluție apoasă de Glutaraldehidă 2%, CIDEX, vapori de formol sau de etilenoxid
- înainte de înrebuintare, se spală bine cu apă sterilă, pentru a se îndepărta urmele substanțelor sterilizante care sunt iritante, hemolitice etc.

NOTĂ:

În cadrul acestei teme, considerăm necesar să amintim pe scurt și despre examinarea uretrei **uretroscopia**: metodă de explorare endoscopică a uretrei (feminine și masculine), utilizându-se un aparat numit uretoscop, pentru a identifica procese patologice, precum inflamațiile, stricturile, tumorile, corpii străini, calculii. Pentru efectuarea uretroscopiei se folosește metoda irigației, uretra destinându-se printr-un flux lichidian cu cădere gravitațională (fig. 52). **Uretroscopia** poate fi efectuată și cu cistoscopul.

Fig. 52 - Uretroscopia



PREGĂTIREA PACIENTEI PENTRU COLPOSCOPIE

Colposcopia: metodă de inspecție a colului uterin la femeie cu ajutorul aparatului numit colposcop, pentru depistarea leziunilor colului uterin.

Colposcop: instrument optic, stereoscopic, destinat vizualizării colului uterin, care este prevăzut cu un sistem de iluminat propriu și așezat pe un suport.

Părțile com- ponente ale colpo- scopului

- sistemul de mărire: obiective oculare, sisteme intermediare
- sistemul optic de redresare a imaginii, care asigură direcția stânga - dreapta și sus - jos, identice cu cele ale obiectivului (prisme, oglinzi, inversori)
- filtre optice
- sistemele de iluminare dirijată: lampă spectrală de sodiu, lampă cu vapori de mercur, fibră optică
- camera foto, cinema sau TV
- mecanisme de reglare
- stativul

Pregătirea materialelor și instrumentelor	<ul style="list-style-type: none"> – materiale necesare efectuării toaletei organelor genitale externe – masa ginecologică va oferi un confort corespunzător și condiții pentru expunerea colului uterin – specul vaginal bivalv (de dorit să existe specule vaginale de dimensiuni diferite) – pense vaginale lungi – tamponane mici de vată – comprese și mese – soluțiile necesare colposcopiei lăgite: acid acetic 3%, în soluție apoasă, soluție Lugol, soluție de nitrat de argint 5% – materiale pentru recoltarea froiturilor vaginale: lame, spatule, cuburi de burete cu latura de 0,5 cm și fixatori – instrumentar pentru biopsie (bicioim, bisturiu, foarfecă, pense Pozzi, chiurele Volkman, pense pentru extirparea polipilor) și fixatori: formol – instrumente pentru distrucție tisulară: electrocauter, criocoagulator sau modul laser
Pregătirea pacientei și efectuarea tehnicii	<ul style="list-style-type: none"> – educație sanitară înaintea examinării pentru acceptarea acestei examinări – așezarea pacientei pe masa ginecologică în poziție corespunzătoare – toaleta organelor genitale externe – evidențierea colului uterin cu ajutorul unui specul (valve) nelubrificate și care să evite traumatizarea țesuturilor – în primul timp, se observă aspectul secreției vaginale și se recoltează froiturile citologice – după îndepărtarea mucusului și a depozitelor celulare de pe colul uterin acesta se badiionează cu o soluție de acid acetic 3%; asigură, în următoarele 15-20 secunde, o individualizare a imaginilor cu o durată de 2-4 minute – ștergerea, apoi, a colului uterin cu un tampon uscat și badiionarea lui cu soluție Lugol (testul LAHM – SCHILLER); acesta colorează mucoasa normală în castaniu; leziunile colului nu fixează iodul – în continuare, medicul examinează colul uterin și vaginul (acesta din urmă se examinează pe măsura retragerii progresive a valvei)
Îngrijirea pacientei după tehnică	<ul style="list-style-type: none"> – pacienta va fi ajutată să coboare de pe masa ginecologică – ea nu necesită o îngrijire deosebită după examinare
Reorganizarea locului de muncă	<ul style="list-style-type: none"> – se curăță instrumentele; apoi, se dezinfectează și se așază în cutiile în care se vor steriliza – materialele și instrumentele se păstrează în cadolete și cutii metalice până în momentul folosirii

– probele recoltate, froiturile din secreția vaginală și de pe colul uterin, piesele de biopsie etc. se etichetează și se transportă la laborator, împreună cu buletinul pentru examenul histopatologic (acesta din urmă se completează de către medic)

■ DE RETINUT:

Colposcopia este o metodă de examinare deosebit de utilă pentru descoperirea din timp a leziunilor precancerioase, precum și a altor leziuni benigne ale colului uterin.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU PLEUROSCOPIE

Pleuroscopia (toracoscopia): endoscopia cavității pleurale și a suprafeței unui plămân, după insuflarea prealabilă de aer în marea cavitate pleurală (constituirea unui pneumotorax).

Scop: stabilirea etiologiei proceselor inflamatorii pleurale a fistulelor, în cazul pneumotoraxului spontan idiopatic, inspecția unei cavități restante postoperatorii, diagnosticul unei tumori, liza nervilor simpatici, vag și frenic.

Pleuroscop (toracos: op): instrument ce se compune dintr-un trocar cu mandrin cu diametrul de 1 cm; după retragerea mandrinului, se introduce sistemul optic alimentat prin fibre de sticlă de la o sursă de lumină adecvată; imaginea din cavitătea pleurală este transmisă tot prin fibre de sticlă în ocularul examinătorului; ca și la bronhoscopul rigid, opticele permite vizualizări de 180°, 45° și 90°, fiind prevăzute și cu sisteme de biopsie (pense diferite) și de hemostază locală.

Creșterea pneumotoraxului se obține cu ajutorul acului și a aparatului Kuss (fig. 53). *Sunt necesare următoarele materiale:* portatampon și tamponane de vată, cadoletă cu câmpuri sterile, ace și seringi de unică folosință pentru anestezie, tăviță renală, soluție novocaină 1% pentru anestezie, tinctură de iod, trusă antișoc.




Fig. 53 – Aparat pentru pneumotorax

Pregătirea psihică și fizică a pacientului

– pacientul va fi încurajat, explicându-i-se pe înțeles manevra la care va fi supus

– cu o oră înainte de instituirea pneumotoraxului, se administrează, la indicația medicului, un tranchilizant ușor (meprobamat, medazepam, diazepam)

– e culcat pe canapeaua de consultație în decubit lateral, pe partea sănătoasă; brațul de pe partea în care urmează să se



Fig. 54 - Pozitia pacientului pentru crearea pneumotoraxului.

insuflete pneumotoraxul este adus în abducție iar antebrațul flectat astfel încât palma să atingă urechea (fig. 54) - după spălarea bine a mâinilor, se dezinfec-tează regiunea indicată prin badjionare cu iod - asistenta oferă medi-cului seringă încărcată cu soluție de novocaină 1%, pentru efectuarea anesteziei - medicul introduce in-tercostal acul Küss, pe care-l conectează la aparat - aparatul Küss este prevăzut cu o serie de căi (tuburi de cauciuc), ce permit introducerea a 300-400 ml aer în cavitatea pleurală, sub control continuu al presiunii din spațiul astfel creat

Suprave-gherea pa-cientului după crearea pneumo-toraxului

- asistenta va ajuta pacientul să se reaseze în decubit dorsal
- după 10-15 minute îl va ajuta să ia poziție sezând
- va supraveghea tot timpul respirația pacientului, care trebuie să fie ritmică și liniștită
- pacientul va acuza o discretă apăsare în partea unde s-a creat pneumotoraxul
- asistenta va anunța imediat medicul dacă pacientul respiră greu, acuză durere intensă, devine cianotic (pneumotoraxul tera-peutic s-a transformat în pneumotorax sufofant și e necesară exuflația) sau dacă acuză stare de rău general, TA scade, pulsul e rapid și filiform (pericol de șoc pleural)
- dacă totul a decurs fără complicații, asistenta însoțește pacientul în serviciul de radiologie pentru o radioscopie sau o radiografie

Pregătirea fizică și psihică a pacientului

Pleuroscopia (torascopia):

- la recomandarea medicului, pacientul e sedat atât în prezua examinării, cât și înainte de aceasta
- examinarea se face înainte ca pacientul să mănânce
- asistenta îl conduce „în sala de operație
- pacientul este pus în poziție semișezând, rezemat pe partea sănătoasă

Participarea la efectuarea tehnicii pleuroscopiei (sunt necesare două asistente)

- asistenta 1 tot timpul examinării va susține în abducție brațul pacien-tului, care își va sprijini antebrațul flectat pe ceată (fig. 55)
- asistentei 2 îi revine sarcina de a servi me-dicul cu instrumentele și materialele necesare - fiind vorba de o inter-venție chirurgicală, se vor lua toate măsurile de asepsie și antisepsie



Fig. 55 - Pleuroscopie. Pozitia pacientului

Suprave-gherea pacientului după pleuroscopie

- se urmăresc para-metri vitali (tempera-tură, puls, TA, respi-rație), ca după orice intervenție
- pentru a preîntâm-pina deschiderea micii plăgi, închisă de agrafe sau fir de către medic
- plaga operatorie va fi pansată destul de strâns cu feși de tifon, ce vor înconjura cutia toracică
- la recomandarea medicului, pacientului i se administrează sedative și calmante ele lusei
- în primele două zile de la intervenție, se administrează un regim dietetic ușor de digerat, bogat în hidrați de carbon

INCIDENTE ȘI ACCIDENTE:

- accese de tuse sau hematoame în perețele toracic
- lipotimie, colaps sau șoc pleural (se întrerupe intervenția și se aplică măsurile de reanimare).

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU LAPAROSCOPIE

Laparoscopia (celioscopie): explorarea cavității peritoneale, deslinsă în prealabil prin pneumoperitoneu (introducerea de aer în cavitatea peritoneală), cu ajutorul unui aparat numit laparoscop, introdus transperetel, printr-un trocar.

Scop: explorație, biopsic.

Se realizează prin examinare directă, prin inspecția suprafeței ficatului, splinei, colecistului, căilor bilare extrahepatice, tubului digestiv, organelor genitale, pereților

abdominali, din cauza cărora, și se pot preleva fragmente (de ex. puncția biopsică a ficatului) pentru examene histopatologice.

Laparoscopia: are formă tubulară și este prevăzută cu un sistem optic și o sursă de lumină rece și se introduce în cavitatea peritoneală printr-un trocar; trocarul, cu o grosime de 8-12 mm, are la extremitatea proximală un ventil care oprește ieșirea aerului din cavitatea peritoneală; mandrinul – stilet, depășind lungimea tubului cu 1 cm, cu vârful ascuțit cu două sau trei tăisuri, are rolul de a asigura pătrunderea trocarului în cavitatea peritoneală; prin el se introduce, apoi, laparoscopia, care este prevăzută cu un sistem de fibre optice (prin care imaginea este transmisă la un monitor); un sistem de iluminat și un sistem de spălare a lentilei. Ca și la toracoscop (pleuroscoap), obiectivul poate fi montat în axa trocarului sau formând cu aceasta un unghi de 90° sau 135°. Sistemul de iluminat este format dintr-un bec electric distal cu lumină rece (nu arde viscerele), conectat la rețeaua electrică prin intermediul unui transformator; la extremitatea sa proximală se atașază videocamera, conectată, la rândul ei, la un monitor pe care se vizualizează cavitatea abdominală.

Pregătirea instrumentelor și a materialelor	<ul style="list-style-type: none">– casoleță cu câmpuri sterile, casoleță cu mânuși de cauciuc sterile; fenobarbital, mebrobamat, atropină fiole; benzină iodată sau tinctură de iod; aparat pentru insuflarea aerului; ac Veress, sistem de aspirație; trei-patru seringi de 2-10 ml de unică folosință, un bisturiu sterilizat, pense hemostatice sterile, fir de catgut, agrafe (pentru sutură); laparoscopia – cu toate anexele lui sterilizate; substanțe analeptice și cardiotonice, pentru tratamentul unor eventuale accidente; antibiotice (dizolvate, în doze fixate de medic); soluție izotonică de clorură de sodiu sterilă; tăviță renală
Pregătirea psihică și fizică a pacientului	<ul style="list-style-type: none">– se anunță pacientul și i se explică importanța și necesitatea tehnicii– în ziua precedentă examenului, i se administrează un regim hidric– în seara precedentă și în dimineața zilei de examen, i se efectuează clisma evacuatoare– cu o jumătate de oră înainte de intervenție, se poate administra pacientului o fioală de fenobarbital sau 400 mg meprobamat și 0,5 mg atropină– se rade suprafața păroasă a abdomenului (dacă este cazul) și se spală tegumentele cu benzină iodată– se transportă pacientul în sala de examinare, se ajută să se dezbrace și să urce pe masa de examen
Efectuarea pneumo-peritoneului necesită două asistente medicale	<ul style="list-style-type: none">– asistenta medicală I servește medicul în condiții de asepisie– asistenta medicală II va da ajutor la nevoie (completarea gazului din cavitatea peritoneală și intervenții în situații neprevăzute)– pacientul se așază în decubit dorsal și se fixează pe masa de examinare

Efectuarea tehnicii

Laparoscopia se efectuează în anestezia peridurală sau în anestezia generală cu I.O.T.

După instalarea anesteziei:

- cu două pense – rădăscă, se ancorează de o parte și de alta ombilicului și în polul său cranial, se face o incizie de 2 mm
- perpendicular, se introduce acul Veress a cărui penetrare în abdomen determină 2 decilicuri: al aponevrozei și al peritoneului
- cu o seringă, se introduce ser fiziologic prin acul Veress; apoi, se aspiră:

- dacă aerul revine, acul se află în grosimea peretelui;
- dacă nu revine, înseamnă că se află în peritoneu;
- dacă la aspirație se extrage sânge, urină sau conținut intestinal, acul a pătruns într-un viscer abdominal
- se conectează la ac sistemul de insuflare și se introduc în peritoneu circa 3-6 l CO₂, până se atinge o presiune de 12 mmHg, după care se extrage acul Veress
- incizia prin care s-a introdus acul se lărgeste cu bisturiul cât să permită pătrunderea unui trocar cu diametru de 8-12 mm
- se pătrunde cu trocarul în cavitatea peritoneală; apoi, se scoate stiletul ascuțit și se introduce laparoscopia

- pentru a împiedica ieșirea aerului din abdomen, canulele trocar sunt prevăzute cu o clapetă ce se închide automat în momentul scoaterii stiletului
- se efectuează inspecția cavității abdominale (fig. 56)




Fig. 56 – Laparoscopie

- pentru a manevra viscerele abdominale, dar și pentru a recolta fragmentele bioptice, este necesară introducerea încă a unui trocar, prin care se pătrunde în abdomen cu o pensă lungă (pentru manevrarea viscerelor) sau cu un electrotrocar (pentru biopsie)
- acest trocar se introduce în unul din cele 4 cadrane, în funcție de viscerul care trebuie examinat sau biopsiat
- după terminarea manevrelor, se scoate laparoscopia și pensa de manevră; se exuflă CO₂ din cavitatea peritoneală, se îndepărtează canulele trocar
- se suturează plăgile prin care acestea au fost introduse; apoi, se pansează

Bibliografie

- Agenda Medicală 1998**
Viad Apăteanu – *Transfuzia, recoltarea și conservarea sângelui* – Editura Medicală, București, 1977
- Georgeta Bălă, Antoaneta Metaxos, Aqlia Kyovski** – *Tehnici de îngrijire generală a bolnavilor*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983
- M. Beuran** – *Ghid de manevre medicale și colaborare medic-astentă*, Editura Scripta, București, 1999
- Radu Câmpăanu** – *Anatomia și fiziologia omului*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983
- C. Dumitrescu, R. Perciun** – *Diabetul zaharat – cartelul asistentelor medicale*, Editura Scail, București, 1998
- Ruth F. Craven and Constance J. Hirnie** – *Study Guide to Accompany Fundamentals of Nursing*, Copyright 1992 by J. B. Lippincott Company
- Louise Grondin, Rita J. Lussier, Margot Phaneuf, Lise Riopelle** – *Planification des soins infirmiers, modèle d'intervention autonome*, Les Editions de la Cheneliere inc. Montréal, Québec
- A. Huber, B. Karasek-Kreutzinger** – *Les techniques des soins infirmiers* – Lamarre, Paris, 1980
- Virginia Henderson** – *Principii fundamentale ale îngrijirii bolnavului*, 1991, Copenhaga – Danemarca
- G. Ionescu Amza** – *Vademecum terapeutic*, Editura Medicală, București, 1973
- M. Mihăilescu** – *Chirurgie*, Editura Medicală, București, 1979
- Iulian Mincu** – *Alimentația rațională a omului sănătos și bolnav*, Editura Medicală, București, 1975
- Sergiu Mănescu** – *Igienă*, Editura Medicală, București, 1981
- C. Mozes** – *Îngrijirea specială a bolnavilor*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977
- G. Niculescu, D. Mănăstireanu** – *Tehnica îngrijirii bolnavului și elemente de prim ajutor primar și specializat*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1994
- Acad. Eugen Pora** – *Dicționarul sănătății*, Editura Albatros, București, 1978
- L. Popovici** – *Somnul normal și patologic*, Editura Medicală, 1972
- Paul Popescu-Neveanu** – *Psihologie*, Editura Didactică și Pedagogică, 1990

	<p>■ De reținut:</p> <p>Înainte de a se oferi medicului pentru a fi introdus în cavitatea abdominală, sistemul optic se încălzește cu comprese calde</p>
<p>Îngrijirea pacientului după tehnică</p>	<p>– se îmbracă pacientul și se transportă în salon, în patul lui, cu foarte mare grijă</p> <p>– se supraveghează atent, timp de două ore nu va mânca nimic, iar în ziua respectivă va consuma numai lichide</p> <p>– se aplică pungă cu gheață la nivelul ficatului (dacă examinarea a fost însoțită și de puncție biopsică)</p> <p>– în ziua următoare, i se efectuează un examen radioscopic abdominal (facultativ)</p> <p>– dacă tranzitul intestinal se oprește, se efectuează o clismă evacuatorie</p> <p>– în a cincea zi de la intervenție se îndepărtează firele de sutură sau agrafele</p>
<p>Reorganizarea locului de muncă</p>	<p>– se curăță, se spală instrumentele și se pregătesc pentru sterilizare în CIDEX</p> <p>– se așază în ordine materialele folosite</p> <p>– se notează examenul în foaia de observație</p>

■ **INCIDENTE ȘI ACCIDENTE:**

– subfebrilitate, hemoragii (prin leziuni vasculare, emfizem subcutanat, leziuni superficiale sau mai profunde ale organelor abdominale, infecțarea plăgilor abdominale)

■ **ATENȚIE:**

– insuficiența cardiacă și respiratorie contindică laparoscopia, presiunea peritoneului asupra diafragmului putând determina edem pulmonar acut

■ **PRECIZARE:**

În funcție de aspectele constatate la examenul laparoscopic se poate continua tratamentul laparoscopic al leziunilor (colecistectomie, cura herniilor abdominale, intervenții pe organele genitale, hemicolectomii etc.) sau se poate deschide cavitatea peritoneală și trata prin chirurgie clasică afecțiunile organelor abdominale, laparoscopia fiind, în acest caz, primul timp al intervenției chirurgicale.

- L. Riopelle, L. Grondin, M. Phaneuf -- *Soins infirmiers: un modèle centré sur les besoins de la personne*, Montréal, Mc. Graw-Hill, 1984
- L. Riopelle, L. Grondin, Margot Phaneuf -- *Répertoire des diagnostics infirmiers selon Virginia Henderson*, Montréal, Mc. Graw-Hill
- T. Șerbănescu -- *Neurologie, psihiatrie pentru cadre medii*, Editura Medicală, 1978
- Julia B. George, *Nursing Theories, the base for Professional Nursing Practice*, New Jersey, 1985
- Jane Salvage, *Nursingul în acțiune*, 1993 prin Biroul Reg. OMS
- Lucretia Ciocotici, *Profesia de asistentă medicală*, Editura Info-Team, 1995.
- P. Potter, A. Perry, *Îngrijiri infirmiere*, Noiți pedagogice, Canada, 1990, Nursing - revista AAMR nr. 1/martie 1998
- I. Luck Mann, K. G. Gørgensen, *Medical Surgical Nursing*, W. B. Saunders Co., 1987
- M. June Thompson, *Clinical Nursing*, Mosby Company, 1986
- Philip Durward, *Counselling - a guide to practice in nursing*, Butterworth, 1995
- Lynda Juall Carpenito, *Nursing Diagnosis, Application to Clinical Practice*, J. B. Lippincott Company, 1983
- Rosalinda Alsaro, *Application of nursing process. A step by step guide*, J. B. Lippincott Company, Philadelphia, 1986

Cuprins

PARTEA I - Actualizarea procesului de nursing

Scurt istoric al îngrijirilor de sănătate - GHEORGHIȚA GAL,

MONICA SEJUCHEA

- Procesul de nursing	12
- Etapele procesului de nursing	15
- Aprecierea	16
- Diagnosticul de nursing	22
- Planificarea	27
- Implementarea	34
- Evaluarea	37

PARTEA A II-A - Tehnici

Puncțiile - generalități - ELENA DOROBANȚU

- Puncția venoasă	44
- Puncția arterială	46
- Puncția pleurală	49
- Puncția abdominală (Paracenteza)	53
- Puncția pericardică	57
- Puncția rahidiană	60
- Puncția articulară	63
- Puncția osoasă	66
- Puncția vezicii urinare	69
- Puncția fundului de sac Douglas	72
- Puncțiile biopsice	74

Recoltarea produselor biologice și patologice -

GEORGETA BALȚĂ, MARIA ZAMFIR

- Generalități	77
- Recoltarea sângelui	78
- Recoltarea exsudatului faringian	89
- Recoltarea secreției nazale, otice și oculare	91
- Recoltarea sputei	92

- Recoltarea urinei	93
- Recoltarea vărsăturilor	95
- Recoltarea materiei fecale	96
- Recoltarea lichidului cefalorahidian	98
- Recoltarea secrețiilor purulente	99
- Recoltarea secrețiilor vaginale	101

SondaJe, spăItătuI, clisme - GEORGETA BALTA, MARIA ZAMFIR 103

- Generalități	103
- Tipuri de sonde	104
- SondaJul gastric	108
- Introducerea sondei Blakemore	111
- SondaJul duodenal	112
- SondaJul vezical	116
- SondaJul traheo-bronhic	120
- SpăItătura oculară	122
- SpăItătura auriculară	124
- SpăItătura gastrică	125
- SpăItătura vezicii urinare	127
- SpăItătura vaginală	129
- Clisme	130
- Clisme evacuatoare	132
- Clisma terapeutică	133
- Introducerea tubului de gaze	135

Administrtarea medicamentelor - ELENA DOROBANTU 136

- Generalități	136
- Administrtarea medicamentelor pe cale orală	138
- Administrtarea medicamentelor pe cale rectală	140
- Administrtarea medicamentelor pe cale respiratorie	141
- Administrtarea medicamentelor pe suprafața tegumentelor	143
- Administrtarea medicamentelor pe suprafața mucoaselor	144
- Administrtarea medicamentelor pe cale parenterală	149
- Particularități de administrare a unor grupe de medicamente	159

Determinarea grupelor sanguine - MARIA PESEK 170

Transfuzia de sânge - MARIA ZAMFIR 180

Pregătirea preoperatorie - MĂRIUCA IVAN, MARIANA ARDELEANU . . . 185

Supraveghețaa postoperatorie și îngrijirile acordate pacienților operați - MĂRIUCA IVAN, MARIANA ARDELEANU 193

Pregătirea pacientului pentru explorări radiologice -

GEORGETA BALTA

- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a sistemului osteo-articular	207
- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a organelor toracice	208
- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică gastro-intestinală	210
- Pregătirea pacientului pentru examenul radiologic al colonului	212
- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a colecistului și căilor biliare	214
- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a aparatului renal	217
- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a aparatului cardiovascular	222
- Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a sistemului nervos central	223
- Pregătirea pacientului pentru explorarea cu izotopi radioactivi	224

Pregătirea pacientului pentru explorări endoscopice -

GEORGETA BALTA, LUCRETIA TITIRCA

- Pregătirea pacientului pentru bronhoscopie	226
- Pregătirea pacientului pentru esotagoscopie	230
- Pregătirea pacientului pentru gastroscopie	232
- Pregătirea pacientului pentru endoscopie rectosigmoidiană	235
- Pregătirea pacientului pentru colonoscopie	238
- Pregătirea pacientului pentru cistoscopie	239
- Pregătirea pacientului pentru colposcopie	243
- Pregătirea pacientului pentru pleuroscopie	245
- Pregătirea pacientului pentru laparoscopie	247

Bibliografie

cuve. Turin, 1987 (1000 p.) 251